

הודעה על עדכון עלון לרופא ועלון לצרכן

קרדילוק Cardiloc 1.25;2.5;5;10

Tablets

חברת אוניפארם בע"מ מבקשת להודיעכם על עדכון בעלון ולצרכן של התכשיר **קנדור פלוס**. בפירוט שלהלן כלולים העדכונים המהותיים בלבד. עדכונים שאינם מהותיים, אינם כלולים בהודעה זו. למידע מלא, יש לעיין בעלונים. תוספות המידע מסומנות **בצבע כחול**, החמרות מודגשות **בצהוב** והסרות המידע מופיעות בקו חוצה.

מרכיב פעיל:

Bisoprolol Fumarate 1.25;2.5;5;10 mg

ההתוויה המאושרת:

קרדילוק 1.25 / קרדילוק 2.5: לטיפול באי – ספיקת לב.
קרדילוק 5 / קרדילוק 10: לטיפול באי – ספיקת לב. לטיפול ביתר לחץ דם. לטיפול בתעוקת חזה.

העדכונים בעלון לצרכן:

[...]

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- הינך סובל מפאוכרומוציטומה שאינה מטופלת (Pheochromocytoma) **שאינה מטופלת** - גידול נדיר של בלוטות יותרת הכליה.

[...]

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות

- תרופות מסוימות לטיפול בלחץ דם גבוה, תעוקת חזה (אנגינה פקטוריס) **או קצב לב לא סדיר** (חוסמי תעלות סידן כגון וראפאמיל ודילטיאזם).
- תרופות לטיפול **בקצב לב לא סדיר או חריג** (השייכות לתרופות אנטי-ארייתמיות מסוג 3, כגון אמידארון).

[...]

. כיצד תשתמש בתרופה

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא אם אינך בטוח **בנוגע** למינון ואופן הטיפול בתרופה. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

הטיפול בקרדילוק חייב להתחיל במינון נמוך ולעלות בהדרגתיות.

הרופא שלך יחליט כיצד להעלות את המינון.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:

טיפול במצבים כרוניים של אי ספיקת לב יציבה

- 1.25 מ"ג ביסופרולול פעם ביום למשך שבוע
- 2.5 מ"ג ביסופרולול פעם ביום למשך שבוע
- 3.75 מ"ג ביסופרולול פעם ביום למשך שבוע
- 5 מ"ג ביסופרולול פעם ביום למשך 4 שבועות
- 7.5 מ"ג ביסופרולול פעם ביום למשך 4 שבועות
- 10 מ"ג ביסופרולול פעם ביום כטיפול אחזקה קבוע (מתמשך)

המינון המומלץ הגבוה ביותר ליום הוא 10 מ"ג ביסופרולול.

כתלות בסבילות שלך לתרופה, הרופא שלך עשוי להאריך את הזמן עד להעלאת המינון.

אם מצבך מחמיר או אם אינך מסוגל עוד לסבול את התרופה, ייתכן ויהיה צורך להפחית את מינון התרופה שוב או להפסיק את הטיפול.

בחלק מהמטופלים מנת אחזקה נמוכה מ-10 ג' ביסופרולול יכולה להיות מספקת.

הרופא שלך ינחה אותך כיצד לנהוג.

אם עליך להפסיק את הטיפול לחלוטין, הרופא שלך ייעץ לך בדרך כלל להפחית את המינון בהדרגתיות, אחרת מצבך עלול להחמיר.

טיפול ביתר לחץ דם

משטר המינון המומלץ הוא 5 מ"ג פעם ביום. במצבים של יתר לחץ דם קל ייתכן שהרופא שלך יקבע שמשטר מינון של 2.5 מ"ג פעם ביום יהיה מספיק.

אם נחוץ, ייתכן שהרופא יורה לך להעלות את מינון התרופה ל-10 מ"ג פעם ביום.

המינון המירבי המומלץ הוא 20 מ"ג פעם ביום.

טיפול בתעתוקת חזה (אנגינה פקטוריס)

משטר המינון המומלץ הוא 5 מ"ג פעם ביום.

אם התגובה אינה מספקת, ייתכן שהרופא יורה לך להעלות את מינון התרופה ל-10 מ"ג פעם ביום.

המינון המירבי המומלץ הוא 20 מ"ג פעם ביום.

מינון במטופלים עם הפרעות בתפקודי הכבד והכליה

במטופלים עם הפרעות בתפקודי הכבד או הכליה בדרגת חומרה קלה עד בינונית, בדרך כלל לא נדרשת התאמת מינון. במטופלים עם הפרעות חמורות בתפקודי הכבד או הכליה, אין לעבור מה יומית של 10 מ"ג.

[...]

העלון לרופא והעלון לצרכן מפורסמים במאגר התרופות שבאתר האינטרנט של משרד הבריאות <http://www.health.gov.il> וניתן לקבלם מודפסים ע"י פניה לבעל הרישום.