

**نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة
(مستحضرات) - 1986**

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

الفو - كال XL

أعراض ذات تحرير مطول

يحتوي كل قرص ذو تحرير مطول على:
الفوزوسين هيدروكلوريد 10 ملغ

(Alfuzosin Hydrochloride 10 mg).

المواد غير الفعالة: انظر الفقرة 6 في النشرة.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمال الدواء.

احفظ هذه النشرة، من الجائز أن تحتاج إلى قراءتها بتمعن ثانية. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء.

إذا توفرت لديك أسلطة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء للعلاج من أجلك. لا تعطيه للأخرين.

فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك. الدواء مخصص للرجال. هذا الدواء غير مخصص

للعلاج لدى الأطفال والمرأهقين دون عمر 16 سنة.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

يستعمل الفو - كال XL لعلاج الأعراض المتعلقة بتضخم غدة البروستات الحميد (prostate) وكعلاج مكمل للتخلص من القثطر (catheter) عند احتباس البول نتيجة تضخم غدة البروستات الحميد.

الفصيلة العلاجية: ينتمي الفو - كال XL لمجموعة المستحضرات الفسماة حاجبات ألفا وهو حاجب إنتقائي للمستقبل a1 (اللفا واحد).

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

• كنت حساساً (اليرجي) للمادة الفعالة الفوزوسين أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (انظر الفقرة 6 "معلومات إضافية").

• كنت تعاني أو عانيت في الماضي من إنخفاض مفاجئ في ضغط الدم عندما تنتقل من وضعية الجلوس أو الإستلقاء إلى الوقوف، من الجائز أن يتراافق ذلك بدوار أو إغماء (Orthostatic hypotension).

• كنت تعاني من مشكلة في الأداء الوظيفي للقلب.

• كنت تعالج بحاجبات a (اللفا) أخرى (مثل: پرازوسين، تريمازوسين، أوراپيديل).

• الأطفال دون عمر 16 سنة.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج بالدواء إحكام للطبيب إذا:

• إذا بدت عليك أعراض إنخفاض ضغط الدم الإنتصابي (انخفاض مفاجئ في ضغط الدم عند تغيير وضعيتك). قد يحدث إنخفاض ضغط الدم الإنتصابي خلال الساعات الأولى بعد تناول الدواء. هذا الأمر شائع خاصة عند بداية العلاج، وكذلك إذا كنت تتلقى بالإضافة لذلك علاج لإرتفاع ضغط الدم، أو إذا وجدت لديك إضطرابات في القلب. من شأنه أن يكون لهذا الأمر علاقة بالأعراض التالية: دوار، إرهاق وتعرق. في هذه الحالة عليك الإستلقاء حتى زوال هذه الأعراض بشكل تام، حيث أنها ذات ميزة عابرة. بشكل عام يمكنكمواصلة علاجك. توخي الحذر إذا وجد لديك ضغط دم منخفض بعد تناول دواء إضافي من نفس النوع (حاجبات a1).

• إذا كنت متقدماً في السن فهناك إحتمال أكبر لحدوث إنخفاض في ضغط الدم.

• إذا وجدت لديك سابقة لحساسية (اليرجيا) لدواء آخر من نفس الفصيلة (حاجبات a1).

• إذا كنت مسنًا.

• كنت معالجاً بأدوية لخفض ضغط الدم، مشتقات النيترات أو أدوية لأمراض قلبية وعائية أخرى (القلب والأوعية الدموية). سوف يقيس طبيبك ضغط الدم بشكل دائم، خاصة في بداية العلاج، سيقرر طبيبك فيما إذا كان بالإمكان إستعمال الفو - كال XL في نفس الوقت.

• إذا كنت تعاني من قصور قلب أو إضطراب في النظم، يستشر طبيبك. هو سيقرر فيما إذا كان بالإمكان إستعمال الفو - كال XL في نفس الوقت.

• حالات إنتصاب مستمر ومؤلم لها علاقة بالنشاط الجنسي (نوعوظ) قد تحدث في أوقات متباينة جداً. إذا حدث ذلك فعليك التوجه إلى الطبيب فوراً.

• إذا توجب عليك تناول أو تناولت الفو - كال XL، عليك إبلاغ الجراح بأنك تناولت أو تناولت الفو - كال XL.

• إذا كنت تعاني من قصور كلوي خطير (تصفية كرياتينين أقل من 30 مل للدقيقة)، فلا يجوز تناول الفو - كال XL.

• إذا كنت تستعمل أدوية أخرى، إقرأ بتمعن فقرة "التدخلات/التفاعلات بين الأدوية".

الأطفال والمرأهقون

هذا الدواء غير مخصص للعلاج لدى أطفال ومرأهقين دون عمر 16 سنة.

الفحوص والمتابعة

إذا كنت معالجاً بأدوية لخفض ضغط الدم أو أمراض قلبية وعائية أخرى، سوف يقيس طبيبك ضغط الدم بشكل دائم، خاصة في بداية العلاج.

التدخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية إحكام للطبيب أو للصيدلي عن ذلك.

لا يجوز تناول الفو - كال XL إذا كنت تتناول حاجبات أخرى لـ a1.

يجب توخي الحذر خاصة عند مشاركة الفو - كال XL مع الأدوية التالية:

- أدوية لخفض ضغط الدم.

- مشتقات النيترات - أدوية تستعمل في حالة الذبحة الصدرية (angina) (شعور إنقباضي، أو حتى أحياناً ألم واخز، خلف عظم الصدر) ومرض قلبي.

- التخدير العام.

- أدوية لعلاج التلوثات الفطرية (مثل إيتراكونازول).

- أدوية لعلاج الـ HIV (مثل ريتونافير).

- أدوية لعلاج التلوثات الجرثومية (مثل كلاريتروميسين، تيليتروميسين).

- أدوية لعلاج الإكتئاب (مثل نيفازودون).

- أعراض كيتوكونازول (التي تستعمل لعلاج متلازمة كوشينج - عندما ينتحج الجسم فائض من الكورتيزول).

- أدوية لإضطرابات الإنتصاب (عجز جنسي) وحاجبات ألفا. لخفيض إحتمال حدوث هذه الأعراض، فإن المقدار الدوائي اليومي من حاجبات ألفا يجب أن يكون دائم وذلك قبل أن تبدأ إستعمال أدوية لإضطرابات إنتصاب العضو الذكري.

- أدوية التي تؤثر على التخطيط الكهربائي للقلب (تخطيط QT).

من أجل تجنب تفاعلات مع أدوية أخرى، عليك دائمًا إبلاغ الطبيب المعالج عن كل علاج.

إستعمال الفو - كال XL مع الطعام

يجب تناول الفو - كال XL مباشرة بعد وجبة العشاء.

الحمل والإرضاخ

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تعتقدين بأنك حامل أو تخططين للحمل، إستشيري الطبيب قبل تناول هذا الدواء.

السيارة وإستعمال الماكولات

أعراض مثل ميل للنوم، إنخفاض في ضغط الدم، دوار وشعور بدوخة، ضعف، قد تحدث في بداية العلاج. يجبأخذ هذه التأثيرات بالحسبان عند السياقة أو إستعمال الماكولات.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي كل قرص على 0.560 ملغ بروبيلين چليکول.

3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب الإستعمال دائمًا حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.

يجب بلع القرص بشكله الكامل مع الكثير من الماء بعد وجبة العشاء. يمكنه سحق، سحق أو شطر القرص لأن هذا الأمر قد يؤثر على إمتصاص الدواء في الجسم.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

المقدار الدوائي الإعتيادي عادة هو:

لتضخم غدة البروستات الحميد - قرص واحد مرة في اليوم.

كعلاج متلازم للتخلص من القثطر (catheter) عند احتباس البول، جراء تضخم غدة البروستات الحميد - قرص واحد مرة في اليوم. بدء العلاج في يوم إدخال القثطر والتوقف عن العلاج يوماً بعد إخراج القثطر (بالإجمال 3-4 أيام).

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر من الفو - كال XL أو إذا بلع شخصاً بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك. يجب إستدعاء قدر الإمكان لتجنب الأعراض الجانبية. لا تقد بنفسك إلى المستشفى.

إذا نسيت تناول ألفو - كال XL في الوقت المطلوب، لا يجوز تناول مقداراً دوائياً مضاعفاً للتعويض عن المقدار الدوائي المنسي. فوت هذا المقدار الدوائي وتناول المقدار الدوائي التالي في الموعد الإعتيادي.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا توقفت عن تناول ألفو - كال XL:

يجب مواصلة تناول ألفو - كال XL حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية. توقف عن العلاج فقط إذا أوصاك الطبيب بفعل ذلك.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء.

ضعف النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

(4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال ألفو - كال XL قد يسبب أعراضًا جانبية لدى بعض المستعملين. لا تندesh من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أيًا منها.

يجب التوقف عن العلاج والتوجه إلى الطبيب فوراً إذا كنت تعاني من:

- **الم في الصدر (ذبحة صدرية - angina pectoris)** عادة تحدث إذا عانيت من ذبحة في الماضي. يحدث هذا العرض لدى أقل من 1 من بين 10,000 مستعمل.

ردود فعل تحسسية - أعراض وذمة وعائية مثل طفح أحمر أو تدرين في الجلد، إنفاس (في الجفنين، في الوجه، في الشفتين، في الفم وفي اللسان)، صعوبات في التنفس وفي البلع. يحدث هذا العرض لدى أقل من 1 من بين 10,000 مستعمل.

إنتصاب مطول ومؤلم للعضو الذكري ليس له علاقة بالنشاط الجنسي (نوعoz) (شيوخ غير معروف)

شيوخ الأعراض الجانبية التالية يُصنَّف على النحو التالي:

شائعة جداً: تظهر لدى أكثر من 1 من بين 10 متعالجين

شائعة: تظهر لدى 1 حتى 10 من بين 100 متعالج

غير شائعة: تظهر لدى 1 حتى 10 من بين 1,000 متعالج

نادرة: تظهر لدى 1 حتى 10 من بين 10,000 متعالج

شيوع غير معروف: لا يمكن تقييم الشيوخ من المعطيات المتوفرة

اضطرابات في الجهاز العصبي:

شائعة: الشعور بغيرتيغو (دوران)، صداع، ضعف، إرهاق ودوار.

غير شائعة: فقدان مؤقت للوعي (syncope)، قيرتيغو.

اضطرابات في جهاز القلب والأوعية الدموية:

غير شائعة: إنخفاض ضغط الدم (إنخفاض ضغط الدم، مثلاً عند الوقوف بشكل مفاجئ من وضعية الجلوس أو الإستلقاء)، تسارع في نظم القلب وهبات من الحر.

نادرة جداً: **angina pectoris** (ذبحة صدرية - شعور إنقباضي، أو أحياناً حتى ألم واخز، خلف عظم الصدر، لدى مرضى بمرض قلبي إكليلي).

شيوع غير معروف: رجفان أذيني (اضطرابات في نظم القلب).

اضطرابات في الدم والجهاز اللمفي:

شيوع غير معروف: إنخفاض في خلايا الدم البيضاء المعتدلة (neutropenia)، إنخفاض في عدد الصفائح الدموية (thrombocytopenia).

اضطرابات في الجهاز الهضمي:

شائعة: غثيان، الام في البطن.

غير شائعة: إسهالات، تقيؤات.

اضطرابات جلدية:

غير شائعة: طفح جلدي، حكة.

نادرة جداً: شرى (urticaria)، وذمة وعائية (إنفاس في الوجه، في اللسان وفي الحنجرة).

اضطرابات في الكبد:

شيوع غير معروف: تضرر خلايا الكبد، مرض كبدي صفراوي (اضطراب في تصريف الصفراء).

اضطرابات في العينين:

شيوع غير معروف: متلازمة القرحية المترسبة أثناء الجراحة (Intraoperative Floppy Iris Syndrome, IFIS).

طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

بالإضافة لذلك، بالإمكان تبليغ الشركة بواسطة العنوان

التالي: Padagis.co.il

5) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في

مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال روئية الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسوس.

لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العبوة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

يجب التخزين دون 25 درجة مئوية.

لا يجوز رمي الأدوية إلى المجاري أو إلى القمامات المنزلية.

إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد بحاجتها بعد. إتباع هذه الوسائل يساعد في الحفاظ على البيئة.

6) معلومات إضافية

• يحتوي الدواء بالإضافة للمركب الفعال أيضاً على:

Hypromellose, Calcium hydrogen phosphate dehydrate, Hydrogenated vegetable oil, Povidone K30, Colloidal anhydrous silica, Magnesium stearate,

Propylene glycol, Titanium dioxide (E-171).

• كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

قرص أبيض، دائري ومحبب من كلا الجانبين.

عبوة المستحضر: تتضمن العبوة 30 قرصاً. في كل لوبيحة (بليستر) 10 أقراص.

• صاحب الإمتياز وعنوانه: وكالات پاداچیس إسرائل م.ض.، شارع راكيفيت 1، شوهم.

• إسم المنتج وعنوانه: ريفوفارم إس.آي، مانو، سويسرا.

تم إعدادها في نيسان 2022 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

14123.31829