

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة
(مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

دوتاستيريد تيقع كبسولات لينة

تحتوي كل كبسولة لينة على:
0.5 ملг دوتاستيريد

Dutasteride 0.5 mg

لقائمة المركبات غير الفعالة أنظر الفقرة 6 - "معلومات إضافية".

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك. هذا الدواء مخصص للرجال فقط.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

- لعلاج الأعراض المتوسطة حتى الشديدة لتضخم غدة البروستات الحميد (BPH).

- للتقليل من خطورة إحتباس البول الحاد (AUR) وعملية جراحية لمرضى لديهم أعراض متوسطة حتى شديدة لتضخم غدة البروستات الحميد (BPH).

يستعمل دوتاستيريد تيقع لعلاج تضخم غدة البروستات لدى الرجال (تضخم غدة البروستات الحميد) - ورم غير سرطاني لغدة البروستات، الناجم عن زيادة إنتاج هورمون يسمى ديهيدرو تستوستيرون. إن تضخم غدة البروستات يمكن أن يؤدي إلى حدوث مشاكل في الجهاز البولي، مثلً صعوبة التبول وال الحاجة المُلحّة للذهاب إلى المرحاض. كما أنه، قد يُبطئ ويُضعف من تدفق البول. من دون علاج، هناك خطورة لأن يحدث إنسداد تام لتدفق البول لديك (إحتباس بول حار). هذه الحالة تستلزم علاجاً طبياً فوريًا. في حالات معينة يحتاج الأمر إجراء عملية جراحية لإستئصال أو لتصغير غدة البروستات. دوتاستيريد تيقع يقلل من إنتاج ديهيدرو تستوستيرون وبذلك يساعد على تصغير غدة البروستات وتخفيف الأعراض. الأمر الذي يقلل من خطورة إحتباس البول الحاد وال الحاجة لإجراء عملية جراحية.

بإمكان إستعمال دوتاستيريد تيقع أيضاً مع دواء آخر يسمى تامسولوسين (الذي يستعمل لعلاج أعراض تضخم غدة البروستات).

الفصيلة العلاجية

من مثبطات الإنزيم 5 - ألفا - ريدوكتاز.

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أليجي) لـ دوتاستيريد، لمثبطات أخرى للإنزيم 5 - ألفا - ريدوكتاز أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء كما هو مفصل في الفقرة 6 - "معلومات إضافية".

- وُجد لديك مرض كبدي شديد.

إذا كنت تعتقد بأن إحدى تلك الأمور يخصك لا تتناول الدواء وإنك لطبيبك.

الدواء مخصص للرجال **فقط!** لا يجوز إستعمال هذا المستحضر لدى النساء، الأطفال أو المراهقين.

تحذيرات خاصة بـإستعمال الدواء تحدث مع طبيبك قبل تناول دوتاستيريد تيقع.

- تأكد من أن طبيبك يعلم بأن لديك مشاكل في الكبد. إذا كان لديك أي مرض أثر على الكبد، فمن الجائز أن تحتاج لإجراء فحوص إضافية أثناء تناول دوتاستيريد تيقع.

- يتوجب على النساء، الأطفال والمراهقين تجنب ملامسة كبسولات دوتاستيريد تيقع التي يتسرّب منها الدواء وذلك لأن المادة الفعالة يمكن أن تُمتص عن طريق الجلد. يجب شطف منطقة التماس فوراً بالصابون والماء إذا حصل أي تماّس مع الجلد.

- يستعمل الكوندوم أثناء الإتصال الجنسي. لقد وُجد دوتاستيريد في السائل المنوي للرجال الذين يتناولون دوتاستيريد تيقع. إذا كانت زوجتك حاملاً أو من شأنها أن تكون حاملاً، فيتوجب عليك الإمتناع عن تعريضها لنطافك لأن دوتاستيريد قد يؤثر على التطور السليم لجينين ذكري. لقد تبيّن أن دوتاستيريد يقلل من تعداد الحيوانات المنوية، من حجم السائل المنوي ومن حركة النطاف. الأمر الذي قد يقلل من خصوبتك.

- في فحص سريري لدى الرجال المعرضين لخطورة زائدة لحدوث سرطان غدة البروستات، لقد تطور لدى الرجال الذين تناولوا دوتاستيريد تيقع درجة خطيرة لسرطان البروستات بشيوع أكبر مما هو عليه لدى الرجال الذين لم يتناولوا دوتاستيريد تيقع. إن تأثير دوتاستيريد تيقع على درجة خطيرة لسرطان البروستات غير واضح.

- من شأن دوتاستيريد تيقع أن يسبب تضخماً أو حساسية في الثدي. إذا أصبح هذا الأمر مزعجاً، أو إذا كنت تلاحظ كتلأ في الثدي أو إفراز من الحلمة فعليك التحدث مع طبيبك عن هذه التغيرات لأنها قد تكون علامات لمشكلة طبية خطيرة، مثل سرطان الثدي.

راجع الطبيب أو الصيدلي الخاص بك إذا توفرت لديك أية أسئلة حول إستعمال دوتاستيريد تيقع.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرأً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو للصيدلي عن ذلك. بالأخص إذا كنت تتناول أدوية معينة التي من شأنها أن تتفاعل مع دوتاستيريد تيقع، الأمر الذي قد يزيد من إحتمال حدوث أعراض جانبية لديك. هذه الأدوية تشمل:

- **فيрапاميل أو ديلتيازم** (ارتفاع ضغط الدم)

- **ريتونافير أو إيندينافير** (لتلوث الـ HIV - قيروس العوز المناعي البشري)

- **إيتراكونازول أو كيتوكونازول** (لللتلوث الفطري)

- **نيفازودون** (مضاد الإكتئاب)

- **حاجبات ألفا** (العلاج تضخم غدة البروستات أو ارتفاع ضغط الدم).

بلغ طبيبك إذا كنت تتناول واحداً من تلك الأدوية. من الجائز أن يحتاج الأمر لخفض المقدار الدوائي من دوتاستيريد تيقع الذي تتناوله.

إستعمال الدواء والطعام

بإمكان تناول دوتاستيريد تيقع مع أو بدون طعام.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

يتوجب على النساء الحوامل (أو اللواتي من شأنهن أن تكون حوامل) تجنب ملامسة الكبسولات التي يتسرّب منها الدواء. دوتاستيريد يُمتص عن طريق الجلد وقد يؤثر على التطور السليم لجينين ذكري. تزداد هذه الخطورة خلال الأسبوعين

الـ 16 الأولى من الحمل.

يستعمل الكوندوم أثناء الإتصال الجنسي.

لقد وُجد دوتاستيريد في السائل المنوي للرجال الذين يتناولون دوتاستيريد تيقع. إذا كانت زوجتك حاملاً أو من شأنها أن تكون حاملاً، فيتوجب عليك

الإمتناع عن تعريضها لنطافك.

لقد تبيّن أن دوتاستيريد تيقع يقلل من تعداد الحيوانات المنوية، من حجم السائل المنوي ومن حركة النطاف، لذلك فإن خصوبة الرجل قد تقل.

بلغ طبيبك في حال ملامسة إمرأة حامل لـ دوتاستيريد.

يتابع

تمتة

السيادة وإستعمال الماكنا

من غير المحتمل أن يؤثر دوستيريد تيقيع على قدرتك على السيادة أو تشغيل ماكنا.

3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائمًا إستعمال المستحضر بحسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقًا بما يتعلق بالمقدار الدوائية وطريقة العلاج بالمستحضر. المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

المقدار الدوائي الإعتيادي عادة هو كبسولة واحدة (0.5 ملغ) يتم تناولها مرة في اليوم. إن العلاج بدوستيريد تيقيع هو طويل الأمد. يشعر بعض الرجال بتحسن مبكر في الأعراض لديهم. لكن، يحتاج الآخرون تناول دوستيريد تيقيع لمدة 6 أشهر أو أكثر قبل أن يبدأ الدواء بالتأثير. واصل تناول دوستيريد تيقيع طالما أبلغ الطبيب بفعل ذلك. لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

يجب بلع الكبسولة بأكملها مع الماء. يمنع مضاعفه ويعزز فتح وبعثرة محتوى الكبسولة. إن ملامسة محتوى الكبسولة قد يسبب الآلام في فمك أو في حنجرتك.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر فعليك إستشارة الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.

إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المخصص، لا يجوز تناول مقداراً دوائياً مضاعفاً. تناول المقدار الدوائي القادم في الوقت الإعتيادي واستشر الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب. لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية. من الجائز أن تمر 6 أشهر أو أكثر إلى أن تشعر بتأثير الدواء.

إذا كنت لا تتناول الدواء بشكل دائم، فمن الجائز أن تتأثر مراقبة نسب الـ PSA لديك.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال دوستيريد تيقيع قد يسبب أعراضًا جانبية لدى بعض المستعملين. لا تندهى من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعانى أيًا منها.

رد فعل تحسسي

إن علامات رد الفعل التحسسي يمكن أن تشمل:

- طفح جلدي (الذى يمكن أن يكون حاكاً)
- شرى (يشبه الطفح الناجم عن ملامسة نبات القرص)
- إنتفاخ الجفنين، الوجه، الشفتين، الذراعين أو الرجلين.

بلغ طبيبك فوراً إذا كنت تلاحظ حدوث إحدى تلك الأعراض وتوقف عن إستعمال دوستيريد تيقيع.

أعراض جانبية إضافية

أعراض جانبية شائعة

أعراض التي قد تظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 10 رجال يتناولون دوستيريد تيقيع:

- عدم القدرة على تحقيق أو الحفاظ على إنتصاب القضيب التناسلي (عجز جنسي)، هذا العرض يمكن أن يستمر بعد توقفك عن تناول دوستيريد تيقيع
- تناقص الرغبة الجنسية (libido). هذا العرض يمكن أن يستمر بعد توقفك عن تناول دوستيريد تيقيع
- إضطرابات في قذف السائل المنوي، مثل تدني كمية السائل المنوي المقذوف خلال ممارسة العلاقات الجنسية. هذا العرض يمكّن أن يستمر بعد توقفك عن تناول دوستيريد تيقيع
- تضخم الثدي أو حساسية في الثدي (تضخم الذكور)
- دوار، عندما يتم تناوله مع تامسولوسين.

أعراض جانبية غير شائعة

أعراض التي قد تظهر لدى حتى مستعمل واحد من كل 100 رجل يتناولون دوستيريد تيقيع:

- قصور في القلب (يصبح القلب أقل نجاعة في ضخ الدم في الجسم. من الجائز أن تحدث لديك أعراض مثل ضيق تنفس، إرهاق شديد وإنفاس في الكاحلين وفي الرجلين)
- تساقط الشعر (عادة من الجسم) أو نمو شعر.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعانى من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبلغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتهاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على العبوة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

يجب تخزين الدواء دون 25 درجة مئوية.

يجب حفظه في العبوة الأصلية لحمايته من الضوء.

6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمركب الفعال أيضًا على:

Glycerol monocaprylocaprate, gelatin (bovine, bloom 160), glycerol (E422), titanium dioxide (E171), iron oxide yellow (E172), butylhydroxytoluene (E321), medium chain triglycerides, purified water.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة دوستيريد تيقيع كبسولات ليننة هي عبارة عن كبسولات مطاطة وقائمة لونها أصفر، التي تحتوي على سائل شحمي أو كتلة ليننة بدون لون أو بلون مائل للأصفر.

دوستيريد تيقيع معبدًا ضمن عبوات ذات 10 أو 30 كبسولة ليننة ضمن لوحيات (بليستر).

من الجائز ألا تسوق كافة أحجام العبوات.

إسم المنتج وصاحب الإمتياز وعنوانه:

تبليغ إسرائيل م.ض.،
شارع دفورا هنفيه 124، تل أبيب 6944020.

تم إعداد النشرة في أيار 2022 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

160.48.35344

DUTA CAPS PL SH 220622