

ريفار تيفع 2.5 ملء**أعراض مطلية**

يحتوي كل قرص مطلية على:

ريفاروكسابان 2.5 ملء (Rivaroxaban 2.5 mg)

(للحصول على معلومات عن المركبات غير الفعالة، انظر البند 2 - "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء"

و البند 6 - "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بأكملها حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء، تحتوي هذه النشرة على معلومات مخصصة عن الدواء.

إذا توفر لديك أسلطة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

بطاقة معلومات وقائية لمنتفى العلاج

بالإضافة إلى النشرة الطبية، فإن المستحضر ريفار تيفع 2.5 ملء توجد بطاقة معلومات وقائية لمنتفى العلاج. تحتوي هذه البطاقة على معلومات وقائية هامة يتوجب عليك معرفتها قبل البدء بالعلاج بريفار

تيفع 2.5 ملء (وكذلك على أي أدوية أخرى).

يجب قراءة بطاقة المعلومات الوقائية لمنتفى العلاج ونشرة المستهلك الطبية بتمعن قبل البدء باستعمال المستحضر.

يجدر بالانتباه إلى بطاقة لماعينة إضافية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

لقد صُصف هذا الدواء من أجل علاجك. لا تتعطه لآخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن حالي الطيبة

متلبثة.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

• ريفار تيفع 2.5 ملء، بالدمج مع حمض الأسيتيل ساليسيليك (المعروف باسم الأسبرين) أو بالدمج

مع حمض الأسيتيل ساليسيليك وكليبيودوجريل، مخصوص لمنع الأحداث الخارجية العصبية (الأحداث

التخriنة) لدى متنفى العلاج البالغين بعد المتلازمة التاجية الحادة (مجموعة من الحالات التي تتشكل على

نوبة قلبية وبنية صدرية لا مستقرة، وهي نوع خطير لأن الألم في الصدر والذين يوجد لديهم ارتفاع في

مؤشرات فلبية مميتة في فحوص الدم).

• ريفار تيفع 2.5 ملء، بالدمج مع حمض الأسيتيل ساليسيليك (المعروف باسم الأسبرين)، مخصوص لمنع

الأحداث الخارجية العصبية (الأحداث الخرينة) لدى متنفى العلاج البالغين المصagrion بمعرض الشريان

الناري أو بمعرض الشريان المحاطي المصagrion بالأعراض، المعرضون لخطورة عالية للأصابة بأحداث

القارئية.

الفصيلة الملتجة: ينتهي ريفار تيفع 2.5 ملء إلى فصيلة الأدوية المسماة مضادات التخثر ويعمل عن طريق

تضليل الميل إلى تكون خثارات دموية وذلك عن طريق حجب عامل مرتبط بعملية التخثر (عامل Xa).

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

• كانت لديك حساسية (ارجحية) لريفاروكسابان أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء

(للحصول على معلومات عن المركبات غير الفعالة، انظر البند 2 - "معلومات إضافية").

• كنت تعاني من نزيف دموي متزايد.

• وجّد لديك مرض أو حالة في عضو في الجسم يزيدان من خطر نشوء نزيف دموي خطير (مثل: قرحة

المعدة، رهبة، أو نزيف دموي في الدماغ، جراحة في الدماغ أو العينين تمت متوجّة).

• كنت تستعمل أدوية لمنع الخثارات الدموية (مثل: وارفارين، دابيجاتران، أيبوكسابان أو هيبارين)،

باستثناء حالات الانتقال من العلاج بمضادات تخثر واحد إلى العلاج بأدوية أخرى أو عندما تناولت هيبارين من

خلال قسطرة وريدي أو شريانية لإيقافه مفتوحاً.

• كنت تعاني من المتلازمة التاجية الحادة، وتشأ لديك في الماضي نزيف دموي أو خثرة دموية في

الدماغ (سكنة مميتة).

• كنت تعاني من مرض الشريان الناري أو مرض الشريان المحاطي، وكان لديك في الماضي نزيف

دموي في الدماغ (سكنة دماغية) أو كان لديك انسداد في الشريان الصغير الذي تزود النسيج الدماغي

العميق (الدماغي)، أو إذا كان لديك خثرة دموية في الدماغ (سكنة دماغية إقفارية، غير

جوبيّة) في الشهر الماضي.

• كنت تعاني من مرض في الكبد يسبب ارتفاعاً في خطر نشوء نزيف دموي.

• كنت حاملاً أو مرضعاً.

لا تتناول ريفار تيفع 2.5 ملء وأخرين طبيك إذا انتطبق عليك أحد الأوضاع المذكورة أعلاه.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

لا يجوز استعمال ريفار تيفع 2.5 ملء بالدمج مع أدوية معينة تقلل تخثر الدم مثل برايسوجريل أو كليبيودوجريل.

باستثناء حمض الأسيتيل ساليسيليك (الأسبرين) ووكليبيودوجريل.

يطلب استعمال ريفار تيفع 2.5 ملء توخي الحذر بشكل خاص. قبل البدء بالعلاج بريفار تيفع 2.5 ملء، أخبر

الطبيب.

إذا كنت معرضاً لخطرة عالية لنشوء نزيف دموي، مثلاً قد يحدث في أحد الحالات التالية:

• مرض كولي خطير، لأن وظيفة كلتيك قد تؤثر على كمية الداء الذي يدخل في جسمك.

• كنت تستعمل أدوية أخرى لمنع الخثارات الدموية (مثل: وارفارين، دابيجاتران، أيبوكسابان أو

هيبارين)، عندما تناولت من مضادات تخثر واحد إلى آخر أو عندما تناولت هيبارين من خلال قسطر

وردي أو شريانية لإيقافه مفتوحاً (نظير لاحقاً في البند 2 - "الاقعات بين الأدوية").

• كنت تعاني من نزيف دموي.

• ضغط عدم مترافقاً وغير متوازن بواسطة العلاج الدوائي.

• أمراض في المعدة أو في الأمعاء قد تسبّب نزيفاً دموياً، مثل: التهاب الأمعاء أو المعدة، أو التهاب

في المريء، نزيف، مثلاً، لمرض الارتفاع المعدني المريئي (مرض يعطى فيه الشخص من المعدة إلى

المريء)، أو أورام موضعها في المعدة أو في الأمعاء أو في الأعضاء التناسلية أو في المسالك البولية.

• مشاكل في الأوعية الدموية في شبكي العين (اعتلال الشبكية).

• مرض رئوي توسيعه الشعوب الهوائية ومتناول بالإنفرازات الفحصية (برونكوبكتازيس - توسيع

القصبات) أو نزيف دموي سابق من الرئة.

• كان عمرك فوق 75 عاماً.

• كان وزنك 60 كجم أو أقل.

• إذا كان لديك مرض الشريان الناري مع فشل قلبي خطير مصحوب بالأعراض.

• إذا وجد لديك مرض صمام قلبي اصطداعي.

• إذا كنت تعلم أنك تعاني من مرض اسمه متلازمة أضداد الفوسفوليبيد (اضطراب في الجهاز المناعي

يسبب ارتفاعاً في حرارة شوارد خثارات دموية، فأخرين طبيك وهو سبّر ما إذا كان يجب تغيير العلاج

إذا تقطفت لعنة حادحة تحدثها ذلك الطبيب.

• إذا كانت رجارتكم تختمن قسطراً أو حقنة داخل النخاع (مثلاً للتخدير فوق الجافية أو التخدير النخاعي

أو لتسكين الآلام):

• من المهم جداً تناول ريفار تيفع 2.5 ملء قبل وبعد الحقنة، أو قبل وبعد القسطرة بالضبط في

الأوقات التي حددها ذلك الطبيب.

• راجع الطبيب المعالج فوراً إذا كنت تعاني من خثر (انعدام الإحساس) أو من ضعف في الرجلين

أو من مشاكل في الأمعاء أو في المثانة البولية بعد تلاشي التخدير، لأن هناك حاجة إلى تدخل

طبي طارئ.

الأولاد والمراهقون

هذا الدواء غير مخصص للأولاد والمراهقين الذين عمرهم أقل من 18 عاماً.

لا تتوفر معلومات كافية حول الاستعمال لدى الأولاد والمراهقين.

الاقعات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات:

غذائية، فأخرين طبيك أو الصيدلي بذلك خاصة إذا كنت تستعمل:

أدوية مغيبة مصنفة للثلوثن الفطري (مثل: فلوكوكنازول، إيتراكونازول، فوروكنازول، بوساكونازول)،

باستثناء تلك المخصصة فقط للذهن على الجلد.

أقراص تحتوي على كيتوكونازول لعلاج متلازمة كوشنج - وهي حالة ينتج فيها الجسم فائضاً من

الكورتيزول.

أدوية مغيبة مصنفة للثلوثن الجرثومية (مثل: كلاراثروميتسين، إيريثروميسين).

أدوية أخرى مضادة للفيروسات لعلاج ثبوت فيروس العوز المناعي البشري (HIV)/مرض الإيدز (مثل:

أسيتوناير، فلوكوكنازول، إيتراكونازول، فوروكنازول، بوساكونازول، يونيوكونازول، فينيوكونازول،

أقراص تحتوي على كيتوكونازول لعلاج متلازمة كوشنج - وهي حالة ينتج فيها الجسم فائضاً من

الدروز).

أدوية مغيبة مصنفة للالتهابات والمسكك للالم (مثل: باروكوكين أو حمض الأسيتيل ساليسيليك [الأسبرين]).

دروزونارون، دواء لعلاج التضخم غير المتنظم.

أدوية مغيبة لعلاج الأكتانبات (متباينات قنوات البوتاسيوم) أو مثبطات استرداد السيروتونين والنور-إبينفينرين (SNRIs).

هذه الأدوية قد تؤدي إلى خفض فاعلية بريفار تيفع 2.5 ملء، سيفر طبيك ما إذا كان سيعالج بريفار تيفع

2.5 ملء وما إذا كانت هناك حاجة إلى مرآبة طبية عن كثب.

استعمال الدواء والطعام

يمكن تناول ريفار تيفع 2.5 ملء مع الطعام أو بدون.

لا تستعمل بريفار تيفع 2.5 ملء إذا كنت حاماً أو مرضعاً.

إذا كان هناك احتمال أن تحلي، فعليك استعمال سهلة موثوقة بها لمنع الحمل في فترة استعمال ريفار تيفع

2.5 ملء.

سانت جونس وورز، مستحضر نباتي لعلاج الأكتانبات (العرن، فينوباربيتال،

ريفاربيتلين) (مضاد حيوى).

هذه الأدوية قد تؤدي إلى خفض فاعلية بريفار تيفع 2.5 ملء سيفر طبيك ما إذا كان سيعالج بريفار تيفع

2.5 ملء وما إذا كانت هناك حاجة إلى مرآبة طبية عن كثب.

استعمال الدواء والطعام

يمكن تناول ريفار تيفع 2.5 ملء مع الطعام أو بدون.

الحمل، الإلراعة والمحضوية

لا تستعمل بريفار تيفع 2.5 ملء إذا كنت حاماً أو مرضعاً.

إذا كان هناك احتمال أن تحلي، فعليك استعمال سهلة موثوقة بها لمنع الحمل في فترة استعمال ريفار تيفع

2.5 ملء.

سانست جونس وورز، مستحضر نباتي لعلاج الأكتانبات (العرن، فينوباربيتال،

ريفاربيتلين) (مضاد حيوى).

هذه الأدوية قد تؤدي إلى خفض فاعلية بريفار تيفع 2.5 ملء سيفر طبيك ما إذا كان سيعالج بريفار تيفع

2.5 ملء وما إذا كانت هناك حاجة إلى مرآبة طبية عن كثب.

استعمال الدواء والطعام

يمكن تناول ريفار تيفع 2.5 ملء مع الطعام أو بدون.

الحمل، الإلراعة والمحضوية

لا تستعمل بريفار تيفع 2.5 ملء إذا كنت حاماً أو مرضعاً.

إذا كان هناك احتمال أن تحلي، فعليك استعمال سهلة موثوقة بها لمنع الحمل في فترة استعمال ريفار تيفع

2.5 ملء.

أدوية مغيبة لعلاج الصداع (مثل: فينوباربيتلين، كاربامازيبين، فينوباربيتال).

سانست جونس وورز، مستحضر نباتي لعلاج الأكتانبات (العرن، فينوباربيتال،

ريفاربيتلين) (مضاد حيوى).

هذه الأدوية قد تؤدي إلى خفض فاعلية بريفار تيفع 2.5 ملء سيفر طبيك ما إذا كان سيعالج بريفار تيفع

2.5 ملء وما إذا كانت هناك حاجة إلى مرآبة طبية عن كثب.

استعمال الدواء والطعام

يمكن تناول ريفار تيفع 2.5 ملء مع الطعام أو بدون.

الحمل، الإلراعة والمحضوية

لا تستعمل بريفار تيفع 2.5 ملء إذا كنت حاماً أو مرضعاً.

إذا كان هناك احتمال أن تحلي، فعليك استعمال سهلة موثوقة بها لمنع الحمل في فترة استعمال ريفار تيفع

2.5 ملء.

أدوية مغيبة لعلاج الصداع (مثل: فينوباربيتلين، كاربامازيبين، فينوباربيتال).

سانست جونس وورز، مستحضر نباتي لعلاج الأكتانبات (العرن، فينوباربيتال،

ريفاربيتلين) (مضاد حيوى).

هذه الأدوية قد تؤدي إلى خفض فاعلية بريفار تيفع 2.5 ملء سيفر طبيك ما إذا كان سيعالج بريفار تيفع

2.5 ملء وما إذا كانت هناك حاجة إلى مرآبة طبية عن كثب.

استعمال الدواء والطعام

يمكن تناول ريفار تيفع 2.5 ملء مع الطعام أو بدون.

الحمل، الإلراعة والمحضوية

لا تستعمل بريفار تيفع 2.5 ملء إذا كنت حاماً أو مرضعاً.

إذا كان هناك احتمال أن تحلي، فعليك استعمال سهلة موثوقة بها لمنع الحمل في فترة استعمال ريفار تيفع

2.5 ملء.

أدوية مغيبة لعلاج الصداع (مثل: فينوباربيتلين، كاربامازيبين، فينوباربيتال).

سانست جونس وورز، مستحضر نباتي لعلاج الأكتانبات (العرن، فينوباربيتال،

ريفاربيتلين) (مضاد حيوى).

هذه الأدوية قد تؤدي إلى خفض فاعلية بريفار تيفع 2.5 ملء سيفر طبيك ما إذا كان سيعالج بريفار تيفع

2.5 ملء وما إذا كانت هناك حاجة إلى مرآبة طبية عن كثب.

استعمال الدواء والطعام

يمكن تناول ريفار تيفع 2.5 ملء مع الطعام أو بدون.

الحمل، الإلراعة والمحضوية

لا تستعمل بريفار تيفع 2.5 ملء إذا كنت حاماً أو مرضعاً.

إذا كان هناك احتمال أن تحلي، فعليك استعمال سهلة موثوقة بها لمنع الحمل في فترة استعمال ريفار تيفع

2.5 ملء.

أدوية مغيبة لعلاج الصداع (مثل: فينوباربيتلين، كاربامازيبين، فينوباربيتال).

سانست جونس وورز، مستحضر نباتي لعلاج الأكتانبات (العرن، فينوباربيتال،

ريفاربيتلين) (مضاد حيوى).

هذه الأدوية قد تؤدي إلى خفض فاعلية بريفار تيفع 2.5 ملء سيفر طبيك ما إذا كان سيعالج بريفار تيفع

2.5 ملء وما إذا كانت هناك حاجة إلى مرآبة طبية عن كثب.

استعمال الدواء والطعام

يمكن تناول ريفار تيفع 2.5 ملء مع الطعام أو بدون.

الحمل، الإلراعة والمحضوية

لا تستعمل بريفار تيفع 2.5 ملء إذا كنت حاماً أو مرضعاً.

إذا كان هناك احتمال أن تحلي، فعليك استعمال سهلة موثوقة بها لمنع الحمل في فترة استعمال ريفار تيفع

2.5 ملء.

أدوية مغيبة لعلاج الصداع (مثل: فينوباربيت