

<div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div><span></span></div>	<b>نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986</b>	<div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div><span></span></div>
	يسوّق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط	

## ريزاتريپتان إينوفامد 10 ملغ أقراص

يحتوي كل قرص على:	يحتوي كل قرص ذوَابِ على:
Rizatriptan 10 mg (as benzoate)	Rizatriptan 10 mg (as benzoate)
ريزاتريپتان 10 ملغ	ريزاتريپتان 10 ملغ
(على شكل بنزوات)	(على شكل بنزوات)

لقائمة المواد غير الفعّالة ومولدات الحساسية في المستحضر، أنظر الفقرة 2 «معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء» والفقرة 6 «معلومات إضافية».

ما لم يذكر خلاف ذلك، فإن المعلومات الواردة في هذه النشرة للمستهلك تنطبق على **ريزاتريپتان إينوفامد 10 ملغ** أقراص و**ريزاتريپتان ذوَابِ إينوفامد 10 ملغ** أقراص ذوّابة.

**اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.**

● تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفّرت لديك أسئلة إضافية، راجع طبيبك أو الصيدلي.

● وُصِف هذا الدواء للعلاج من آجلك، لا تعطه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

● الدواء مخصص للكبار فوق عمر 18 سنة.

### 1) لأي غرض مخصص الدواء؟

ريزاتريپتان يُستعمل للعلاج الحاد في نوبات الشقيقة (الميجرينا) لدى الكبار، مع أو بدون هالة (أورة).

لا يجوز إستعمال ريزاتريپتان لمنع حدوث نوبات الشقيقة.

ريزاتريپتان غير مخصص لعلاج الشقيقة الفالجية أو القاعدية. من غير المعروف فيما إذا كان ريزاتريپتان آمن وناجح في علاج الصداع العنقودي.

**الفصيلة العلاجية:** من عائلة الأدوية المسماة بالناهضات الإنتقائية للمستقبل 5-HT<sub>1B/1D</sub> أو التريپتانات.

### 2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال ريزاتريپتان إذا:

- كنت حساساً (البرجي) للمادة الفعّالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء، المذكورة في الفقرة 2 وفي الفقرة 6.

- يوجد لديك أو كان لديك في الماضي مشاكل في القلب.
● يوجد لديك أو كان لديك في الماضي سكتة دماغية أو نوبة إقفارية عابرة (TIA).

- يوجد لديك أو كان لديك في الماضي مشاكل في الأوعية الدموية بما في ذلك مرض إقفاري في الأمعاء.

- يوجد لديك ضغط دم مرتفع غير متوازن.

- كنت تتناول بشكل متزامن أدوية مضادة للإكتئاب من نوع مثبّطات مونوأمين أوكسيداز (MAO) مع تناول مثبّط

MAO خلال الأسبوعين الماضيين.

- كنت قد تناولت أي دواء آخر من نفس الفصيلة (التريپتانات) مثل سوماتريپتان، ناراتريپتان، زولميتريپتان أو إيليتريپتان، لعلاج الشقيقة لديك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

- كنت قد تناولت أدوية تحتوي على إرجوتامين مثل إرجوتامين، ديهيدروإرجوتامين، أو ميثيسرجيد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

- كنت تعاني من شقيقة فالجية أو قاعدية.

تحدث مع طبيبك قبل أن تتناول ريزاتريپتان إذا كنت تعاني من إحدى الحالات المذكورة أعلاه أو إذا لم تكن واثقاً فيما إذا كنت تتناول إحدى الأدوية المذكورة أعلاه.

**تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء**

**قبل العلاج بـ ريزاتريپتان، أخبر طبيبك إذا:**

- يوجد لديك أو كان لديك في الماضي مشاكل في القلب (مثل نوبة قلبية، إنخفاض ترويض الدم للقلب أو تغيرات في نظم أو في معدل نبضات القلب)، ضغط دم مرتفع، ألم في الصدر أو ضيق في التنفس.

- كان لديك أي عامل خطورة للإصابة بأمراض القلب أو مرض في الأوعية الدموية مثل ضغط دم مرتفع، سكري، ارتفاع الكوليسترول، سمنة مفرطة، تدخين، تاريخ عائلي لمشاكل في القلب، كنت امرأة بعد إنقطاع الدورة الشهرية، كنت رجلاً فوق عمر 40 سنة.

- يوجد لديك أو كان لديك في الماضي أية حساسيات.

- كنت تعاني من بيلة الفينيل كيتون (PKU). ريزاتريپتان ذوَابِ إينوفامد 10 ملغ أقراص ذوّابة يحتوي على فينيل ألانين (أنظر الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء").

- كنت حاملاً أو تخططين للحمل، أو إذا كنت مرضعة، أو تخططين للإرضاع.

- كنت تتناول أو تخطط لتناول أية أدوية، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية، والأدوية التي تتناولها عادة للشقيقة، حيث

من الجائز أن يتفاقم الصداع لديك (overuse headache) كنتيجة للإستعمال الزائد لأدوية الشقيقة (مثل: إرجوتامين، التريپتانات، الأفيونيات، أو دمج هذه الأدوية لمدة تزيد عن 10 أيام في الشهر).

- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من مشاكل في الكلية أو في الكبد.

إذا كنت تتناول ريزاتريپتان بشكل متكرر جداً، فإن هذا الأمر قد يسبب لك حدوث حالات صداع مزمن. في مثل هذه الحالات، يجب عليك التوجه لطبيبك، وذلك لأنه من الجائز أن تحتاج إلى التوقف عن تناول ريزاتريپتان.

- كنت تعاني من مشاكل طبية أخرى.

أخبر الطبيب عن الأعراض التي تظهر لديك. سيقدر طبيبك فيما إذا كنت تعاني من الشقيقة. يجب تناول ريزاتريپتان فقط في حالة حدوث نوبة شقيقة. لا يجوز إستعمال ريزاتريپتان لعلاج حالات الصداع التي من الممكن أن يكون سببها حالات عصبية أخرى، أكثر خطورة.

**التداخلات/التفاعلات بين الأدوية**

في إذا كنت تستعمل أو إذا إستعملت مؤخراً أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدية عن ذلك.

**الأدوية التي لا يجوز تناولها بالتزامن مع ريزاتريپتان**

- لا يجوز تناول ريزاتريپتان مع أي مستحضر آخر من نفس العائلة (التريپتانات) خلال 24 ساعة، مثل سوماتريپتان، ناراتريپتان، زولميتريپتان أو إيليتريپتان.

- لا يجوز تناول ريزاتريپتان خلال 24 ساعة من موعد تناول أدوية تحتوي على إرجوتامين مثل إرجوتامين، ديهيدروإرجوتامين، أو ميثيسرجيد لعلاج الشقيقة لديك.

- لا يجوز تناول ريزاتريپتان عندما تتناول أدوية مضادة للإكتئاب من نوع مثبّطات مونوأمين أوكسيداز (MAO) مثل موكلوبيميدي، إيزوكاربوكسازيد، فينيلزين أو ترانيلسيپرومين، وبارجيلين أو في حالة مرور أقل من أسبوعين منذ التوقف عن تناول مثبّط MAO.

**يجب إخبار الطبيب أو الصيدلي بالأخص إذا كنت تتناول:**

- أدوية تحتوي على پروپرانولول.

- أدوية تُستعمل لعلاج إضطرابات المزاج، بما في ذلك أدوية من فصيلة مثبّطات إعادة إمتصاص السيروتونين (SSRIs) مثل فلوأوكسيتين، فلوفوكسامين، پاروكسيتين، إيسيتالوپرام أوكسالات وسيرترالين أو مثبّطات إعادة إمتصاص السيروتونين- نورإيپنفرين (SNRIs) مثل فينيلفاكسين ودولوكسيتين للإكتئاب.

**إستعمال الدواء والطعام**

من الجائز أن يستغرق ريزاتريپتان وقتاً أطول حتى يعمل إذا تم تناوله بعد الطعام. على الرغم من أنه من الأفضل تناوله على معدة فارغة، إلا أنه لا يزال بإمكانك تناوله إذا أكلت.

**الحمل والإرضاع**

من غير المعروف فيما إذا كان ريزاتريپتان يضر بالجنين عندما يتم تناوله من قبل امرأة حامل.

أخبري الطبيب قبل تناول الدواء إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل.

من غير المعروف فيما إذا كان ريزاتريپتان ينقل لحليب الأم. إذا كنت مرضعة أو تخططين لإرضاع، إستشيري طبيبك. يجب الإمتناع عن الإرضاع خلال 24 ساعة بعد العلاج.

يجب إستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل إستعمال الأدوية.

**السياقة وإستعمال الماكنتا**

ريزاتريپتان قد يسبب الدوار، النعاس، الإرهاق، الضعف أو الإغماء. إذا كنت تشعر بتلك الأعراض، فلا يجوز سياقة السيارة، تشغيل الماكنتا الخطرة أو العمل بأي نشاط آخر يستلزم اليقظة.

**معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء**

**ريزاتريپتان إينوفامد 10 ملغ:** يحتوي قرص من ريزاتريپتان إينوفامد 10 ملغ على لاكتوز مونوهيدرات وهو نوع من السكر. إذا تم إيجابك من قبل الطبيب بأنك تعاني من عدم تحمل اللاكتوز أو بأنه ليس بإمكانك هضم سكريات معينة، فقم بإستشارة الطبيب قبل تناول هذا الدواء.

**ريزاتريپتان ذوَابِ إينوفامد 10 ملغ:**

- يحتوي هذا الدواء على 3.741 ملغ أسبرتام في كل قرص ذوَابِ من ريزاتريپتان ذوَابِ إينوفامد 10 ملغ. أسبرتام هو مصدر للفينيل ألانين. هذا الأمر قد يضرك إذا كنت تعاني من بيلة الفينيل كيتون (PKU)، وهو إضطراب وراثي نادر يتراكم فيه الفينيل ألانين لأن الجسم لا يستطيع التخلص منه كما ينبغي.
- يحتوي هذا الدواء على أقل من- 23 ملغ من الصوديوم في القرص الذوّابِ وبالتالي يعتبر خالٍ من الصوديوم.

### 3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب إستعمال المستحضر دائماً بحسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر. المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

RIZA TAB-STAB PL SH 070422

المقدار الدوائي الأقصى هو 30 ملغ ريزاتريپتان في غضون 24 ساعة. لا يجوز تناول أكثر من- 30 ملغ ريزاتريپتان في غضون 24 ساعة (مثلاً، لا يجوز تناول أكثر من ثلاثة أقراص أو أقراص ذوابة ذات 10 ملغ في غضون 24 ساعة).

**بعض المتعالجين يجب أن يتلقوا مقداراً دوائياً أقل من ريزاتريپتان، خاصة مجموعات المتعالجين التالية:**

● متعالجون يتناولون پروپرانولول

● ضرر متوسط حتى شديد في الكبد

● خلل في وظيفة الكلى

● متعالجون مسنون

إذا لم يكن المقدار الدوائي المنخفض ممكناً، فيجب على الطبيب التفكير في علاجات بديلة لهؤلاء المتعالجين، مثلاً، ناهضات 5-HT<sub>1B/1D</sub> أخرى.

**هذا الدواء غير مخصص لإعطاء للأطفال والمراهقين دون عمر 18 سنة.**

معظم نوبات الشقيقة يتم تخفيفها بواسطة ريزاتريپتان. ولكن، عند بعض المتعالجين، فإنه من الجائز أن تعود أعراض الشقيقة مجدداً في غضون 24 ساعة. في حال عودة الشقيقة لديك، بالإمكان تناول جرعة إضافية من ريزاتريپتان. دائماً يجب الإنتظار على الأقل ساعتين بين كل جرعة وأخرى. في حال عدم إستجابتك لـ ريزاتريپتان خلال النوبة، فيوصى بعدم تناول ريزاتريپتان لعلاج ذات النوبة، لكن، لا يزال بإمكانك أن تستجيب لـ ريزاتريپتان في النوبة التالية.

### طريقة الإستعمال

**ريزاتريپتان إينوفامد 10 ملغ:** يجب بلع القرص بأكمله مع سائل. لا تتوفر معلومات بخصوص سحق/شطر/مضغ الأقراص.

**ريزاتريپتان ذوَابِ إينوفامد 10 ملغ:** أبقِ القرص الذوّابِ في عبوته حتى اللحظة التي تكون فيها مستعداً لتناولها.

يجب فتح عبوة اللويحة بيدين جافتين ووضع القرص الذوّابِ على اللسان، هناك سوف تذوب بسرعة وسيتم بلعه مع لعابك. لا حاجة لتناولها مع سائل. بالإمكان تناول القرص الذوّابِ دون علاقة لوجبات الطعام.

**إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكثر مما كنت بحاجة إليه:** إذا قمت بتناول ريزاتريپتان أكثر مما كنت بحاجة إليه، فتوجه لطبيبك على الفور أو توجه حالاً لغرفة الطوارئ في المستشفى الأقرب إليك.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علية الدواء.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر لذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

### 4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال ريزاتريپتان قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين.

لا تندمش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

**يجب التوجه إلى الطبيب أو الذهاب إلى غرفة الطوارئ في المستشفى الأقرب إليك فوراً، إذا تطورت لديك أي من الأعراض الجانبية الخطيرة لـ ريزاتريپتان والتي تشمل:**

● **نوبة قلبية.** أعراض النوبة القلبية قد تشمل:

- إنزعاج في مركز الصدر والذي يستمر لمدة تزيد عن عدة دقائق أو الذي يختفي ويعود مجدداً
- إنزعاج في الصدر والذي يشبه الشعور بالضغط غير المريح، إنضغاط، شعور بالإملاء أو ألم
- ألم أو إنزعاج في الذراعين، الظهر، الرقبة، الفك أو في البطن
- ضيق في التنفس مع أو بدون إنزعاج في الصدر
- تعرق بارد
- غثيان أو تقيؤ
- شعور بالدوار

● **سكتة دماغية.** أعراض السكتة الدماغية قد تشمل الأعراض الفجائية التالية:

- خدر أو ضعف في الوجه، في الذراعين أو في الرجلين، خاصة في جانب واحد من الجسم
- إرتباك، مشاكل في النطق أو في الفهم
- مشاكل في الرؤية في عين واحدة أو في كلتا العينين
- مشاكل في المشي، دوام، عدم توازن أو عدم التنسيق
- صداع شديد مجهول السبب

● **مشاكل في الأوعية الدموية.** أعراض لمشاكل في الأوعية الدموية قد تشمل:

- ألم في البطن
- إسهال دموي
- مشاكل في الرؤية
- برودة وخدر في اليدين وفي الرجلين

● **متلازمة السيروتونين.** حالة تسمى بمتلازمة السيروتونين قد تحدث عندما يتم تناول أدوية من نوع التريبتانات مثل ريزاتريبتان مع أدوية معينة أخرى. أعراض متلازمة السيروتونين قد تشمل:

- عدم هدوء
- هلوسات
- غيبوبة
- نظم قلب سريع
- تغيرات سريعة في ضغط الدم
- إرتفاع في درجة حرارة الجسم
- تشنجات عضلية
- فقدان التوازن
- غثيان، تقيؤ أو إسهال

● **ضغط دم مرتفع.**● **ردود فعل تحسسية** تشمل إنتفاخ في الوجه، الشفتين، اللسان و/أو في الحنجرة والذي قد يؤدي إلى صعوبة في التنفس و/أو في البلع، صغير، شرى، طفح وتقشر شديد في الجلد.

بالإضافة إلى ذلك، أخير طبيبك إذا كنت تعاني من أعراض تدل على حدوث رد فعل تحسسي (مثل الطفح أو الحكة) بعد تناول ريزاتريبتان.

● **أعراض جانبية إضافية:**

الأعراض الجانبية الأكثر شيوعاً لـ ريزاتريبتان تشمل:

- شعور بالنعاس أو إرهاق
- ألم أو شعور بالضغط في الصدر أو في الحنجرة
- دوام

أعراض جانبية أخرى (شائعة: 1 حتى 10 لكل 100 متعالج؛ غير شائعة: 1 حتى 10 لكل 1,000 متعالج؛ نادرة: 1 حتى 10 لكل 10,000 متعالج) وأعراض جانبية ذات شيوع غير معروف:

● **إضطرابات في الجهاز المناعي:** نادرة: رد فعل تحسسي

(حساسية مفردة)، رد فعل تحسسي فجائي مهدد للحياة (تأق).

**إضطرابات في الجهاز الهضمي:** شائعة: غثيان، تقيؤ، إسهال، جفاف في الفم؛ غير شائعة: عطش، صعوبات في الهضم (عسر الهضم).

**إضطرابات في الجهاز التنفسي، القصبة الهوائية وتجويف الصدر:** شائعة: إنزعاج/ألم في الحنجرة؛ صعوبة في التنفس (ضيق في التنفس): نادرة: صغير.

**إضطرابات في الهيكل العظمي، العضلات والأنسجة الضامة:** شائعة: شعور بالثقل في أجزاء من الجسم، ألم في الرقبة؛ غير شائعة: شعور بالشد في أجزاء معينة من الجسم، ضعف في العضلات، تصلب، ألم في العضلات وألم في الوجه.

**إضطرابات في الجلد وفي السنج تحت الجلد:** شائعة: تورّد (احمرار في الوجه يستمر لمدة قصيرة)؛ غير شائعة: تعرق، حكة، طفح يتميز بظهور كدمات مرتفعة عن سطح الجلد (شرى)، طفح، وذمة وعائية (إنتفاخ الوجه، الشفتين، اللسان و/أو الحنجرة والذي قد يسبب صعوبات في التنفس و/أو في البلع).

**إضطرابات قلبية.** شائعة: نظم قلب سريع أو غير منظم (خفقان)؛ غير شائعة: نظم قلب سريعة جدا (tachycardia)، تغيرات في نظم أو في معدل نبضات القلب (إضطراب النظم)، نظم قلب بطيء (bradycardia)، إكتشافات شاذة في تخطيط كهربائية القلب (ECG - فحص يسجل النشاط الكهربائي للقلب)؛ نادرة: سكتة ( تحدث عادة عند المتعالمين الذين لديهم عوامل خطورة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (ضغط دم مرتفع، سكري، تدخين، إستعمال بدائل النيكوتين، سابقة عائلية لأمراض القلب أو السكتة، الرجال فوق عمر 40 سنة، النساء بعد توقف الدورة الشهرية، مشكلة معينة في طريقة نبض قلبك [إحصار الحزمية - bundle branch block]).

**إضطرابات في الأوعية الدموية:** غير شائعة: ضغط دم مرتفع؛ نادرة: هبات من الحر: نات شيع غير معروف - إقفار في الأوعية الدموية المحيطة.

**إضطرابات في الجهاز العصبي:** شائعة: دوام، نعاس، إحساس بالتنميل في الجلد (تنمل)، صداع، إنخفاض في حساسية الجلد (نقص الحس)، إنخفاض الحدة الذهنية، إرتجاف؛ غير شائعة: مذاق سيء في الفم، عدم الثبات عند المشي (ترنح)، فيرتيغو؛ نادرة: إغماء.

**إضطرابات نفسية:** غير شائعة: إرتباك/توهان، أرق.

**إضطرابات في العينين:** غير شائعة: رؤية مشوشة.

**إضطرابات عامة وحالات متعلقة بموضع إعطاء الدواء:** شائعة: ألم في البطن أو في الصدر، إرهاق.

أعراض جانبية تم الإبلاغ عنها ذات شيوع غير معروف (أعراض جانبية شيعوها لم يحدد بعد):

- نوبة قلبية، تقلص الأوعية الدموية في القلب (تحدث عادة عند المتعالمين الذين لديهم عوامل خطورة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (ضغط دم مرتفع، سكري، تدخين، إستعمال بدائل النيكوتين، سابقة عائلية لأمراض القلب أو السكتة، الرجال فوق عمر 40 سنة، النساء بعد توقف الدورة الشهرية، مشكلة معينة في طريقة نبض القلب لديك [إحصار الحزمية - bundle branch block]).

- تقشر شديد في الجلد، مع أو بدون سخونة (تقشر الأنسجة المتموثة البشرية التسممي - Toxic epidermal necrolysis).

- إختلاجات (تشنجات/نوبات صرع).

- متلازمة تسمى بـ "متلازمة السيروتونين" والتي قد تؤدي لأعراض جانبية مثل: غيبوبة، ضغط دم غير ثابت، حرارة جسم

مرتفعة بشكل شاذ، قلة تناسق العضلات، عدم هدوء وهلوسات.

- تقلص الأوعية الدموية في الأطراف، بما في ذلك برودة وخدر باليدين أو بالرجلين.

- تقلص الأوعية الدموية في الأمعاء الغليظة والذي قد يؤدي لألم في البطن.

- إضطرابات في الرؤية مثل وميض، إنخفاض في الرؤية، رؤية مزدوجة، فقدان الرؤية وفي بعض الحالات خلل غير عكوس في الرؤية (على الرغم من أن هذه الأعراض قد تكون بسبب نوبة الشقيقة نفسها).

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمتم إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي»، الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. **كيفية تخزين الدواء؟**

● **تجنب التسمم!** يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وبذلك تتفادى إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

● لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العبوة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

● يجب التخزين في درجة حرارة دون 25 درجة مئوية.

● لا يجوز رمي الأدوية في المجاري أو في القمامة المنزلية. إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. هذه الوسائل تساعد في الحفاظ على البيئة.

6. **معلومات إضافية**

بالإضافة للمادة الفعالة، يحتوي ريزاتريبتان إينوفامد 10 ملغ أيضاً على:

Microcrystalline cellulose (PH-101), lactose monohydrate, maize starch, pregelatinized starch, magnesium stearate, ferric oxide red.

بالإضافة للمادة الفعالة، يحتوي ريزاتريبتان ذواب إينوفامد 10 ملغ أيضاً على:

Microcrystalline cellulose (PH-101), mannitol, pregelatinized starch, crospovidone (type A), aspartame, peppermint flavor (maltodextrin, natural flavors, modified corn starch), sodium stearyl fumarate.

● **كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:**

ريزاتريبتان إينوفامد 10 ملغ: قرص غير مطلي ذو لون وردي فاتح، مدور، مسطح، جانب واحد منه محتوم بـ "X" والجانب الآخر محتوم بـ "14".

ريزاتريبتان ذواب إينوفامد 10 ملغ: قرص باللون الأبيض حتى كريمي، مدور، محدب من كلا الجانبين، جانب واحد منه محتوم بـ "F25" والجانب الآخر أملس. القرص بطعم النعناع.

● **حجم العبء:**

ريزاتريبتان إينوفامد 10 ملغ: عبء تحتوي على 1، 2، 3، 6، 12 أو 18 قرصاً.

ريزاتريبتان ذواب إينوفامد 10 ملغ: عبء تحتوي على 2، 3، 6، 10، 12 أو 18 قرصاً ذواباً.

من الجائز ألا تسوق كافة أحجام العبء.

إسم المنتج وعنوانه: أوروبيندو فارما، القطعة 2#، مايتريفيهار، أميريت، حيدر آباد، 500 038، الهند.

صاحب الإمتياز والمستورد وعنوانه: إينوفامد م.ض.ص.ب. 62، إيفن يهودا 40500.

تم إعدادها في آذار، 2022 بحسب تعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

ريزاتريبتان إينوفامد 10 ملغ: 155.08.34133

ريزاتريبتان ذواب إينوفامد 10 ملغ: 155.09.34154

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.