

نشرة للمستهلك وفق أنظمة الصيدالة (مستحضرات) - 1986

يُسوّق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

بروكينسا 80 ملغ BRUKINSA 80 mg

تحتوي كل كبسولة على 80 ملغ زانوبروتينيب (zanubrutinib)

المواد غير الفعالة ومُسببات الحساسية في المستحضر: انظر البند 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، فتوجه إلى الطبيب أو الصيدلي. وُصِف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطه للآخرين؛ لأنه قد يضرهم، حتى لو بدا لك تشابه بين مرضك ومرضهم.

النساء: يجب تجنب الحمل أثناء العلاج ولمدة أسبوع منذ تلقي الجرعة الأخيرة من بروكينسا. عليك استعمال وسيلة منع الحمل أثناء العلاج حتى أسبوع على الأقل منذ انتهاء الجرعة الأخيرة من بروكينسا.
الرجال: عليك تجنب أن تتسبب بحمل شريكة حياتك أثناء العلاج ولمدة أسبوع منذ تلقي الجرعة الأخيرة من بروكينسا. عليك استعمال وسيلة منع الحمل أثناء العلاج ولمدة أسبوع منذ تلقي الجرعة الأخيرة من بروكينسا.
عليك استعمال وسيلة وقاية من الشمس أثناء التعرض للشمس.

1. لم أعد هذا الدواء؟

بروكينسا معدّ لعلاج المرضى البالغين الذين لديهم:

- ليمفوما خلايا القشرية (MCL) Mantle Cell Lymphoma) والذين كانوا قد تلقوا علاجًا واحدًا سابقًا على الأقل للمرض.
 - وجود الغلوبولين الكبروي في الدم المنسوب لفاقدنشتروم (WM)
- المجموعة العلاجية - موادّ مضادة للأورام، مثبطات بروتين كيناز.

2. قبل استعمال الدواء

يُمنع استعمال الدواء إذا:

- كنت حساسًا (لديك حساسية) لزانوبروتينيب أو لكل واحد من المكونات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6 "معلومات إضافية").

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

قبل بدء العلاج ببروكينسا أخبر الطبيب إذا:

- كنت تعاني من النزيف.
- قد يفكر طبيبك في إيقاف تناول بروكينسا لمدة 3-7 أيام قبل أو بعد عملية جراحية، إجراء طبي أو إجراء متعلق بطب الأسنان.
- كنت تعاني من عدوى.
- كنت تعاني أو عانيت من اضطرابات في وتيرة نظم القلب.
- كنت تعاني من ضغط دم مرتفع.

- كانت لديك مشاكل في الكبد، بما في ذلك ماضٍ من التهاب الكبد الفيروسي من نوع B (HBV). في حال اضطراب خبير في أداء الكبد، قد يلائم طبيبك جرعتك.

تحذيرات إضافية من المهم معرفتها:

قد يزيد العلاج بـ بروكينسا من خطر حدوث الأعراض الجانبية التالية:

- ظهرت سرطانات جديدة أثناء العلاج بـ بروكينسا، بما في ذلك سرطان الجلد أو في أعضاء أخرى. استعمل وسائل الوقاية من الشمس أثناء التعرض للشمس.

الفحوصات والمتابعة

إذا كنت في سن الإخصاب، فقد يطلب منك الطبيب إجراء فحص حمل قبل البدء باستخدام بروكينسا. أثناء العلاج بـ بروكينسا، يجري الطبيب فحوصات دم لمتابعة تعداد الدم.

التفاعلات/ردود فعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى، بما فيها أدوية دون وصفة طبية ومكملات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. لا سيما إذا كنت تتناول:

- مستحضرات مثبطة لإنزيم CYP3A مثل:
 - أدوية لعلاج الفطريات مثل إيتراكونازول أو فلوكونازول.
 - أدوية مضادات حيوية مثل كلاريثروميسين أو إريثروميسين.
 - دواء لعلاج ضغط الدم المرتفع والذبحة الصدرية - ديلتيازيم.
- الإعطاء بالتزامن مع أحد الأدوية أعلاه قد يرفع تركيز بروكينسا في الدم.

- مستحضرات تحرض إنزيم CYP3A مثل:
 - نوع من مضاد حيوي يُعطى لعلاج السل - ريفامبين.
 - مستحضر لعلاج الإيدز/HIV- إيفافيرينز.
- الإعطاء بالتزامن مع أحد الأدوية التالية قد يخفض تركيز بروكينسا في الدم.

إذا كنت تتلقى علاجًا بميدازولام، دواء يُعطى للتخدير، فإن الإعطاء بالتوازي مع بروكينسا قد يخفض تركيز ميدازولام في الدم. إذا كنت تتلقى علاجًا بأوميبرازول، دواء يقلل إفراز حمض المعدة، فإن الإعطاء بالتزامن مع بروكينسا قد يخفض تركيز أوميبرازول في الدم. إذا كنت تتلقى علاجًا بديجوكسين، الذي يُعطى لعلاج أمراض قلبية مختلفة من بينها اضطرابات في الوتيرة، رجفان أذيني وقصور عمل القلب، فإن الإعطاء بالتزامن مع بروكينسا قد يرفع مستوى ديجوكسين في الدم.

استعمال الدواء والغذاء

يمكن تناول بروكينسا مع طعام أو بدونه.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

الحمل

قد يلحق الدواء ضررًا بالجنين. على النساء في سن الإخصاب أن يتجنبن أن يصبحن حوامل قبل أو أثناء العلاج بـ بروكينسا، وأن يستعملن وسائل منع حمل ناجعة أثناء العلاج بالدواء، ولمدة أسبوع منذ تناول الجرعة الأخيرة. على الرجال أن يتجنبوا التسبب بأن تصبح النساء حوامل طالما أنهم يتلقون علاجًا بـ بروكينسا، ولمدة أسبوع منذ تناول الجرعة الأخيرة.

الإرضاع

ليست هناك بيانات تشير إلى وجود زانوبروتينيب في حليب الأم أو إلى التأثير على إنتاج الحليب أو على الطفل الرضيع. نظرًا لخطر حدوث أعراض جانبية خطيرة لدى الطفل الرضيع، يوصى للنساء اللواتي يتلقين علاجًا ببروكينسا أن يتجنبن الإرضاع أثناء العلاج بالدواء ولمدة أسبوعين بعد تناول الجرعة الأخيرة.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائمًا حسب تعليمات الطبيب. عليك أن تفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر. الجرعة وطريقة العلاج يحددهما الطبيب فقط. الجرعة الموصى بها عادة هي: 160 ملغ مرتين في اليوم أو 320 ملغ مرة في اليوم حتى تقدم المرض أو حتى تحدث أعراض جانبية تتطلب إيقاف العلاج.

قد تتم ملاءمة الجرعة أثناء تناول بروكينسا مع أدوية أخرى (انظر البند التفاعلات/ردود الفعل بين الأدوية)

في حال وجود اضطراب في أداء الكبد، فإن الجرعة الموصى بها هي 80 ملغ مرتين في اليوم.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

طريقة التناول

يجب ابتلاع الكبسولة كاملة مع كأس ماء. يمنع فتح، كسر، أو مضغ الكبسولة، لأنه لم تُفحص نجاعة المستحضر الذي يتم تناوله بهذه الطرق

إذا تناولت عن طريق الخطأ، جرعة أعلى

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا ابتلع ولد خطأ من هذا الدواء، توجهَ حالاً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ التابعة للمستشفى، مصطحبًا معك عبوة الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، لا يجوز لك تناول جرعة مضاعفة. تناول الجرعة فورًا في نفس اليوم وعد إلى برنامج التناول المتبع في اليوم التالي.

يجب المداومة على العلاج وفق توصيات الطبيب. حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، لا يجوز لك التوقف عن استعمال الدواء من دون استشارة الطبيب.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقق من المصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء.

ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية تتعلق باستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، يمكن أن يسبب استعمال بروكينسا أعراضًا جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تفزع عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. فمن المحتمل ألا تعاني من أيٍّ منها.

يجب التوجه إلى الطبيب فورًا إذا ظهر واحد أو أكثر من الأعراض التالية:

1. نزيف - قد يكون خطيرًا ويؤدي إلى الوفاة. هناك خطر ارتفاع النزيف عند الاستعمال بالدمج مع أدوية

لتمميع الدم.

علامات النزيف:

- دم في البراز (براز أسود)
- بول وردي أو بني
- نزيف غير متوقع أو خطير أو نزيف لا يمكن السيطرة عليه
- تغيير دموي أو تقوي دموي شبيه بحبيبات القهوة

- دم أو خثرات دموية أثناء السعال
- أنزفة دموية مفرطة
- دوار
- ضعف
- ارتباك
- تغييرات في طريقة الكلام
- صداع متواصل

2. عدوى - قد تكون خطيرة وتؤدي إلى الوفاة. علامات العدوى:

- حمى
- قشعريرة
- أعراض شبيهة بالإنفلونزا

3. سرطان أولي ثانوي (متكرر)

عانى المرضى الذين تلقوا علاجا ببروكينسا من أنواع جديدة من السرطان بما في ذلك سرطان الجلد. يجب تجنب التعرض للشمس.

4. اضطرابات في نظم القلب (مثل رجفان أذيني ورفرفة أذينية). العلامات:

- وتيرة نظم قلب سريعة أو غير مستقرة
- دوار
- إغماء
- ضيق في التنفس
- انزعاج في الصدر

5. انخفاض تعداد خلايا الدم البيضاء (خلايا دم بيضاء، صفائح دموية، وخلايا دم حمراء) - يطلب منك طبيبك إجراء فحوصات تعداد الدم طوال فترة العلاج.

أعراض جانبية شائعة جدا - (very common) أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من بين عشرة

- قلة العدلات
- انخفاض تعداد العدلات
- نقص الصفائح الدموية
- انخفاض تعداد الصفائح الدموية
- عدوى في المسالك التنفسية العلوية
- عدوى فيروسية في المسالك التنفسية العلوية
- التهاب في الرئتين (التهاب رئوي)
- التهاب الرئتين الفطري
- التهاب الرئتين بالمستخفيات
- التهاب الرئتين بالعقديات
- التهاب الرئتين غير النمطي
- عدوى في المسالك التنفسية السفلية
- عدوى جرثومية في المسالك التنفسية السفلية
- عدوى فيروسية في المسالك التنفسية السفلية
- قلة الكريات البيض

- انخفاض تعداد خلايا الدم البيضاء
- فقر الدم
- انخفاض الهيموجلوبين
- طفح
- أنزفة دم
- كدمات
- إسهال
- سعال
- آلام في الهيكل العظمي والعضلات
- ألم في الظهر
- آلام العضلات
- آلام المفاصل
- التهاب المفاصل
- التهاب في المسالك البولية
- دم في البول
- تعب
- انخفاض مستوى البوتاسيوم في الدم
- إمساك
- نزيف
- ارتفاع ضغط الدم
- كثرة اللمفاويات
- ارتفاع مستويات ALT
- ارتفاع مستوى البيليروبين
- غثيان
- تقيؤ
- حُمى
- حكة
- تشنجات في العضلات
- صداع
- دوام
- وذمة محيطية
- انخفاض مستويات الكالسيوم
- ارتفاع مستويات الكرياتينين
- ارتفاع مستويات الجلوكوز
- ارتفاع مستويات البوتاسيوم
- ارتفاع الحمض البولي
- انخفاض مستوى الفوسفور

أعراض جانبية شائعة (common) أعراض تحدث لدى 10-1 مستعملين من بين 100

- نزيف كبير
- مستوى مرتفع من حمض البول في الدم
- صداع

إذا ظهر أحد الأعراض الجانبية، إذا تفاقم أيٌّ من الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من عارض جانبي لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

الإبلاغ عن الأعراض الجانبية

يمكن إبلاغ وزارة الصحة بالأعراض الجانبية عبر الضغط على الرابط " التبليغ عن أعراض جانبية نتيجة لعلاج دوائي "، الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحوّلك إلى استمارة عبر الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيدًا عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنب التسمّم. لا تُسبب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب. يُمنع تناول الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر. شروط التخزين: يجب التخزين بدرجة حرارة أقل من 25°C.

6. معلومات إضافية

إضافة إلى المادة الفعّالة، يحتوي الدواء أيضًا على:

Microcrystalline cellulose, gelatin, croscarmellose sodium, sodium lauryl sulphate, colloidal silicon dioxide, magnesium stearate, titanium dioxide.

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

الدواء معبأ بقارورة مع سدادة مقاومة للفتح من قبل الأطفال وتتضمن 120 كبسولة. كل كبسولة لونها أبيض مائل إلى الكريمي (off-white) غير شفافة وعليها الكتابة "ZANU 80" باللون الأسود.

صاحب التسجيل وعنوانه:

مديسون فارما م.ض.، شارع هشبيلواح 10، ص.ب.، 7090، بيتاح تكفا.

اسم المُنتج وعنوانه: BeiGene USA Inc، الولايات المتحدة.

تم تحريرها في آذار 2022 وفق تعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

166-56-36452-99

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النصّ بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، الدواء معد لأبناء كلا الجنسين.