

חברת טבע מודיעה על העדכונים הבאים בעלון לצרכן של התכשיר

אקמול צינון ליקוויג'ל לילה, כמוסות

Acamol Tsinun Liquigel Night, Capsules

Contains: 250 mg *paracetamol*, 30 mg *Pseudoephedrine hydrochloride*, 2 mg *Chlorpheniramine maleate*

עדכונים בעלון לצרכן

התוויה כפי שאושרה בתעודת הרישום:

For the relief of common cold and nasal congestion associated with fever and pain.
Night care medicine.

ברצוננו להודיע שהעלון לצרכן עודכן, בפירוט שלהלן כלולים העדכונים העיקריים בלבד (תוספות מסומנות באדום והסרות מידע בטקסט מחוק):

[...]

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה זו:

- [...]
- אם אתה סובל מסוכרת.
- אם הינך סובל מפאוקרומוציטומה (גידול נדיר בבלוטת יותרת הכליה המשפיע על לחץ הדם וקצב הלב).
- אם אתה סובל פעילות יתר של בלוטת התריס (תירואיד).
- אם אתה סובל מלחץ תוך עיני גבוה (גלאוקומה).
- אם אתה סובל ממחלה חמורה של הכליות.
-
-

- אם אתה מטופל בו זמנית בתרופות נוספות לצינון ושיעול או בתכשירים אחרים המכילים פראצטמול
- אם אתה מטופל בתרופות מקבוצת חוסמי בטא לטיפול בלחץ דם גבוה.
- אם הינך מטופל בו זמנית בתרופות מקבוצת מעכבי מונואמין אוקסידאז (MAOI, לדיכאון) או בתוך 14 ימים מהפסקת הטיפול בהן או תרופות מעכבות מונואמין אוקסידאז הפיכות (RIMAs).
- אם אתה נוטל תרופות המעוררות או מדכאות תיאבון או תרופות לגודש ואסתמה (תרופות סימפטומימטיות).
- אם אתה ילד מתחת לגיל 12 שנים.

[...]

לפני הטיפול באקמול צינון ליקוויג'ל לילה, ספר לרופא אם אתה סובל או סבלת בעבר מ:

[...]

- מחלה או ליקוי בתפקוד הלב, יתר לחץ דם
- אסטמה, ברונכיט או בעיות ריאה אחרות

[...]

תגובות בין תרופתיות

- אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם הינך נוטל תרופה מהקבוצות הבאות:
- תרופות להורדת לחץ דם כגון: גואנתידין, מתילדופה, adrenergic neuron blocker, דבריסקואין, ברטיליום ובטאמידין

[...]

- מוקלובומייד- תרופה נוגדת דיכאון
- גליקוזיד של הלב (תרופה הניתנת לטיפול בהפרעות בקצב הלב, או באי-ספיקת לב כגון דיגוקסין)
- אלקלואידים של ארגוט (ergot alkaloids) - לטיפול במיגרנה כגון ארגוטאמין או methysergide
- אוקסיטוצין (תרופה שניתנת בזמן לידה לכיווץ הרחם)

[...]

תרופות נוגדות עוויתות (לטיפול באפילפסיה) (כגון פניטואין, קרבמזפין).

3. כיצד תשתמש בתרופה?

[...]

בשימוש משולב באקמול צינון ליקוויג'ל יום עם אקמול ליקוויג'ל לילה אין לעבור מינון של 8 כמוסות סך הכל ביממה. יש להחליף מנה של אקמול צינון ליקוויג'ל יום במנה של אקמול צינון ליקוויג'ל לילה, ולא ליטול אותה כתוספת על המינון המומלץ של אקמול צינון ליקוויג'ל לילה.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באקמול צינון ליקוויג'ל יום עלול לגרום לתופעות לוואי. אל תבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן. **קשישים עלולים לסבול יותר מתופעות לוואי כולל בלבול וייתכן שיצטרכו מינון נמוך יותר.**

אם אתה חווה אחת מתופעות הלוואי הבאות, יש להפסיק את הטיפול ולפנות לרופא מייד:

[...]

- ירידה בזרימת הדם ללב העלולה לגרום לתעוקת חזה (אי נוחות או כאב בחזה, צוואר, גב, כתפיים, זרועות), או התקף לב.
 - שבץ (חולשה בפנים, זרועות או רגליים או בעיות דיבור)
 - התפרצות פתאומית של חום, אדמומיות בעור, או מוגליות קטנות רבות (תסמינים אפשריים של Acute Generalised Exanthematous Pustulosis - AGEP) אשר עלולים להתרחש במהלך היומיים הראשונים של הטיפול בתכשיר זה.
 - כאב ראש פתאומי וחמור, בחילות, הקאות, בלבול, פרכוסים, הפרעות בראייה
- [...]

- כאב בטן פתאומי וחמור או דימום רקטלי (בפי הטבעת) עקב דלקת במעי הגס כתוצאה מאספקת דם לא מספקת
 - אם מופיעים סימנים של שינויים במערכת הדם כגון: עייפות בלתי מוסברת, אנמיה, דימומים, חבורות, התפתחות דלקות ביתר קלות
 - איבוד פתאומי של הראייה
- [...]

תופעות לוואי נוספות

[...]

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה:

[...]

- חרדה, הרגשת אי שקט, רגזנות, מתח או הרגשת אושר קיצוני

[...]

- דופק מהיר או לא סדיר או פלפיטציות

[...]

- נימול בכפות הידיים והרגליים
- רעד
- ירידה בזרם הדם לעצב הראייה העלול לגרום לאובדן ראייה

[...]

אם מופיעה אחת מתופעות הלוואי הבאות, היוועץ ברופא או ברוקח:

[...]

- ספירת דם נמוכה

העלון לצרכן נשלח לפרסום במאגר התרופות שבאתר האינטרנט של משרד הבריאות

וניתן לקבלו מודפס ע"י פניה לחברת טבע. <https://israeldrugs.health.gov.il>