

## עלון לצרכן לתכשיר וטרינרי

התרופה משווקת לפי מרשם רופא וטרינר בלבד

לשימוש בבעלי חיים בלבד

### 1. שם התרופה הווטרינרית וצורתה:

**Hexasol Veterinary, solution for injection**

**הקסאסול וטרינרי, תמיסה להזרקה**

### 2. חומרים פעילים:

כל 1 מ"ל תרופה מכיל:

*Oxytetracycline (as Dihydrate)* 300 mg

*Flunixin (as Meglumine)* 20 mg

התרופה מכילה גם חומר בלתי פעיל:

Sodium Formaldehyde Sulphoxylate 0.4% w/v

לרשימה המלאה של החומרים הבלתי פעילים ראה סעיף 13 "מידע נוסף".

### 3. למה מיועדת התרופה:

הקסאסול וטרינרי משמש לטיפול במחלות הנגרמות על ידי מיקרואורגניזמים הרגישים לאוקסיטטריציקלין כאשר נדרשת השפעה אנטי דלקתית, אנטי פירטית ואנטיבקטריאלית. **קבוצה תרפויטית:** תרופה אנטיביוטית ואנטי דלקתית לא סטרואידית.

### 4. התוויות נגד:

לא לשימוש בבעלי חיים הסובלים ממחלות לב, כבד או כליות, כאשר קיימת אפשרות לכיב או דימום במערכת העיכול או כאשר קיימת רגישות יתר לתכשיר. יש להימנע משימוש בבעלי חיים הסובלים מהתייבשות, ירידה בנפח הדם או לחץ דם נמוך, מצבים המעלים את הסיכון לרעילות לכליות. אין להשתמש בנוגדי דלקת (NSAIDs) אחרים במקביל או במהלך 24 שעות משימוש בתכשיר. יש להימנע משימוש מקביל בתרופות שעלולות להיות רעילות לכליות. אין לחרוג מהמינון או ממשך הטיפול הנקוב.

### 5. תופעות לוואי:

השימוש בטטריציקלינים בתקופת התפתחות השיניים והעצמות, כולל בשלבי היריון מתקדמים, עלול להוביל לשינוי בצבען. למרות שהתכשיר נסבל היטב, לעיתים עשויה להופיע תגובה מקומית חולפת. לעיתים נדירות מאוד עשויות להופיע תגובות רגישות יתר (התמוטטות החיה). תגובות כאלה עלולות להתפתח למצב חמור יותר של אנפילקסיס, שעלול לסכן את חיי החיה.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

### 6. חיות מטרה:

בקר.

## 7. צורת המתן והמינון:

למתן בהזרקה תוך שרירית עמוקה לבקר.  
המינון המומלץ הוא 1 מ"ל לכל 10 ק"ג משקל גוף (מקביל ל-2 מ"ג/ק"ג פלוניקסין ו-30 מ"ג/ק"ג אוקסיטטרציקלין) בזריקה בודדת.

## 8. אופן השימוש בתכשיר:

מינון מקסימלי בכל אתר הזרקה: 15 מ"ל.  
אם ניתן טיפול מקביל, יש להשתמש באתר הזרקה נפרד.  
טיפול נוסף בנוגדי דלקת (NSAIDs) יכול להינתן בהפרש של 24 שעות במקרה הצורך.  
טרם מתן הטיפול יש לוודא שאתר ההזרקה נקי על מנת להימנע מהחדרת זיהום.

## 9. זמן המתנה:

בקר: בשר - 28 יום.  
אין להשתמש בפרות המניבות חלב לצריכת בני אדם.

## 10. אזהרות:

- אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה בטיפול בחיית המטרה:  
לא ידוע.
- אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות השימוש בתרופה בבעלי חיים:  
הימנע מהזרקה לתוך העורק.  
שימוש בבעלי חיים מתחת לגיל 6 שבועות או בבעלי חיים מבוגרים עלול להיות כרוך בסיכון נוסף. אם לא ניתן להימנע משימוש כזה, ייתכן שיהיה צורך במתן מינון מופחת ובניטור קליני צמוד של בעלי החיים.  
מומלץ לא לתת תרופות מעכבות פרוסטגלנדינים לבעלי חיים הנמצאים תחת הרדמה כללית עד התאוששות מלאה.
- אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות האדם המטפל בתכשיר:  
הימנע ממגע עם העיניים.  
כדי למנוע תגובות רגישות אפשריות, יש להימנע ממגע עם העור. יש להשתמש בכפפות בעת השימוש בתכשיר. יש לשטוף ידיים לאחר השימוש.  
במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מיד בהרבה מים ולפנות לקבלת טיפול רפואי.  
התכשיר עלול לגרום לתגובות אצל אנשים רגישים. אם ידוע לך על רגישות יתר לתרופות נוגדות דלקת לא סטרואידיות, אל תשתמש בתכשיר. תגובות אלה עלולות להיות חמורות.  
היזהר מהמקרה של הזרקה עצמית.
- אזהרות נוספות:  
אין.
- היריון והנקה של בעל החיים המטופל:  
השימוש בטטרציקלינים בתקופת התפתחות השיניים והעצמות, כולל בשלבי היריון מתקדמים, עלול להוביל לשינוי בצבען.  
לא נערכו מחקרי בטיחות בבעלי חיים בהיריון.
- תגובות עם תרופות אחרות וסוגים אחרים של אינטראקציות:  
לחלק מהתרופות האנטי דלקתיות לא סטרואידיות יש יכולת גבוהה להיקשר לחלבוני פלזמה ולהתחרות בתרופות אחרות בעלות יכולת היקשרות גבוהה, דבר שעלול להוביל להשפעות רעילות.  
יש להימנע ממתן בו-זמנית של תרופות שעלולות להיות רעילות לכליות.
- מינון יתר:  
טיפול סימפטומטי לפי הצורך תוך הקפדה על מניעת התייבשות של בעל החיים.
- חוסר תאימות (Incompatibility):  
לא ידוע.

### 11. הוראות אחסון:

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.
- תנאי אחסון – יש לאחסן בטמפ' מתחת ל-25°C ולהגן מאור. יש לשמור את התכשיר באריזה החיצונית ובמצב מאונך. לאחר פתיחה ראשונה של התכשיר ניתן להשתמש עד 28 ימים. יש להשמיד שאריות תכשיר לאחר 28 ימים מרגע הפתיחה הראשונה.

### 12. הוראות בדבר השמדת התכשיר/שאריות התכשיר בתום השימוש:

- כל תכשיר רפואי וטרינרי שלא נעשה בו שימוש או כל פסולת שהתקבלה משימוש בתכשיר וטרינרי יש להשמיד כפסולת רעילה, אין להשליך לביוב.

### 13. מידע נוסף:

- נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם:  
Glycerol Formal, Polyethylene Glycol 200, Magnesium Oxide Light, Sodium Formaldehyde Sulphoxylate, Ethanolamine, Water for Injection.
- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה: תמיסה צלולה בצבע ענבר כהה.
- גודלי האריזות:  
בקבוקי זכוכית המכילים 50 מ"ל או 100 מ"ל, סגורים במכסה גומי עם טבעת אלומיניום.  
ייתכן שלא כל גודלי האריזות משווקים.

- **בעל הרישום וכתובתו:** קומקס בע"מ, דרך שכם 1, ת.ד. 19943, ירושלים 97200

#### שם היצרן וכתובתו:

Norbrook Laboratories Ltd., Station Works, Newry, Co. Down, BT35 6JP, Northern Ireland, UK.

נערך במאי 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

**מספר רישום התכשיר בפנקס התכשירים הממלכתי במשרד הבריאות:**  
082-09-92270-00