

أكماول 500 ملغ

حبّيات في عروات شخصية

التتركيب

تحتوي كل عبوة شخصية على:

باراسيتامول 500 ملغ (Paracetamol 500 mg)
 لمعلومات حول المركبات حول الفعالة والمثير
 للحساسية انظر البند 2 - معلومات هامة عن قسم من
 مركبات الدواء والبند 6 - معلومات إضافية".

أفراد الشّرفة

إذا كنت تتناول أو تتناول مخزراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية دون وصفة طبيب والمكملات الغذائية، أخير الطبيب أو وظيفة الكبد
 إذا كنت تتناول:

أدوية ضد تشتّر المثلث وأرفارلين
 مستحضرات تستخرج انتاج إنزيمات في الكبد (مثل:
 ريفايبين، بريبيورات)
 أدوية المسرع - فيتوبون، كاربامازين
 أدوية مضادة للالتهاب لا سيرويدية
 ميتوكلاوراميد أو مومبزيرون (العلاج الغثيان، التقيؤ
 ومشاكل هضم إضافية)

كلورافينيكول (مضاد حيوى)
 بروبيسيدي (العلاج التقرس)
 كولستيرلين (تقليل فرط الدهون في الدم)

استعمال الباراسيتامول واستهلاك الكحول

يمكن استهلاك الكحول أثناء العلاج بـ باراسيتامول وذلك بسبب زيادة خطر الإصابة بضرر الكبد.

الحمل والإرضاع

الدواء مخصوص لخفض السخونة ولتسكين الآلام الناجمة عن أسباب مختلفة، مثل الصداع، آلام الأسنان، نزلات البرد، الإنفلونزا، الالم الرئيسي (الروماتيزم) والألم الحيض.

الفصيلة العلاجية: مسكن آلام وخافض للسخونة.

2. قبل استعمال الدواء إذا:

يمكن استخدام الأدوية على الرغم من استعمال الدواء.
 • كان معروف وجود حساسية لديك لـ باراسيتامول أو لأحد المركبات الأخرى في الدواء (انظر البند 6).

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

• إذا كنت قد طرطت في الماضي أعد اضافة جانية جلدية نتيجة تناول مستحضرات تحتوي على باراسيتامول، فيقنه تناول مستحضرات تحتوي على باراسيتامول، كي لا تحدث تأثيراً آخر اضافة جلدية خطيرة.

• حتى المستحضر على باراسيتامول، الذي قد يسبب ضرراً في الكبد عندما: نعطي بجرعة مقدار أعلى من الموصى به أو لفترة طويلة

• يتم شرب مشروبات كحولية أثناء العلاج

• يتم تناول أدوية إضافية تحتوى في وظيفة الكبد
 • تمنع استعمال هذا الدواء في أوقات متقاربة دون استشارة الطبيب.

• تمنع تناول أدوية إضافية لخفض السخونة ولتسكين الآلام أو أدوية نزلات البرد دون استشارة الطبيب أو الصيدلي، لتفادي جرعة مفرطة أو تسمم من باراسيتامول.

• تمنع تناول أدوية إضافية من "عائلة أكماول" وأدوية مستحضرات إضافية تحتوى على باراسيتامول.

• يجب تجنب تناول جرعة عالية (حتى لو كان ضمن نطاق الجرعة الموصى بها) من هذا الدواء أثناء الصوم.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب عليك التحقق من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر. في حالة عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب، فإن الجرعة المقولة أعلاه هي:

البالغون والأطفال من عمر 12 سنة وما فوق: 1-2 عبوة شخصية من أكماول 500 ملغ، كل 4-6 ساعات، حسب الحاجة.

يُمنع تناول أكثر من 8 عبوات شخصية في يوم واحد (غرام بـ باراسيتامول).

الأطفال بعمر 9-12 سنة:

عبوة شخصية واحدة من أكماول 500 ملغ أو عبوة شخصية واحدة من *أكماول 250 ملغ، كل 4-6 ساعات، حسب الحاجة.

يُمنع تناول أكثر من 4 عبوات شخصية في يوم واحد من أكماول 500 ملغ أو 8 عبوات شخصية في يوم واحد من أكماول 250 ملغ (2) غرام بـ باراسيتامول.

*هناك منتج يفتقر أقل قوة يحتوي على باراسيتامول 250 ملغ - أكماول 250 ملغ.

يُمنع تناول جرعة جزئية من كيس شخصي واحد، حيث لا يمكن تخفيق الدقة في الجرعة.

يُمنعتجاوز الجرعة الموصى بها.

يجب عليك التوجه إلى الطبيب إذا استمرت السخونة لأكثر من 3 أيام أو إذا تفاقمت الأعراض أو لم تنتهي في غضون 5 أيام، على الرغم من استعمال الدواء.

طريقة الاستعمال

يُمنعتناول مع الطعام يجب فتح العبوة الشخصية من أكماول 500 ملغ، تفريح محتواها مباشرةً داخل الفم، على اللسان، والبلع. لا حاجة للماء.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا ابتلع طفل من الدواء عن طريق الخطأ، فيجب التوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضار عليه الدواء معك. لا تسبب السخونة، لأنصر فترة زمنية ممكدة، استثيري الطبيب إذا لم يخف الألم أو السخونة أو إذا كنت بحاجة إلى تناول الدواء في أوقات أكثر توافقاً.

الإرضا

تنقل كميات صغيرة من الـ باراسيتامول إلى حليب الأم.

يجب استشارة الطبيب قبل الاستعمال.

القيادة واستعمال الماكينات

لا يوثر بـ باراسيتامول في القدرة على القيادة أو تشغيل الماكينات.

معلومات هامة عن قسم من مركبات الدواء

تحتوي كل عبوة شخصية من أكماول 500 ملغ على: سكرور بكمية تعادل 0.14 مل، إذا قيل لك من قبل طبيب أنك حساس لسكريات معينة، فاستشر الطبيب قبل تناول الدواء.

- صوديوم: يحتوي هذا الدواء على أقل من 23 ملغ من الصوديوم في كل جرعة وبالتالي يُعتبر خالي من الصوديوم.

- سوربيتون بكمية تعادل 801 ملغ: سوربيتون هو مصدر الفركتوز، إذا كان لديك حساسية لسكريات معينة أو لديك حساسية وراثية للفركتوز (HFI) استشر الطبيب قبل الاستعمال. قد يسبب سوربيتون الماء في الطعن وأسياخ.

- سكرالوز بكمية تعادل 1.5 ملغ.

- مواد نكهية: نكهة فانيل ونكهة ثوت.

الاستعمال لدى الأطفال

هذا الدواء مخصوص للأطفال من جيل 9 سنوات وما فوق، انظر البند 3.

يجب على الوالدين إبلاغ الطبيب عن جميع الأعراض الجانبية وكذلك عن أي إضاضي يُعطى للطفل.

4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، قد يسبب استعمال أكماول 500 ملغ أعراض جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تهدى عند القراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل أنّ تتعاني من أي منها.

قد تكون الأعراض الجانبية أكثر حدة لدى المسنين.

أعراض جانبية خطيرة:

يجب التوقف عن العلاج والتوجه فوراً إلى الطبيب:

• إذا ظهرت ردود فعل تحسسية خطيرة مثل تورم الأنف، الفم، العين، والحلق، تورم الوجه، الشفتين، اللسان، وأو الحلق الذي قد يسبب صعوبات في التنفس أو البلع.

•

إذا ظهرت في حالات نادرة أمراض جلدية حادة التي يمكن أن تكون علاماتها أحمرار، طفح، بثور أو إصابة جلدية واسعة النطاق.

قد تظهر أعراض جانبية جلدية حادة، حتى لو كنت قد تناولت في الماضي مستحضرات تحتوي على المركب الفعال پاراسيتامول ولم تعاني من أي أعراض جانبية. إذا ظهرت أعراض جانبية جلدية، توقف عن العلاج وتوجه إلى الطبيب على الفور.

إذا ظهرت علامات للتغيرات في الجهاز الدموي مثل النزيف، ظهور كدمات بسهولة، تطور حالات عدوى بسهولة كبيرة نتيجة انخفاض حاد في عدد خلايا الدم البيضاء.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

الإبلاغ عن أعراض جانبية

يمكن الإبلاغ لوزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "الإبلاغ عن أعراض جانبية نتيجة علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحولك إلى استمارة عبر الإنترنت للإبلاغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يُخزن الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي و المجال روئية الأطفال وأو الرضع، وهكذا تتجنب التسمم. لا تسبب التقىء بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينبع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب التخزين دون الد 25°C في العبوة الأصلية، للحماية من الضوء والرطوبة.

6. معلومات إضافية

إضافة لل المادة الفعالة يحتوي الدواء أيضاً على:

Sorbitol, talc, basic butylated methacrylate polymer, magnesium oxide light, sodium carmelloose, hypromellose, stearic acid, sodium lauryl sulphate, magnesium stearate, titanium dioxide, sucralose, N-2,3-trimethyl-2-isopropylbutanamide, simeticone.

كيف يبدو الدواء وماذا تحتوي العبوة:

تحتوي علبة أقراص 500 ملغ على عبوات شخصية (أكياس) من الألومنيوم. في كل عبوة شخصية هناك

حبّينات من دواء بلون أبيض أو بطياف قریب للأبيض. تمت المصادقة على المستحضر للتسويق بالأحجام التالية: 8، 10، 12، 16، 20، 24، 32، 36، 40، 48، 50 عبوة شخصية.

قد لا يتم تسويق جميع أحجام العبوات.

اسم المنتج وصاحب التسجيل وعنوانه:
تيفع إسرائيل م.ض.، شارع دفروا هنفينا 124، تل أبيب
6944020

تم تحرير هذه النشرة في حزيران 2022 وفق تعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

148.53.33459

لتيسير قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكور. مع هذا، فالدواء معد لأبناء كلا الجنسين.



DOR-Avcamol-500mg-PIL-0622-14