

يسوق الدواء بدون وصفة طبيه

أوميبراكس-Z، حبسولات، 20 ملغ

كل حبيسة تحتوي على: أوميبرازول (Omeprazole) بجرعة 20 ملغ.

البراد عن الفعالة ومسيبات الحساسية في الدواء – انظر للبدن 6 "معلومات إضافية" و بند 2 "معلومات مهمة حول جزء من مركات الدواء".

افرا الشفرة بباعان حتى ناهتها قبل ان تستعمل الدواء. تحتوي هذه الشفرة على معلومات ملخصة عن الدواء. اذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه الى الطبيب أو الى الصيدلي.

عليك تناول الدواء حسب التعليمات في بند 3 "كيف تستعمل الدواء؟" في هذه النشرة. استشر الصيدلي اذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية. عليك التوجه الى الطبيب اذا كانت اعراض المرض تتفاقم أو انها لا تتحسن بعد 14 يوم.

هذا الدواء غير مخصص للاستعمال لدى الأطفال والمرافقين تحت جيل 18 سنة.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

الدواء يفتقر إلى الحوض في الجهاز الهضمي. أوميبراكس-Z مخصص لتخفيف أعراض الارتجاع (مثل الحموضة) والتي تظهر بوتيرة يومية في الأسبوع أو أكثر لدى المتعاطلين فوق جيل 18 سنة.

الفصلية العلاجية:
أوميبراكس-Z ينتمي لفصيلة مثبطات مضخة البروتونات (Proton Pump Inhibitor (PPI)).

2. كيف تستعمل الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساسًا (للمادة الفعالة (أوميبرازول) أو لأي واحد من المركات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر للبدن 6 "معلومات إضافية")
- كنت حساسًا (أرجيا) للأدوية التي تحتوي على مثبطات مضخة البروتونات (PPI) أخرى (مثل: فينتوبرازول، لانسوبرازول، رابرابيرازول، إيسومبرازول).
- كنت تتناول دواء يحتوي على نيفلغيفير (أثناء علاج حالات عدوى الـ HIV) – لا يجوز تناول أوميبراكس-Z إذا كنت تتناول دواء يحتوي على نيفلغيفير.
- كنت تتناولون دواء، إيتراكونازول، يساكونازول أو فوريكونازول (علاج حالات العدوى الفطرية).
- كنت تتناولون دواء مع مضاد حيوي (مثل: كلينداميسين، جوجوسكين (علاج مشاكل القلب)).
- كنت تأخذ الأدوية التالية:
 - نيفلغيفير (دواء لعلاج حالات عدوى الـ HIV) – لا يجوز تناول أوميبراكس-Z إذا كنت تتناول دواء يحتوي على نيفلغيفير.
 - فونيتوبرازول (علاج الصداع).
 - دواء مع مضاد حيوي (مثل: فلوكنازول، إيسوفونازول، سيفوفونازول).
 - دواء مع مضاد حيوي (مثل: فلوكنازول، إيسوفونازول، سيفوفونازول).
 - دواء مع مضاد حيوي (مثل: فلوكنازول، إيسوفونازول، سيفوفونازول).
- كنت تعاني من صعوبة أو أي أثناء بلع الطعام، من قيء دموي أو براز دموي أو أسود.
- لديك حموضة مصحوبة بتشنجات، تعرق أو دوخة.
- لديك أي من الصدور أو في الأكتاف المصحوب بضيق تنفس، يتعرق، يلمع اليدين، تشنجات للذراعين، الرقبة أو الأكتاف، أو بدوخة.
- لديك أي من الصدور في أحيان متكررة.
- كنت تحت جيل 18 سنة.

تحتويات خاصة متعلقة باستعمال الدواء أوميبراكس-Z قد يخفي أعراض أمراض أخرى. لذلك، يجب بدء العلاج بأوميبراكس-Z إذا كنت تعاني من أحد الأعراض التالية قبل بدء العلاج بأوميبراكس-Z أو أثناء العلاج بأوميبراكس-Z:

- كنت تعاني من انخفاض كبير في وزنك بدون سبب ولديك مشاكل في البلع.
- كنت تعاني من الإم في البطن أو صعوبات في الهضم.
- كنت تتقيًا الطعام أو لديك قيء دموي.
- لديك براز أسود (براز دموي).
- كنت تعاني من إسهال ورميد أو متواصل. لأن استعمال أوميبراكس-Z يمكن أن يزيد قليلاً من الخطر (احتمال الحظن للإسهال نتيجة للعدوى).
- كنت تعاني من مشاكل وخيمة في وظيفة الكبد.
- تطور لديك في أي وقت مضى رد فعل جلدي بعد استعمال دواء يشبه أوميبراكس-Z الذي يقلل من إفراز الحوض في المعدة.
- كنت على وشك إجراء فحص دم معين (كروموجرانين A).
- كنت تعاني من الحموضة لمدة تزيد عن 3 أشهر، من الممكن أن هذا الأمر يدل على مشكلة أكثر وخيمة.
- كنت تعاني من سفير في التنفس في أحيان متكررة، خصوصًا

يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال الدواء إذا كنت حاملًا، تتقنين أنك حامل، تخططين للحمل أو مرضعة. أوميبرازول (المركب الفعال في الدواء) يفرز بحليب الأم، لكنه ليس من المتوقع أن يؤثر على الرضيع عند تناول الجرعة اليومية بها. سفير، أوميبراكس-Z إذا كان بإمكانك تناول أوميبراكس-Z أثناء الرضاعة.

الاستعمال لدى الأطفال

هذا الدواء غير مخصص للاستعمال لدى الأطفال والمرافقين تحت جيل 18 سنة.

السيافة واستعمال الآلات

أوميبراكس-Z ليس من المفروض أن يؤثر على القدرة على القيادة أو تشغيل الآلات. من الممكن أن تحدث أعراض جانبية مثل الدوخة واضطرابات في الرؤية (انظر للبدن 4 "الأعراض الجانبية"). إذا شعرت بهذه الأعراض لا يجوز أن تسوق أو تشغل الآلات.

معلومات مهمة عن جزء من مركات الدواء أوميبراكس-Z يحتوي على لاكتوز. إذا قيل لك أنت تعاني من حساسية تجاه منتجات الألبان، استشر الطبيب قبل تناول هذا الدواء. هذا الدواء يحتوي على أقل من 1 ميلي مول صوديوم (23 ملغ) للحبسولة. هذا يعني أنها فعليًا "خالية من الصوديوم".

3. كيف تستعمل الدواء؟

هذا الدواء غير مخصص للأطفال والمرافقين تحت جيل 18 سنة. يجب الالتزام بتعليمات الاستعمال المفصلة في الأسفل. يجب أن تتحقق من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا بالنسبة للجرعة وكيفية العلاج بالدواء.

الجرعة الموصى بها للبالغين من جيل 18 سنة فما فوق في غياب تعليمات أخرى من الطبيب هي:

- حبسولة واحدة مرة في اليوم قبل الوجبة لمدة 14 يومًا.
- يمكن تكرار العلاج ذي الـ 14 يوم كل 4 أشهر.
- لا يجوز تناول الدواء لأكثر من 14 يوم أو أكثر من 14 يوم (14 يوم) كل 4 أشهر أو أقل وفقًا لتعليمات الطبيب.
- إذا لم يطرأ تحسن بوضفك بعد 14 يومًا أو إذا تكررت الأعراض بفترات قريبة أو تفاقمت يجب التوجه إلى الطبيب.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

يجب تناول الدواء قبل الوجبة. مفضل تناول الدواء في الصباح. يجب بلع الحبسولة بكاملها مع كأس ماء. لا يجوز شطر، سحق أو مضغ الحبسولة للحفاظ على طلاء الحبسولة (الطلاء يمنع عصارات الهضم في المعدة من تفكك الحبسولة لكي تتحرر المادة الفعالة فقط في الأمعاء، في المكان الذي تنتص به المادة الفعالة للجسم).

إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة أعلى من تلك التي عليك تناولها، فراجع طبيبك فورًا. يجب تجنب تناول جرعة أخرى إذا كنت تتناول جرعة أخرى من أوميبراكس-Z في وقت مبكر من اليوم. إذا تناولت جرعة زائدة أو إذا بلغ على من طريق الخطأ، توجه فورًا للطبيب أو لخدمة الطوارئ في المستشفى مصطحبًا عبوة الدواء منك.

إذا نسيت تناول الدواء إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، يجب تناول جرعة فور تذكره، لكن إذا كان موعد تناول الجرعة التالية قريب، يجب تخطي الجرعة المنسية. لا يجوز تناول جرعتين معًا لتعويض عن الجرعة المنسية.

في كل مرة تتناول فيها دواء، ضع النظرات الطبية إذا كنت بحاجة إليها. إذا كانت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما هو الحال مع أي دواء، قد يسبب استعمال أوميبراكس-Z أعراضًا جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تفرغ من قراءة قائمة الأعراض الجانبية من الممكن أن تعاني من أي واحد منها.

يجب التوقف عن تناول أوميبراكس-Z والتوجه فورًا للطبيب

إذا لاحظت وجود الأعراض الجانبية التالية التي هي نادرة لكنها وخيمة:

- صفر مفاجي في التنفس، انتفاخ في المثقين، اللسان والحجرة أو الجسم ملتحق، إسهاء أو صعوبات في البلع (رد فعل أجي وخيم).
- احمرار الجلد المصحوب بصدمات أو قشر، حويصلات وخيمة وزيف قد يحدث أيضًا في المثقين في العنيتين، في الملم في الأنف وفي الأعضاء التناسلية. هذا الوضع قد يكون متلازمة ستيفنس-جونسون أو قشر الألسنة المتوهجة الشبيهة بالشمعي.
- اضطراب الجلد. بول داكن وتعب وتقي قد تكون أعراضًا لمشاكل كبد.

أعراض جانبية إضافية

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى 10-100 مستعملين في 100):

- تغير في المعدة أو الأمعاء؛ إسهال، ألم بطن، إسهال، متسملين في البرطن (غازات).
- غثيان أو قيء.
- مشاكل حيدة في المعدة.

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين في 1000):

- انتفاخ والبساقين والكاحلين.
- اضطرابات في النوم (أرق).
- دوخة، شعور بالوخز والتشنج، شعور بالنعاس.
- شعور بالدوار (vertigo).
- تغيرات في فحوصات الدم لبعض وظائف الكبد.
- طفح جلدي، طفح مع كل (شرى) وحكة في الجلد.
- شعور عام غير جيد ونقص في الطاقة.

أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000):

- مشاكل جهاز الدم مثل انخفاض بعدد خلايا الدم البيضاء أو الصفيحات التي يمكن أن يسبب ضعف، ظهور كدمات أو تطور حالات عدوى بسببه أكثر.
- ردود فعل تحسسية (حبيبة) في بعض الأحيان وخيمة جدًا. بما في ذلك انتفاخ المثقين، اللسان والحجرة، حتى، صفر في التنفس.
- مستوى صوديوم منخفض في الدم – قد يؤدي لضعف، قئ، وتقلصات.
- الصدور للبصيصية، التهاب أو الأكتئاب.
- تغيرات في حسنة الذوق.
- مشاكل في الرؤية على سبيل المثال رؤية مشوشة.
- ظهور مفاجي لضعف في التنفس أو ضيق تنفس (تشنج قصبي).
- غثاف في الفم.
- التهاب لآخذ جويرف الفم.
- عدوى فطرية في الفم التي من الممكن أن تؤثر على الأمعاء.
- مشاكل كبد، بما في ذلك برفق الدم، يمكن أن يؤدي لجدل أسفر، بول داكن وتعب.

تساقط شعر (صلع). مشاكل وخيمة في الكبد التي تسبب قصور الكبد والتهاب الدماغ. انتفاخ مفاجي بطيخ ورجم أو حويصلات أو قشر الجلد. قد تكون مصحوبة بطن مرتفعة والأمفاصل (حماسي عديدة الأشكال، متلازمة ستيفنس-جونسون، قشر الألسنة المتوهجة الشبيهة بالشمعي).

ضعف عضلات. تضخم الثديين لدى الرجال.

أعراض جانبية نادرة جدًا (أعراض تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من 10,000):

- تغيرات في تعداد الدم بما في ذلك نُدرة المُخَيَّبات (agranulocytosis).
- عدائية.
- حواسيات، رؤية، شعور أو سماح أثناءه غير موجودة في الواقع.
- مشاكل وخيمة في الكبد التي تسبب قصور الكبد والتهاب الدماغ.
- انتفاخ مفاجي بطيخ ورجم أو حويصلات أو قشر الجلد. قد تكون مصحوبة بطن مرتفعة والأمفاصل (حماسي عديدة الأشكال، متلازمة ستيفنس-جونسون، قشر الألسنة المتوهجة الشبيهة بالشمعي).
- ضعف عضلات.
- تضخم الثديين لدى الرجال.

أعراض جانبية شائعة غير معروف (أعراض جانبية شائعة لم يحدد بعد):

- التهاب في الأمعاء (الذي يؤدي للإسهال).
- إذا كنت تتعالج بأوميبراكس-Z لفترة أطول من 3 شهور، قد يكون هناك انخفاض مستويات المغنيسيوم في دمك. يتجلى انخفاض مستويات المغنيسيوم في تعب، تقلصات عضلية لا إرادية، ارتباك، تشنجات، دوخة أو زيادة في ضربات القلب. إذا كان لديك واحد من هذه الأعراض، عليك إبلاغ الطبيب في أقرب وقت ممكن. قد يؤدي انخفاض مستويات المغنيسيوم في الدم أيضًا لانخفاض في مستويات البوتاسيوم أو الكالسيوم في الدم. قد يفرز الطبيب إجراء فحوصات دم بشكل منتظم من أجل مراقبة مستويات المغنيسيوم في الدم.
- طفح المصحوب أحجابًا بالأفصا.

حالات نادرة جدًا قد يؤثر أوميبراكس-Z على مستويات كريات الدم البيضاء، والتسبب بنقص مناعي (الحلق الضرع في الجهاز المناعي). إذا كانت لديك عدوى مصحوبة بأعراض مثل حمى مع انخفاض وخيم في وضع صحتك العام أو حتى مع أعراض عدوى موضعية مثل ألم في الرقبة، في الحنجرة، في الفم أو صعوبات في التنوّل، عليك استشارة الطبيب في أقرب وقت ممكن من أجل استبعاد نقص في خلايا الدم البيضاء (agranulocytosis) عن طريق إجراء فحص الدم. في هذه الحالة من المهم أن تعطي معلومات عن ذلك.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "يوضح عل توقعات لوزا، عقرب סיפול תרופות" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الموجة للاستشارة الإترنيتية للتبليغ عن أعراض جانبية أو عن طريق الدخول للرابط: <https://sideeffects.gov.il>

5. كيفية تخزين الدواء؟

تحتفظ بمنتجات يجب حفظها هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان جاف بعيدًا عن أشعة الشمس، بعيدًا عن الأطفال وإو الرضع ومحام رؤيتهم، وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب القيء بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (تاريخ الترميم) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين: يمنع التخزين فوق 25 درجة مئوية.

6. معلومات إضافية

إضافة إلى المركب الفعال يحتوي الدواء أيضًا على: Lactose monohydrate, hypromellose acetate succinate, magnesium carbonate heavy, sodium starch glycolate, talc, sodium stearyl fumarate, triethyl citrate, propylene glycol, purified water, titanium dioxide (E171), sodium hydroxide, sodium laurilsulfate, red iron oxide (E172), hypromellose 2910, yellow iron oxide (E172), carnauba wax.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة حبسولة بيون بيون تعال في الوردي. حجم عبوة مصاصق عليها: 14, 7, 28 حبسولة من الممكن ألا تسوق أحجام العبوات.

تم التفتيح في أيار 2022 بموجب تعليمات وزارة الصحة. رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 00-30841-25-135.

للتبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة الذكر. بالرغم من ذلك، الدواء مخصص لكلا الجنسين.

المنشع وصاحب التسجيل: دكسل م.ض.

شكرا على دعمك، 1، أور عيكفًا 0360000، إسرائيل