

كلورتي
أفراد المهمة
التراكيب:

يحتوي كل قرص للمهيل على:

كلوتريمازول 200 ملجم (mg) (Clotrimazole 200 mg)

معلومات حول المركبات غير الفعالة انتظري البند 6 - معلومات إضافية"

اقرني الشارة يمتنع حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك استفسرة إضافية توجه إلى الصيبي أو إلى الصيدلي.

يجب عليك استعمال المستحضر بحسب التعليمات في بذ المقادير الدوائية في هذه النشرة.

استشيري الصيبي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية.

عليك التوجه إلى الطبيب في حال تفاقمت أعراض المرض (الاعراض) أو إذا لم تتحسن بعد 7 أيام.

1. لم أعد هذا الدواء؟

• لعلاج حالات العدوى الفطرية في المهبل الناجمة بالأساس عن سلالات الميتسات.

• لعلاج حالات الدعوى في المهبل الناجمة عن المشورة والكتانات الدقيقة الحساسة لـ كلوتريمازول.

المجموعة العلاجية: مضادات الطفريات من فصيلة الأزرول.

الفطريات المهبلية هي عدو شائعة التي تعيّن منها غالبية النساء في مرحلة معينة من الحياة وهي لا تحدث نتيجة خلل في النظافة الذاتية. مسبب الطفريات المهبلية هو فطر سمي النبيضة الذي يعيش في المهبل وفي أعضاء مختلفة دون أن يتسبّب أي ضرر.

مع ذلك، فإن التوازن الطبيعي الذي يحافظ على البيئتين تحت السيطرة ممكن أن يتغير بعدة عوامل مثل تغييرات هرمونية (دوره الشهرية)، أفراد من أنسجة المهبل والفرج، انسداد حمل، انقطاع الطمث، ضيقة متردية، تناول المضادات الحيوية، صابون معطر، إضافات لحوض الاستحمام ولملابس ضيقة.

تغيفير في توازن المجموعة الطبيعية (pH) قد يؤدي إلى ارتفاع في نمو الفطر الذي جعلها ممكن أن يتغلب على عدوه، يمكن أن يعسّر هذا الأمر من خلال الأعراض التالية، احساس دائم بالحرقة أو/و احتجاج مهبل والفرج، احمرار، انتفاخ وألم في أنسجة المهبل والفرج، وإفراز أبيض اللون عدم الرائحة من المهبل. من الجائز أن تعاين من جميع هذه الأعراض المذكورة، بل من واحد فقط.

2. قبل استعمال الدواء:

• منع استعمال الدواء إذا:

• وجّدت لديك حساسية (رجبة) لل المادة الفعالة (كلوتريمازول) أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (انتظري البند 6 "معلومات إضافية")

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

استعمل المستحضر فقط إذا شخص طبيب لديك في الماضي بأنك تعاني من عدو فطرية في المهبل.

قبل العلاج بـ كلورتي، أخْفِرِ الطبيب إذا:

• كنت غير واثق فيما إذا كنت تعاني من فطر في المهبل أو إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تعاني فيها من هذه الأعراض.

• عانياً خلال الـ 6 أشهر الأخيرة من أكثر من حوالي عدو فطرية في المهبل.

• أنت أو زوجك عانياً ذات مرة من مرض ينتمي عن طريق الاتصال الجنسي، كان عمرك ذاتياً من 16 سنة أو أكبر من 60 سنة.

• كنت قد عانياً ذات مرة من رد فعل تحسسي لـ كلورتي أو مستحضرات مهبلية أخرى مضادة للطفريات.

في حال ظهور واحد من الأعراض التالية فمن الجائز أن كلورتي ليس العلاج المناسب لك:

○ نزف مهبلي شاذ أو افراز دموي

○ تقرّحات، حويصلات أو جروح في المهبل أو في الفرج

○ الالم أو صعوبة في التبول

○ سخونة أو شعور

○ حالات غثيان أو تقيؤات

○ إسهال

○ افراز مهبلي ذو رائحة كريمية

● كلورتي، مستحضرات أخرى شائع استخدام داخل المهبل، يمكن أن يقلل من نجاعة وسائل منع الحمل المطاطية مثل الواقي الذكري (الكوندوم) والعازل الأنثوي (الديافراجم). لهذا السبب،

- يجب عليك استعمال وسائل منع حمل بديلة لمدة 5 أيام على الأقل بعد العلاج بالمهبل.
- يمنع استعمال التامponات، الغسوارات المهبلية، قاتلات الطاف أو مستحضرات مهبلية أخرى أثناء العلاج بهذا الدواء.
- امتنع عن ممارسة علاقات جنسية مهبلية ما دمت تعاني من عدو فطري في المهبل أو تستعملن كلورتي لأن زوجك قد يصاب بالعدوى.

الطفلات والمرأهقات

كلورتي أفراد مهبلية غير معد للاستعمال لدى الطفالات والمرأهقات دون عمر 12 سنة.

رودو فعل بين الأمور

- إذا كنت تتناولين أو إذا تناولت مؤخرًا أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية ومكملات غذائية أخرى، يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي بذلك. بشكل خاص، يجب اعلام الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناولين:
- تاكروليموس أو سيروليموس (المعدان لتخفيض رد فعل الجهاز المناعي من أجل منع رضن العرسة بعد زرع عضو).

الخصوصية، الحمل والإرضاع

تتوفر معلومات تشير إلى أن المستحضر ليس له تأثير على الخصوبة.

الحمل

- إذا كنت حاملاً أو تحاولين أن تحملي، يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال كلورتي ومتتابعة تعليماتهم بذهن. يمكن استعمال كلوتريمازول خلال الحمل لكن تحت إشراف طبيب فقط.

يمنع استعمال جهاز الإدخال طفلي فترة الحمل.

الارصاد

- نظرًا لعدم إمكانية نفهي وجود خطير على الرضيع الذي يرضع، يجب اتخاذ قرار سوية مع الطبيب فيما إذا كنت سترضعين أو تستعملن كلوتريمازول.

السيادة واستعمال الماكينات

هذا الدواء يديم التأثير أو يوجد له تأثير ضئيل على القرفة على السيادة أو تشغيل ماكينات.

3. كيف تستعملن الدواء؟

- يجب عليك الحصول على الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكوني متقدمة فيما يتعلق بالمقدار الدوائي.

بالرقيقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي المتبوع في حال عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب:

- قرص واحد لإدخال داخل المهبل مساء قبل النوم، لمدة 3 ليالي متالية (انظرى البند "طريقة استعمال المستحضر").

يمنع تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

مدة العلاج

- من المفترض أن تختفي علامات الطفريات خلال 3 أيام من بدء العلاج. إذا لم يطرأ تحسن على حالتك خلال 7 أيام، يجب التوجه إلى الطبيب.

- إذا أعادت الطفريات بعد 7 أيام، بإمكانك استعمال علاج واحد إضافي، لكن إذا كنت تعاني من الطفريات أكثر من مرتين خلال 6 أشهر، عليك التوجه إلى طبيب.

طريقة استعمال:

• يمنع ادخاله في القمأ أو الياع!

• لا تستعمل داخل المهبل فقط

طريقة استعمال المستحضر - تعليمات عامة:

إذاً أوصى لك كلورتي من قبل الطبيب، عليك اتباع تعليماته.

- في حال اشتربت المستحضر بدون وصفة طبيب، يجب عليك استعمال المستحضر كما هو موصوف في هذا النبذ.

- الوصول المرفق للمستحضر مع المساعدة في إدخال القرص عميقاً قدر الإمكان داخل المهبل، من الغضل قليل التوأم لمدة ثلاثة ليالٍ متتالية.

- الوصول هو لاستعمال الشخصي (يمنع نفهه إلى متعالجة أخرى) وهو معد للاستعمال لفترة علاج واحدة مدتها 3 أيام فقط.

- للحفاظ على النظافة، أغلسي كل جزء من أحجازه على حدة بالماء والصابون قبل كل استعمال للموصل.

- أغسلني يديك بالصابون وبالماء الساخن قبل اخراج القرص من العبوة ومرة أخرى بعد استعمال الموصى بالخاص.

- 1. آخرجي الموصى من العبوة، أسحبن الجزء الداخلي للجهاز (الصورة 1: a) حتى يتوقف.

- 2. يجب إدخال الموصى الذي يحتوي على القرص عميقاً قدر الإمكان وبالقفر الذي لا يسبب أي إزعاج، داخل المهبل (أفضل طرق لفلف ذلك هي بالاستئناف على الظهره وثني الرجلين بحيث تكون ركيبيك اتجاه الأعلى). أمسك الموصى في مكانه، واضغطي ببطء على الكبس حتى يتوقف بحيث يتم إدخال القرص في المهبل (انظرى الصورة 2). انظرى ببطء على قفل النهوض من السرير.

استعمال المستحضر. يجب التوقف عن العلاج والتوجه فوراً إلى الطبيب أو غرفة الطوارئ في أقرب مستشفى إذا ظهر لديك رد فعل تحسسي أو نفاس احمرار، الشعور بحرقان، الم، حكة أو تفاوت الانتفاخ.

تشمل العلامات التي تشير على رد فعل تحسسي ما يلي: طفح؛ مشاكل في البليغ أو التنفس؛ انتفاخ.

الشقين، الوجه، الخجولة أو اللسان؛ ضعف، دوار أو إغماء؛ غثيان.

الأعراض الجانبية التي قد تظهر بعد استعمال قرص مهبل.

• حكة، احمرار، طفح، انتفاخ، ازدجاج، حرقة، تهيج، نقشر في المهبل أو نزف.

• ألم في البطن أو في منطقة الحوض.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من عرض جانبي غير مذكور في النشرة، عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي.

التبيغ عن اعراض جانبية

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن اعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبيغ عن اعراض جانبية نتيجة لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحولك إلى استماراة عبر الإنترن特 للتبلغ عن الأعراض

الجانبية، أو غير مدخل الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يخزن الدواء؟

• تحتوي التسميم بخط هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و Moghal رؤية الأولاد / أو الأطفال، وهذا يتضمن التسميم.

• لا تبليغي التبيغ بين تعليمات صريحة من الطبيب.

• يمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يتضمن إلى اليوم الآخر من نفس الشهر.

• يجب التخزين في درجة حرارة تتحت الـ 25°C، يمنع التجفيف.

• يمنع إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحي أو في سلة المهملات في البيت. استثيري الصيدلي بالنسبة إلى كيفية التخلص من الدواء الذي لم يعد ضرورة استعمال بعد. هذه الوسائل ستساعد في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

بالاضافة إلى المركب المغفال، يحتوي الدواء أيضاً:

Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, crospovidone, calcium lactate pentahydrate, povidone, lactic acid, magnesium stearate, silicon dioxide.

كيف يبدو الدواء وماذا تحتوي المجموعة:

تحتوي كل عبوة على 3 أقراص للمهبل بلون أبيض إلى كريمي على شكل رصاصة، معية ضمن لوحة (بليستر) مع موصل (جهاز ادخال).


اسم المنتج وصاحب التسجيل وعنوانه: تبع اسرائيل. م.ض، شارع دفورا هفتا 124، تل أبيب 6944020.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 127.41.30473

تم تحرير هذه النشرة في أيار 2022، وفي تعليمات وزارة الصحة



صورة رقم 2



صورة رقم 1

أصحاب خارجاً الجزء الداخلي للجهاز (a) حتى يتوقف.

أداخلي فرساً مهبلهاً واحداً، داخل الجزء العريض من الجهاز (b).

3. آخرجي الموصى. بعد كل استعمال، قومي بزاللة المكبس (A) تماماً من داخل الموصى (B).

اغسليه بماء ساخن (لا يغلي) وبالصابون وحقفيه بعناية

4. بعد نهاية فترة العلاج، ارمي الموصى في مكان آمن، بعيداً عن متناول أيدي الأطفال. يمنع رمي الموصى في الم Yapah.

• يدوى القرص المهبلي، ولهذا السبب من المفضل وضع الغطاف الصحيحة لأنه يمكن ملاحظة بقايا بودرة بودرة مرتفعة بعد استعمال المستحضر. هذا لا يشير إلى أن العلاج لم يعلم كما ينبغي. لكن إذا لاحظت بقطعة كائنة من القرص التي لم تتب، من الجائز بإن الملاج لم ينجح، ويجب عليك التوجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

• لم يتم تكرر ذلك في المستقبل: ارتدي فقط ملابس داخلية غير ضيقة جداً ومصنوعة من القطن، وقوفهم يساعدكها بأوقات تمارينك. استحمري يومياً. عملية التدفيف في المرحاض يجب أن تتم من الأمام إلى الخلف. امتنعي عن ارتداء ملابس ضيقة جداً وحوارب من نابلون. امتنعي عن الاستخدام باسباب مطرد أو باستخدام مزيلات العرق في منطقة المهبل. يمنع فرك المنطقة بقوة بواسطة إسفنجية استحمام. يجب الامتناع من الجلوس في أحواض ماء ساخنة مع زيوت معطرة.

• إذا استعملت عن طريق الخطأ مقداراً دوائياً أعلى، أو إذا قام طبل أو شخص آخر بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ، توجهي فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضرري عليه الدواء معك.

إذا كنت استعملت هذا المستحضر في الوقت المطلوب:

• يجب استعمال المقدار الدوائي حال ذكر ذلك ومواسيل بقية العلاج كالمعادن.

• إذا ثبتت استعمال المقدار أكثر من يوم واحد فمن الجائز أن الدعوى القانونية لم تحل بالشكل الكامل. لذلك إذا استمرت الأعراض بعد انتهاء فترة العلاج، يجب التوجه إلى الطبيب.

يمكن استعمال الأدوية في الظل! تتحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن المقدار الدوائي في كل مرة تستعملين فيها دواء. ضعي النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أستنسنة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء، استثيري الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

جميع الأدوية، قد يتسبب استعمال كلورتي أعراض جانبية عند بعض المستعملات. لا تنداشي عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية من المحتمل إلا تعاني من أي منها.

الأعراض الجانبية التي تكتفي اهتماماً خاصاً:

إذا كنت تعانين من تحسس (حساسية) للمستحضر، يحدث رد فعل تحسسي بعد فترة وجيزة من