

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة

(مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

جولوكا

أقراص مطالية.

يحتوي كل قرص على:

دولوتيرافير (على شكل صوديوم) 50 ملغم dolutegravir (as sodium) 50 mg

ريلبيفيرين (على شكل هيدروكلورايد) 25 ملغم rilpivirine (as hydrochloride) 25 mg

لقائمة الموارد غير الفعالة ومولادات الحساسية في المستحضر، أنظر الفقرة 2 - "معلومات هامة عن بعض مرکبات الدواء" والفقرة 6 - "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء من أجله. لا تعطيه لآخرين فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

يُستخدم جولوكا لمعالجة HIV لدى الكبار من عمر 18 سنة وما فوق المتعالجين بأدوية مضادة للفيروسات الرجعية والذين تلوث HIV لديهم مسيطر عليه لفترة 6 أشهر على الأقل، من دون سوابق لفشل فيروسي وعدم خشية حدوث مقاومة أو مقاومة معروفة لمثبتات إنزيم ترانسكريبتاز العكسي اللا نوكليوزيدية (NNRTIs) أو مثبتات الإنزيم إنترنار.

جولوكا يحافظ على نسبة منخفضة من الفيروس بجسمك. بذلك يساعد على المحافظة على تعداد خلايا الـ CD4 بدمك. خلايا CD4 هي نوع من خلايا الدم البيضاء الهامة التي تساعد جسمك على محاربة التلوثات.

الفصيلة العلاجية

جولوكا هو دواء يحتوي على مرکبين فعالين يستعملان لمعالجة تلوث HIV: دولوتيرافير وريلبيفيرين. دولوتيرافير ينتمي إلى مجموعة الأدوية المضادة للفيروسات الرجعية التي تسمى مثبتات الإنزيم إنترنار (NIs). وريلبيفيرين ينتمي إلى مجموعة الأدوية المضادة للفيروسات الرجعية التي تسمى مثبتات إنزيم ترانسكريبتاز العكسي اللا نوكليوزيدية (NNRTIs).

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء:

- إذا كنت حساساً (الergic) للمواد الفعالة دولوتيرافير أو ريلبيفيرين أو لكل واحد من المرکبات الإضافية التي يحتويها الدواء (مفصلة في الفقرة 6).
- إذا كنت تتناول واحداً من الأدوية التالية، وذلك لأن بإمكانها التأثير على طريقة عمل جولوكا:
 - فامپریدین (fampridine) المعروف أيضاً باسم دالفامپریدین dalfampridine
 - كاربامازپین، أوكسکاربازپین، فینوباربیتال، فینیتوئین (أدوية لمعالجة الصرع ولمنع الاختلالات)
 - ریفامپیسین، ریفایپنتین (أدوية لمعالجة بعض التلوثات الجرثومية مثل السل)
 - أومیپرازول، إیزوأومیپرازول، لانسوپرازول، پانتوپرازول، رابیپرازول (أدوية لمنع والمعالجة القرحات المعدية، الحرقان أو مرض الإرتداد الحمضي)
 - دیکسامیتازون (کورتیکوسٹیروئید الذي يستعمل لمعالجة العديد من الحالات مثل الإلتهابات وردود الفعل التحسسية) عندما يؤخذ عن طريق الفم أو بالحقن، عدا العلاج لمرة واحدة
 - مستحضرات حاوية على St. John's wort (ھیپریکوم پیرفوراتوم) (مستحضر نباتي يستعمل لمعالجة الإكتئاب)
 - ← إذا كنت تتناول واحداً من المستحضرات التي ذكرت سابقاً، إسأل طبيبك بالنسبة لأدوية بديلة.
- إحك للطبيب إذا كنت تعتقد بأن واحد مما ذكر ينطبق عليك.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

إستشر الطبيب أو الصيدلي الخاص بك قبل تناول جولوكا.

ردود فعل تحسسية

جولوكا يحتوي على دولوتيرافير. دولوتيرافير يمكن أن يسبب رد فعل تحسسي حاد يعرف بإسم: رد فعل فرط الحساسية. عليك أن تعرف العلامات والأعراض الهامة التي يجب الإنتباه إليها عندما تتناول جولوكا.

← إقرأ المعلومات "ردود فعل تحسسية" في الفقرة 4 من هذه النشرة.

مشاكل في الكبد تشمل التهاب الكبد (hepatitis) من نوع B وأو C

إحك لطبيبك إذا وجدت لديك أو كانت لديك مشاكل في الكبد، بما في ذلك التهاب الكبد من نوع B وأو C. يدرس طبيبك إلى أي حد مشكلة الكبد خطيرة لديك قبل أن يقرر فيما إذا كان بمقدورك تتناول جولوكا.

إنتبه لأعراض هامة

يتطور لدى بعض الأشخاص الذين يتناولون أدوية للتلوث HIV مشاكل أخرى، التي قد تكون خطيرة. هذه تشمل:

• أعراض للتلوثات والإلتهاب

• آلام في المفاصل، تصلب ومشاكل في العظام عليك أن تعرف على العلامات والأعراض الهامة التي يجب توخي الحذر منها أثناء تناول جولوكا.

← إقرأ المعلومات "الأعراض الجانبية المحتملة الأخرى" في الفقرة 4 من هذه النشرة.

قم بحماية أشخاص آخرين

ينتشر تلوث HIV بالإتصال الجنسي مع شخص حامل للتلوث، أو عن طريق نقل دم ملوث (مثلاً، عن طريق مشاركة إبر الحقن). لا يزال بإمكانك نقل HIV أثناء تناول هذا الدواء، على الرغم من تناقص الخطورة عند تلقي علاج ناجع مضاد للفيروسات الرجعية. تحدث مع طبيبك عن وسائل الحذر المطلوبة لمنع عدو الأشخاص الآخرين.

الأطفال والتفاعلات بين الأدوية

هذا الدواء غير مخصص للإستعمال لدى الأطفال والمرأة دون عمر 18 سنة، وذلك لأن لم يتم فحصه لدى هؤلاء المتعالجين.

التدخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل، أو إذا استعملت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب ممنوع تناول جولوكا سوية مع بعض الأدوية الأخرى (أنظر "لا يجوز إستعمال الدواء إذا" في الفقرة 2).

من شأن بعض الأدوية أن تؤثر على طريقة عمل جولوكا، أو تزيد من إمكان أن تقاضي من أعراض جانبية. جولوكا يمكنه أيضاً أن يؤثر على طريقة عمل أدوية أخرى.

بلغ طبيبك إذا كنت تتناول واحداً من الأدوية المذكورة في القائمة التالية:

• ميفتورمين، لعلاج السكري.

• أدوية قد تؤدي لعدم إنتظام نظم القلب الذي يشكل خطراً على الحياة (Torsade de Pointes). وذلك لأن هذه الحالة يمكن أن تنتهي بوفاة.

• أدوية مسممة مضادات الكالسيوم، إضافات الحديد ومتعدد الفيتامينات

يتطور HIV يمكن أن ينتقل إلى الرضيع عبر حليب الأم.

إذا قيل لك من قبل طبيبك بأن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، تحدث مع طبيبك قبل تناول هذا الدواء.

يحتوي الدواء على أقل من 1 صوديوم (23 ملغم) لوحدة مقدار دوائي ولذلك يعتبر عملياً خال من الصوديوم.

3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب الإستعمال دائمًا بحسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

المقدار الدوائي الإعتيادي عادة هو:

المقدار الدوائي الإعتيادي من جولوكا هو قرص واحد مرة في اليوم.

يجب تناول جولوكا مع وجبة الطعام. وجبة الطعام هامة من أجل الحصول على المستويات الصحيحة من الدواء بجسمك. مشروب البروتينات (شراب غني بالبروتينات) لوحده، لا يشكل بدلاً عن

وجبة الطعام.

ممنوع سحق/شطر/مضغ القرص، وذلك للتأكد من تناول المقدار الدوائي بأكمله.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

ريفابوتين هو دواء لمعالجة بعض التلوثات الجرثومية. يمكن لهذا الدواء أن يقلل من كمية جولوكا بجسمك ويجعلها أقل نجاعة. فإذا كنت تتناول ريفابوتين، فمن شأن الطبيب أن يعطيك مقداراً دوائياً إضافياً من ريلبيفيرين. تناول قرص ريلبيفيرين من نفس الوقت مع جولوكا.

← إستشر طبيبك بالنسبة لتناول ريفابوتين سوية مع جولوكا.

الأدوية المضادة للحموضة

مضادات الحموضة، لإضافات الحديد ومتعدد الفيتامينات

يتمكن أن يقلل من إمتصاص جولوكا لداخل جسمك وأن يجعله أقل نجاعة.

لا تتناول مضاد الحموضة خلال الـ 6 ساعات التي تسبق تناول جولوكا، أو 4 ساعات على الأقل بعد تناوله.

← راجع طبيبك للإستشارة مرة أخرى بالنسبة لتناول الأدوية الخافضة للحموضة مع جولوكا.

هذا الدواء غير قادر على تناوله هذه الإضافات بنفس الوقت مع جولوكا، لا يجوز تناول إضافات الكالسيوم، إضافات الحديد أو متعدد الفيتامينات خلال الـ 6 ساعات التي تسبق تناول جولوكا، أو 4 ساعات على الأقل بعد تناوله.

← راجع طبيبك للإستشارة مرة أخرى بالنسبة لتناول الأدوية الكالسيوم، إضافات الحديد أو متعدد الفيتامينات مع جولوكا.

الأدوية المثبطة للمستقبل H₂ (مثلاً: سيميتيدين، فاموتيدين، رانيتيدين)

الأدوية المثبطة للمستقبل H₂ يمكنها أن تمنع من إمتصاص جولوكا لداخل جسمك وأن يجعله أقل نجاعة.

لا تتناول هذه الأدوية خلال الـ 12 ساعة التي تسبق تناول جولوكا أو 4 ساعات على الأقل بعد تناوله.

← راجع طبيبك للإستشارة مرة أخرى بالنسبة لتناول هذه الأدوية مع جولوكا.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر
إذا تناولت بالخطأ أكثر من اللازم من أقراص جولوكا، توجه حالاً إلى الطبيب أو الصيدلي الخاص بك. أرجوهم علبة جولوكا إذا أمكن.
إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء
في حال ملاحظتك لهذا الأمر خلال 12 ساعة من موعد تناول المقدار الدوائي الإعتيادي الخاص بك، تناول القرص لحظة تذكرك بذلك. يجب تناول قرص جولوكا مع وجبة الطعام. واصل بعد ذلك العلاج الخاص بك كالمعتاد.

في حال ملاحظتك لهذا الأمر بعد 12 ساعة، فوت المقدار الدوائي المنسي وتناول الجرعة الدوائية القادمة في الوقت الإعتيادي.
ـ لا تتناول جرعة دوائية مضاعفة للتنويض عن الجرعة الدوائية المناسبة.

في حال التقى بعد أقل من 4 ساعات من موعد تناول جولوكا، تناول قرصاً إضافياً مع وجبة الطعام. في حال التقى بعد أكثر من 4 ساعات من موعد تناول جولوكا، لا داعي لتناول قرصاً إضافياً حتى موعد تناول جرعتك القادمة.

لا يجوز التوقف عن تناول جولوكا بدون استشارة طبيبك. تناول جولوكا طالما أوصاك طبيبك بذلك. لا تتوقف إلا إذا أوصاك طبيبك بفعل ذلك.
لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء.

ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.
إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر **الطبيب أو الصيدلي.**

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال جولوكا قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تذهب من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أي منها.
من المهم جداً إبلاغ طبيبك عن أي تغيير يطرأ على صحتك.

ردود فعل تحسسية جولوكا يحتوي على دولوتيليجرافير، دولوتيليجرافير يمكن أن يسبب رد فعل تحسسي حاد يُعرف بإسم: رد فعل فرط الحساسية. رد الفعل هذا غير شائع (يمكن أن يظهر لدى حتى 1 من بين 100 شخص) لدى الأشخاص الذين يتناولون دولوتيليجرافير. في حال ظهور واحد من الأعراض التالية لديك:

- طفح جلدي
- سخونة عالية (إرهاق)
- قلة حيوية (إرهاق)

ـ إنفاس، أحياناً في الفم أو الوجه (وزمة وعائية)، الذي يسبب ضعوبة في التنفس
ـ آلام في العضلات أو المفاصل
أعراض جانبية شائعة جداً
هذه من شأنها أن تظهر لدى أكثر من 1 من بين 10 أشخاص:

- صداع
- دوار
- إسهال
- غثيان
- صعوبات في النوم (أرق)

أعراض جانبية شائعة جداً التي من شأنها أن تظهر في فحوص الدم:

- إرتفاع نسبة الإنزيمات الكبد (أمينو ترانسفيراز)
- إرتفاع الكوليسترول
- إرتفاع إنزيم الأميلاز الخاص بالبنكرياس (إنزيم هضمي)

أعراض جانبية غير شائعة
هذه من شأنها أن تظهر لدى حتى 1 من بين 100 شخص:

- رد فعل تحسسي (فرط حساسية) (أنظر "رد فعل تحسسي" فيما سبق في هذه الفقرة)
- إلتهاب الكبد (hepatitis)

ـ أفكار وتصرفات إكتئاب أو مشاكل في الصحة النفسية (نوبة هلع في السابق)
ـ ألم في المفاصل

أعراض جانبية نادرة
هذه من شأنها أن تظهر لدى حتى 1 من بين 1,000 شخص:

- فشل كبدي (العلامات يمكن أن تشمل: إصفرار الجلد وإصفرار بياض العينين أو بول داكن اللون عن المعتاد)
- إنتشار (خاصة لدى متعالجين الذين يتناولون جولوكوكوز في المعتاد)
- ـ إلتهاب الكبد (hepatitis)

أعراض جانبية متعددة أخرى
قد تتطور لدى الأشخاص الذين يتناولون علاجاً مشتركاً لهIV أغراضًا جانبية أخرى.
ـ الأشخاص الذين يتناولون علاجاً مشتركاً لهIV قد يطورون اضطرابات خلوكوز في الدم، تجدر الذكر أن تكون نسبة الشحوم في الدم أعلى من نسبة السكريات (أدنى من 30 درجة مئوية).

التبليغ عن أعراض جانبية
بإمكانك التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليل عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5) كيفية تخزين الدواء؟

• تحجب التسرب! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسرب. لا تسبب التقى بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

ـ لا يجوز إستعمال الدواء بعد انقضاء تاريخ الصلاحية (exp.date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ انقضاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

ـ يجب حفظ الدواء في العلبة الأصلية لحمايته من الرطوبة. يجب حفظ القنبينة محكمة الإغلاق. لا يجوز إخراج ماص الرطوبة.

ـ يجب التخزين دون وزن زائد (30 درجة مئوية).
ـ لا يجوز رمي الأدوية في الماء أو للحمام. لا تعود قيد الإستعمال.

ـ تساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

6) معلومات إضافية
ـ يحتوي الدواء بالإضافة للمواد الفعالة أيضاً -
ـ أنظر أيضاً الفقرة 2 في النشرة - "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء".

mannitol, microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, silicified microcrystalline cellulose, sodium starch glycolate (type A), povidone K29/32, sodium stearyl fumarate, povidone K30, magnesium stearate, croscarmellose sodium, polysorbate 20, polyvinyl alcohol, titanium dioxide, macrogol/PEG, talc, yellow iron oxide, red iron oxide.

ـ كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة -
ـ أقراص جولوكا المطلية هي زهرية، بيضاء، محدبة الجانبين ومطبوع عليها "3AT SV" من جانب واحد.

ـ الأقراص المطلية متوفرة ضمن قنينة مغلقة بقطعة صعب الفتح من قبل الأطفال.

ـ تعليمات الفتح: لإزالة الغطاء، يجب الضغط للأسفل والتدوير للليسار (ضد عقارب الساعة) بنفس الوقت.

ـ تعليمات الإغلاق: يجب إغلاق القنبينة جيداً بالغطاء، والتدوير بإتجاه اليمين (بإتجاه عقارب الساعة) حتى الإغلاق التام.

ـ تحتوي كل قنينة على 30 قرصاً مطلياً وماص للرطوبة (الرطوبة يجيء حفظ ماص الرطوبة داخل القنبينة بعد فتحها، لا يجوز إخراجه).

ـ أصحاب الإمتياز: چلاکسو سميثكلاين (إسرائيل) م.ض.، شارع بازل 25، بيتح تكملاً.

ـ المنتج: چلاکسو ويلكام A.S. بورچوس، إسبانيا.
ـ رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 00-35445-161-373T.

ـ من أجل سهولة وتهويين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المندك. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

ـ تم إعدادها في أيام 2022 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

ـ العلامات التجارية هي بملكية أو بإمتياز مجموعة شركات Healthcare VII.

ـ © 2022 مجموعة شركات Healthcare VII أو صاحب الإمتياز الخاص بها.