

XPOVIO® אקספוביו

Active Ingredient: SELINEXOR 20 MG

Dosage & Administration forms: Tablets, Per Os

Approved Therapeutic Indications:

Multiple Myeloma

Xpovio in combination with bortezomib and dexamethasone is indicated for the treatment of adult patients with multiple myeloma who have received at least one prior therapy.

Xpovio in combination with dexamethasone is indicated for the treatment of adult patients with relapsed refractory multiple myeloma (RRMM) who have received at least three prior therapies and whose disease is refractory to at least one proteasome inhibitor (PI), at least one immunomodulatory agent (IMiD), and an anti-CD38 monoclonal antibody (mAb).

Diffuse Large B-Cell Lymphoma

Xpovio is indicated for the treatment of adult patients with relapsed or refractory diffuse large B-cell Lymphoma (DLBCL), not otherwise specified, including DLBCL arising from follicular lymphoma, after at least 2 lines of systemic therapy.

**העלון לרופא עודכן ביולי 2022.
טקסט שהתווסף מסומן בקו תחתי, טקסט שהוסר מסומן בקו חוצה.**

העדכונים העיקריים בעלון לרופא נעשו בסעיפים הבאים:

9.3 Pharmacokinetics

Drug Interaction Studies

Clinical Studies

Acetaminophen: No clinically significant differences in selinexor pharmacokinetics were observed when co-administered with acetaminophen (up to 1,000 mg daily dose of acetaminophen).

Clarithromycin (a strong CYP3A4 inhibitor): No clinically significant differences in selinexor pharmacokinetics were observed when co-administered with clarithromycin (up to 1,000 mg daily dose of clarithromycin).

העלונים לרופא ולצרכן נשלחו למשרד הבריאות לצורך העלאתם למאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות וניתן לקבלם מודפסים על ידי פנייה לבעל הרישום: פרומדיקו בע"מ, רח' השילוח 6 ת.ד. 3340 פתח-תקווה טלפון: 03-9373737.

בכבוד רב ובברכה,
אודיה צור
רוקחת ממונה
פרומדיקו בע"מ

