نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة
(مستحضرات) - ١٩٨٦
يسوق الدواء حسب وصفة طبيب فقط.

ليركاپرس ١٠
ليركاپرس ٢٠
أقراص مطلية

التركيب:
كل قرص من **ليركاپرس ١٠** يحتوي على:
ليركانيديپين هيدروكلوريد ١٠ ملغ
Lercanidipine hydrochloride 10 mg
كل قرص من **ليركاپرس ٢٠** يحتوي على:
ليركانيديپين هيدروكلوريد ٢٠ ملغ
Lercanidipine hydrochloride 20 mg
لقائمة المواد غير الفعالة، الرجاء أنظر الفقرة ٦ «معلومات إضافية».

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.
تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.
وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.
هذا الدواء غير مخصص عادة للإستعمال لدى الأطفال والمراهقين دون عمر ١٨ سنة.

١) لأي غرض مخصص الدواء؟
يستعمل الدواء لعلاج ضغط الدم المرتفع.
الفصيلة العلاجية: حاجب قنوات الكالسيوم من مشتقات ديهيدروپيريدين.

٢) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:
- كنت حساساً (أليرجي) لليركانيديپين، لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة ٦: «معلومات إضافية») أو لأدوية أخرى من هذه الفصيلة مثل أملوديپين، نيكارديپين، فيلوديپين، إيسرادیپين، نيفيديپين أو لاسيديپين.
- لا تستعملي الدواء إذا كنت في فترة الحمل، تخططين للحمل، كنت في سن الخصوبة ولا تستعملي وسائل منع حمل ملائمة أو كنت في فترة الرضاعة.
- كنت تعاني من أمراض قلبية معينة: فشل قلبي خارج عن السيطرة، إعاقة في جريان الدم من القلب، ذبحة صدرية غير مستقرة (ذبحة صدرية أثناء الراحة أو تزداد تدريجياً) ولم ينقضي شهر من النوبة القلبية.
- كنت تعاني من مرض شديد في الكبد أو الكلى.
- كنت تتناول بالتزامن: سيكلوسپورين، أدوية مضادة للفطريات مثل كيتوكونازول أو إيتراكونازول، مضادات حيوية من فصيلة ماكروليدات مثل إريترومیسين أو ترولاندوميسين، أدوية مضادة للفيروسات مثل ريتونافير.
- كنت تستهلك الچريفون أو شراب الچريفون.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:
قبل العلاج بـ ليركاپرس، إحك للطبيب إذا:
- كنت تعاني من مشاكل في الكبد أو الكلى، أو كنت تجتاز علاجات ديناليزا (غسل كلى).
- كنت تعاني من مشاكل معينة أخرى في القلب (مثل متلازمة sick sinus syndrome)، لم تعالج بواسطة إدخال ناظمة قلبية.
- كنت تعاني من ذبحة صدرية.
- قيل لك في الماضي من قبل الطبيب بأن لديك عدم تحمل لسكريات معينة.
- كنت حساساً لأي طعام أو لأي دواء.

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخص إذا كنت تتناول:
- أدوية أخرى لخفض ضغط الدم المرتفع، مثل حاجبات β (beta blockers)، مدرات البول أو مثبطات ACE، كينيديين أو أميودارون (للنبض المتسارع)، فينيتوئين، كاربامازيپين (للتشنجات) - من الجائز أن يتابع طبيبك قيم ضغط الدم بوتيرة أعلى من المعتاد.
- ريفامپيسين (للسل)، سيميتيدين (للقرحة المعدية، إضطراب في الهضم وحرقة) - أكثر من ٨٠٠ ملغ في اليوم، ميدازولام (للمساعدة على النوم)، أستيميزول أو ترفينأدين (للحساسية)، ديچوكسين، سيمڤاستاتين (لخفض الكولسترول).
- الأدوية المفصلة في الفقرة «لا يجوز إستعمال الدواء إذا».

إستعمال الدواء والطعام
إن إستهلاك الچريفون أو شراب الچريفون قد يزيد من تأثير **ليركاپرس** لذا يجب الإمتناع عن ذلك أثناء فترة العلاج.
يفضل تناول الدواء في الصباح، ١٥ دقيقة على الأقل قبل وجبة الصباح، لأن الوجبات الغنية بالشحوم قد تزيد وبشكل ملحوظ من نسبة الدواء في الدم.

إستعمال الدواء وإستهلاك الكحول
يجب الإمتناع عن إستهلاك المشروبات الكحولية أثناء فترة تناول **ليركاپرس** نظراً لأن الكحول قد يزيد من تأثير الدواء.

الحمل والإرضاع
لا يجوز إستعمال الدواء إذا كنت في فترة الحمل، تخططين للحمل، أو إذا كنت في سن الخصوبة ولا تستعملي وسائل منع حمل ملائمة. يجب إستشارة الطبيب إذا كنت تتناولين **ليركاپرس** وتظنين بأنك حامل.
لا يجوز إستعمال الدواء إذا كنت في فترة الرضاعة.

السياقة وإستعمال الماكنات
إن إستعمال الدواء قد يؤدي إلى دوار، ضعف وإرهاق، لهذا يجب التأكد بأن للدواء لا يوجد تأثير كهذا عليك قبل القيام بنشاطات مثل السياقة أو تشغيل الماكنات.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء
يحتوي الدواء على اللكتوز. إذا قيل لك في الماضي من قبل الطبيب بأنك تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة، إستشر الطبيب قبل بدء العلاج بهذا الدواء.

٣) كيفية إستعمال الدواء؟
يجب الإستعمال حسب تعليمات الطبيب دائماً.
عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.
الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.
الجرعة الدوائية الإعتيادية هي عادة: قرص واحد من **ليركاپرس ١٠** في اليوم.
إذا دعت الحاجة من شأن الطبيب أن يزيد الجرعة الدوائية إلى قرص واحد من **ليركاپرس ٢٠** في اليوم.
لا تتجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.
يجب تناول الدواء في نفس الساعة كل يوم. يجب بلع القرص مع القليل من الماء. يستحسن في الصباح ١٥ دقيقة على الأقل قبل تناول وجبة الصباح. يمكن شطر أو سحق القرص للإستعمال الفوري.
الدواء غير مخصص عادة للأطفال وللمراهقين دون عمر ١٨ سنة.

فحوصات ومتابعة
يجب إجراء فحوصات ضغط الدم، التخطيط الكهربائي للقلب ونظم القلب أثناء فترة العلاج بهذا الدواء.
إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، عليك التوجه حالاً للطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر علبة الدواء معك. إذا تناولت بالخطأ جرعة دوائية أكبر قد تظهر العلامات التالية: إنخفاض كبير جداً في ضغط الدم، نظم قلب غير منتظم أو سريع، فقدان للوعي.
لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب!
إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، يجب تناول جرعة دوائية حالاً عند تذكرك بذلك، لكن إذا إقترب موعد تناول الجرعة الدوائية التالية فقم بتفويت الجرعة الدوائية المنسية وتناول الجرعة الدوائية التالية في الوقت. لا يجوز في أي حال من الأحوال تناول جرعتين دوائيتين معاً.
حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية لا يجوز التوقف عن العلاج بشكل مفاجئ بدون إستشارة الطبيب، إذا توقفت عن إستعمال الدواء قد يرتفع ضغط دمك ثانية.
لا تتناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.
إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

٤) الأعراض الجانبية
كما بكل دواء، إن إستعمال **ليركاپرس** قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز الا تعاني أيا منها.
يجب التوقف عن الإستعمال ومراجعة الطبيب حالاً عند ظهور:
إنتفاخ في الكاحلين أو الرجلين، ضربات قلب سريعة (خفقان)، آلام عضلية، ذبحة صدرية، زيادة في حجم أو وتيرة التبول (نادراً)؛ تضخم اللثة، هبوط ضغط الدم، ألم في الصدر (نادر جداً)؛ إغماء ورد فعل تحسسي (قد تظهر أعراض مثل: حكة، طفح، شرى).
بلغ في حالات نادرة بأن أدوية أخرى من هذه الفصيلة تسبب تضخماً في اللثة. لدى مرضى يعانون من ذبحة صدرية، فإن أدوية أخرى من هذه الفصيلة قد تزيد من وتيرة، فترة أو شدة النوبات. تم ملاحظة حالات منفردة لإحتشاء عضلة القلب. في حال قاسيت من إحدى تلك المشاكل عند إستعمال **ليركاپرس**، يجب إبلاغ الطبيب حالاً.

أعراض جانبية إضافية:
أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر لدى ١-١٠ مستعملين من بين ١٠٠٠): صداع؛ دوار؛ نبض سريع؛ ضربات قلب؛ إحمرار مفاجئ للوجه، الرقبة أو الصدر.
أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر لدى ١-١٠ مستعملين من بين ١٠٠٠٠): إضطرابات في الجهاز الهضمي تشمل صعوبات في الهضم، حرقة، إسهال، غثيان، تقيؤ وألم في البطن؛ الميل إلى النوم؛ ضعف؛ إرهاق؛ طفح؛ زيادة في التبول؛ آلام عضلية.
أعراض جانبية نادرة جداً (أعراض تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين ١٠٠٠٠) أو أعراض جانبية شيوعها غير معروف: تضخم اللثة؛ تغيرات في وظيفة الكبد (التي تظهر في الفحوصات المخبرية)؛ إرتفاع في وتيرة التبول؛ إنخفاض في ضغط الدم الذي قد يؤدي إلى دوار وإغماء؛ رد فعل تحسسي؛ ألم في الصدر ونوبة قلبية.
إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، أو إذا طرأ تغير على شعورك العام، عليك إستشارة الطبيب حالاً.

٥) كيفية تخزين الدواء؟
- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب تخزين الدواء دون ٢٥ درجة مئوية في مكان محمي من الضوء.

٦) معلومات إضافية
يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:
Microcrystalline cellulose, Lactose, Sodium starch glycollate, Povidone, Magnesium stearate, Opadry white Y-1-7000, Opadry yellow OY-6478.

يحتوي كل قرص من **ليركاپرس ١٠** على:
ما يقارب ٣٩ ملغ لكتوز وما يقارب ٠,٥ ملغ صوديوم.
يحتوي كل قرص من **ليركاپرس ٢٠** على:
ما يقارب ٧٨ ملغ لكتوز وما يقارب ١ ملغ صوديوم.
كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:
ليركاپرس معبأ ضمن لويحات (بليستر) حيث يتم إدخالها إلى داخل علبة كرتون. في كل علبة من **ليركاپرس** يوجد ٣٠ قرصاً.
ليركاپرس عبارة عن أقراص مطلية، مستديرة، محدبة من كلا الجانبين، لونها أصفر، مع شق للشطر من جانب واحد.

انتاج: اونيفارم م.ض المجمع الصناعي: "مابو كرمل"
صاحب التسجيل:
اونيفارم م.ض ص.ب ٢١٤٢٩ تل- ابيب ٦١٢١٣٠١
أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها فُحص ورُخص في تاريخ: آب ٢٠١٤
رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:
ليركاپرس ١٠: ٠٠-٣١٨٤٨-٥١-١٤١
ليركاپرس ٢٠: ٠٠-٣٢٩٧٥-٦٧-١٤٣

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.