עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים
(תכשירים) התשמ״ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד.

לרקפרס 10
לרקפרס 20
טבליות מצופות

הרכב:
כל טבליה של **לרקפרס 10** מכילה:
לרקאנידיפין הידרוכלוריד 10 מ״ג
Lercanidipine hydrochloride 10 mg
כל טבליה של **לרקפרס 20** מכילה:
לרקאנידיפין הידרוכלוריד 20 מ״ג
Lercanidipine hydrochloride 20 mg

לרשימת החומרים הבלתי פעילים, אנא ראה סעיף 6: ״מידע נוסף״.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לשימוש בילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה משמשת לטיפול ביתר לחץ דם.

קבוצה תרפויטית: חוסם תעלות סידן מנגזרת דיהידרופירידינים.

2. לפני השימוש בתרופה

☒ **אין להשתמש בתרופה אם:**

- אתה רגיש (אלרגי) ללרקאנידיפין, לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6: ״מידע נוסף״) או לתרופות אחרות מקבוצה זו כגון אמלודיפין, ניקרדיפין, פלודיפין, איסראדיפין, ניפדיפין או לצידיפין.
- אל תשתמשי בתרופה אם הנך בהריון, מתכננת הריון, הנך בגיל הפוריות ואינך משתמשת באמצעי מניעה נאותים או הנך מניקה.
- הנך סובל ממחלות לב מסוימות: כשל לב לא נשלט, חסימה בזרימת דם מהלב, תעוקת חזה לא יציבה (תעוקת חזה במנוחה או שגדלה בהדרגה) ולא עבר חודש ימים מהתקף לב.
- הנך סובל ממחלת כבד או כליות קשה.
- הנך נוטל במקביל: ציקלוספורין, תרופות אנטי פטרייתיות כגון קטוקונזול או איטרקונזול, אנטיביוטיקות ממשפחת המקרולידים כגון אריתרומיצין או טרולאנדומיצין, תרופות אנטי ויראליות כגון ריטונביר.
- הנך צורך אשכוליות או מיץ אשכוליות.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:
לפני הטיפול בלרקפרס, ספר לרופא אם:

- הנך סובל מבעיות כבד או כליות, או עובר טיפולי דיאליזה.
- הנך סובל מבעיות לב מסוימות אחרות (כגון תסמונת sick sinus syndrome), שלא טופלו על-ידי החדרת קוצב לב.
- הנך סובל מתעוקת חזה.
- נאמר לך בעבר על-ידי רופא שיש לך אי סבילות לסוכרים מסוימים.
- הנך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי.

❗**אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.** במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם הנך נוטל:

- תרופות אחרות להורדת לחץ דם גבוה, כגון חוסמי β (beta blockers), משתנים או מעכבי ACE, קינידין או אמיודארון (לדופק מואץ), פניטואין, קרבמזפין (לעוויתות) - ייתכן והרופא יעקוב אחרי ערכי לחץ הדם בתדירות גבוהה יותר מהרגיל.
- ריפאמפיצין (לשחפת), סימטידין (לכיב קיבה, הפרעה בעיכול וצרבת) - יותר מ- 800 מ״ג ליום, מידאזולם (להשראת שינה), אסטמיזול או טרפנאדין (לאלרגיה), דיגוקסין, סימבסטטין (להורדת כולסטרול).
- תרופות המפורטות בסעיף ״אין להשתמש בתרופה אם״.

❗**שימוש בתרופה ומזון**

צריכת אשכוליות או מיץ אשכוליות עלולה להגביר את השפעת **לרקפרס** ולכן יש להימנע מכך בתקופת הטיפול.

עדיף ליטול את התרופה בבוקר, 15 דקות לפחות לפני ארוחת הבוקר, מפני שארוחות עשירות בשומנים עלולות להעלות בצורה משמעותית את רמת התרופה בדם.

❗**שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול**

יש להימנע מצריכת משקאות אלכוהוליים בתקופת נטילת **לרקפרס** היות ואלכוהול עלול להגביר השפעת התרופה.

❗**הריון והנקה**

אין להשתמש בתרופה אם הנך בהריון, מתכננת הריון, או אם הנך בגיל הפוריות ואינך משתמשת באמצעי מניעה נאותים. יש להיוועץ ברופא אם הנך נוטלת **לרקפרס** וחושבת שהנך בהריון.
אין להשתמש בתרופה אם הנך מניקה.

❗**נהיגה ושימוש במכונות**

השימוש בתרופה עלול לגרום לסחרחורת, חולשה ועייפות, ועל-כן יש לוודא כי אין לה השפעה כזו עליך לפני ביצוע פעילויות כגון נהיגה או הפעלת מכונות.

❗**מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה**

תרופה זו מכילה לקטוז. אם נאמר לך בעבר על-ידי רופא שיש לך אי סבילות לסוכרים מסוימים, היוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול בתרופה זו.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.
המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד.
המינון המקובל בדרך כלל הוא: טבליה אחת של **לרקפרס 10** ליום.
במידת הצורך הרופא עשוי להגדיל את המינון לטבליה אחת של **לרקפרס 20** ליום.
אין לעבור על המנה המומלצת.
יש לקחת את התרופה באותה השעה בכל יום.
יש לבלוע את הטבליה עם מעט מים, עדיף בבוקר לפחות 15 דקות לפני ארוחת בוקר. ניתן לחצות או לכתוש את הטבליה לשימוש מיידי.
התרופה אינה מיועדת בדרך כלל לילדים ולמתבגרים מתחת לגיל 18.

בדיקות ומעקב
בתקופת הטיפול בתרופה זו יש לערוך בדיקות לחץ דם, א.ק.ג. וקצב לב.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, עליך לפנות מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים, ולהביא אריזת התרופה איתך. אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר עלולים להופיע הסימנים הבאים: ירידה גדולה מדי בלחץ הדם, קצב לב לא סדיר או מהיר, אובדן הכרה.
אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא!

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן קצוב, יש ליטול מנה מיד כשנזכרת, אך אם זמן נטילת המנה הבאה קרוב דלג על המנה שנשכחה וטול את המנה הבאה בזמן. בשום אופן אין ליטול שתי מנות יחד.
גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק את הטיפול באופן פתאומי ללא התייעצות עם רופא, אם אתה מפסיק את השימוש בתרופה לחץ הדם שלך עלול לעלות שוב.
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש ב**לרקפרס** עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא בהופעת:
נפיחות בקרסוליים או ברגליים, דפיקות לב מהירות (פלפיטציות), כאבי שרירים, תעוקת חזה, עליה בנפח או בתכיפות השתן (נדיר); עיבוי החניכיים, נפילה בלחץ דם, כאב בחזה (נדיר מאוד); עילפון ותגובה אלרגית (עלולים להופיע תסמינים כגון: גרד, פריחה, חרלת).
תרופות אחרות מהקבוצה הזאת דווחו במקרים נדירים כגורמות לעיבוי החניכיים. בחולים עם תעוקה, תרופות אחרות מקבוצה זו עלולות להעלות את תדירות, משך או חומרת ההתקפים. נצפו מקרים בודדים של אוטם שריר הלב. במידה והנך חווה עם **לרקפרס** אחת מהבעיות האלו, יש לדווח מיד לרופא.

תופעות לוואי נוספות:
תופעות לוואי שאינן שכיחות (תופעות שמופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 1,000): כאב ראש; סחרחורת; דופק מהיר; דפיקות לב; האדמה פתאומית של הפנים, הצוואר או החזה.
תופעות לוואי נדירות (תופעות שמופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 10,000): הפרעות במערכת העיכול הכוללות קשיי עיכול, צרבת, שלשול, בחילה, הקאה וכאב בטן; ישנוניות; חולשה; עייפות; פריחה; השתנה מרובה; כאבי שרירים.
תופעות לוואי נדירות מאוד (תופעות שמופיעות בפחות ממשתמש אחד מתוך 10,000) או תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה: עיבוי חניכיים; שינויים בתפקוד הכבד (הנראים בבדיקות מעבדה); עליה בתדירות הטלת השתן; ירידה בלחץ הדם שעלולה לגרום לסחרחורת ולעילפון; תגובה אלרגית; כאב בחזה והתקף לב.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, אם אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית, עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן את התרופה בטמפרטורה מתחת ל- 25°C ובמקום מוגן מאור.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:
Microcrystalline cellulose, Lactose, Sodium starch glycollate, Povidone, Magnesium stearate, Opadry white Y-1-7000, Opadry yellow OY-6478.

כל טבליה של **לרקפרס 10** מכילה:
כ- 39 מ״ג לקטוז וכ- 0.5 מ״ג נתרן.
כל טבליה של **לרקפרס 20** מכילה:
כ- 78 מ״ג לקטוז וכ- 1 מ״ג נתרן.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
לרקפרס ארוזה בתוך מגשיות (בליסטר) אשר מוכנסות לתוך אריזת קרטון. בכל אריזה של **לרקפרס** יש 30 טבליות.
לרקפרס הנן טבליות מצופות, עגולות, קמורות משני צידיהן, בצבע צהוב, עם קו חצייה מצידן האחד.

יצרן: אוניפארם בע״מ, פארק תעשיות ״מבוא כרמל״

בעל הרישום:
אוניפארם בע״מ, ת.ד. 21429 ת״א 6121301

עלון זה נבדק ואושר ע״י משרד הבריאות בתאריך: אוגוסט 2014.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
לרקפרס 10: 00 31848 51 141
לרקפרס 20: 00 32975 67 143

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

אוניפארם בע״מ