

أكماول 250 ملغ**حبّيات في عبوات شخصية****التركيب**

تحتوي كل عبوة شخصية على:

باراسيتامول 250 ملغ (Paracetamol 250 mg)

معلومات حول المركبات غير الفعالة والمثيرة للحساسية في المستحضر. انظر البند 2
معلومات هامة عن قسم من مركبات الدواء والبند 6 - "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة تجتمع حتى نهايتها وذلك قبل أن تستعمل الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

الدواء مخصوص للأطفال من جيل 4 سنوات وما فوق. يجب عليك تناول هذا الدواء بموجب التعليمات في بند مقدار الجرعة في هذه النشرة. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات.

يجب التوجه إلى الطبيب إذا استمرت السخونة لأكثر من 3 أيام أو إذا تفاقمت الأعراض أو لم ينفع في غضون 5 أيام، على الرغم من استعمال الدواء.

1. لم أعد هذا الدواء؟

الدواء مخصوص لتسكين الآلام ولخفض السخونة.
الفصيلة العلاجية: مسكن الآلام وخفض السخونة.

2. قبل استعمال الدواء

يمكن استعمال الدواء إذا:

• كان معروفاً خاصاً تتعلق بالتسكين لديك لـ باراسيتامول أو لأحد المركبات الأخرى في الدواء (انظر البند 6).

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء
• إذا كنت قد طورت في الماضي أعراضًا جانبية حادة نتيجة تناول مستحضرات تحتوي على باراسيتامول، فيتم تناول مستحضرات تحتوي على باراسيتامول، كي لا تحدث ثانية.

• يحتوي المستحضر على باراسيتامول، الذي قد يسبب ضرراً في الكبد عندما:

0 يُعطى بجرعة يفوق أعلى من الموصى به أو لفترة طويلة
0 يتم شرب مشروبات كحولية أثناء العلاج

• يُمنع استعمال هذا الدواء في أوقات متقاربة دون استشارة الطبيب.
• يُمنع تناول أدوية إضافية لخفض السخونة وتلسكين الآلام أو أدوية لنزلات البرد دون استشارة الطبيب أو الصيدلي، لأنها قد تؤدي جرعة مفرطة أو تسمم من الـ باراسيتامول.

• يُمنع تناول أدوية إضافية من "عائلة أكماول" وأو مستحضرات إضافية تحتوي على باراسيتامول.

• يجب تجنب تناول جرعة عالية (حتى لو كانت ضمن نطاق الجرعة الموصى بها) من هذا الدواء أثناء الصوم.

أخير الطبيب قبل بدء العلاج إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من:

• حساسية لطعام أي كان أو لدواء أي كان
• مرض كبيدي أو خلل في وظيفة الكبد

• خلل في وظيفة الكلى
• إدمان على الكحول

• ترقق
• إذا كنت حاماً أو مرضعة

رود ببن الأدوية
إذا تناولت أو إذا تناولت موخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية دون وصفة طبيب والمكملات الغذائية، أخير الطبيب أو الصيدلي بذلك، خاصة إذا كنت تتناول:

• أدوية ضد نزيف الدم مثل أفارارين

• مستحضرات تحفّز إنتاج إنزيمات في الكبد (مثل: ريفامبيسين، بريبيوتات)

- أدوية للصرع - فنتين، كاربامازيبين
- مستحضرات مضادة للالتهاب لا ستيرويدية
- ميتوكلوراميد أو دوميريدون (العلاج الغثائي، التقيؤ ومشاكل هضم إضافية)
- كلور أمفيتنيكول (مضادة حيوى)
- بروبروفين (العلاج المقرب)
- كوكسيتيرامين (التقليل فرط الدهون في الدم)
- استعمال الـ باراسيتامول واستهلاك الكحول
يمكن استهلاك الكحولثناء العلاج بـ باراسيتامول وذلك بسبب زيادة خطر الإصابة بضرر الكبد.

الحمل والرضاع**الحمل**

- إذا كنت حاملاً فيجب استشارة الطبيب قبل بدء استعمال الدواء.
يجب تناول أقل جرعة فعالة بالنسبة لك لتلسكين الآلام وأو لخفض السخونة، لأنصر فتره زمنية ممكنة. استشيري الطبيب إذا ما يخف الآلام أو السخونة أو إذا كنت بحاجة إلى تناول الدواء في أوقات أكثر تواترًا.

الإرضاع

- تنقل كميات صغيرة من الـ باراسيتامول إلى حليب الأم، يجب استشارة الطبيب قبل الاستعمال.
القيادة واستعمال الماكينات
لا يثر باراسيتامول على القدرة على القيادة أو تشغيل الماكينات.

- معلومات هامة عن قسم من مركبات الدواء
تحتوي كل عبوة شخصية من أكماول 250 ملغ على:

- سكروز بمقدمة تعادل 0.1 ملغ: إذا قيل لك من قبل الطبيب أنك حساس لسكرارات معينة،
- سوربيتول بمقدمة 601 ملغ: سوربيتول هو مصدر للفركتوز، إذا كانت لديك حساسية لسكرارات معينة أو لديك حساسية وراثية للفركتوز (HFI) فيجب استشارة الطبيب قبل الاستعمال. قد يسبب سوربيتول ارتفاعاً في السكر في البطن وإسهالاً.
- سكر الورز بمقدمة 3 ملغ.
- مواد تكثيفية: نكهة فانيل ونكهة توت.

الاستعمال لدى الأطفال

- هذا الدواء مخصوص للأطفال من جيل 4 سنوات وما فوق، أنظر للبند 3 - "كيف تستعمل الدواء".
يجب على الوالدين إبلاغ الطبيب عن جميع الأعراض الجانبية وكذلك عن أي دواء إضافي يُعطي للأطفال.

3. كيف تستعمل الدواء؟

- يجب عليك التحدث مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكون متancockاً فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر.

في حالة عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب، فإن الجرعة المقصولة عادة هي:

الأطفال في جيل 9-12 سنة:

- 1-2 عبوات شخصية من أكماول 250 ملغ، كل 4-6 ساعات، حسب الحاجة.
يُمنع تناول أكثر من 8 عبوات شخصية في يوم واحد (2 غرام باراسيتامول).

الأطفال في جيل 4-8 سنوات:

- عنوة شخصية واحدة من أكماول 250 ملغ، كل 4-6 ساعات، حسب الحاجة.
يُمنع تناول أكثر من 4 عبوات شخصية في يوم واحد (1 غرام باراسيتامول).
يُمنع تناول جرعة الموصى بها.

- يجب تجنب تناول جرعة الموصى بها.
أو لم تنتهي تناول جيل 4 أيام، على الرغم من استعمال الدواء.

طريقة الاستعمال

- يمكن التناول مع الطعام. يجب فتح العبوة الشخصية من أكماول 250 ملغ، تفريغ محتواها مباشرة داخل الفم، على اللسان، والبلع. لا حاجة للماء.

- إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا اتبعت طفل من الدواء عن طريق الخطأ، فيجب التوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وإحضار علبة الدواء معك. لا تتبسي التقطور دون تعليمات صريحة من الطبيب حتى لو كنت تتعافى جيداً بالرغم من تناول جرعة مفرطة، فإن العلاج الفوري ضروري، يسبب الخطر لتتطور ضرر خطير في الكبد. قد تسبب جرعة المفرطة الأعراض التالية: غثيان وقيء، إسهال، فقدان الشهية، الآلام، انتفاخ، زيادة التعرق، آلم أو حساسية في البطن العلوي. من المحتفل أنها لا تعكس شدة الضرر للכבד.

5. كيف يخزن الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي و المجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وهكذا تجنب التسمم. لا تسيب التقى بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينبع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب التخزين دون الد 25°C في العبوة الأصلية، للحماية من الضوء والرطوبة.

6. معلومات إضافية

إضافة للمادة الفعالة يحتوي الدواء أيضاً على:

Sorbitol, talc, basic butylated methacrylate polymer, strawberry flavor, vanilla flavor, magnesium oxide light, sodium carmellose, sucralose, magnesium stearate, hypromellose, stearic acid, sodium dodecyl sulfate, titanium dioxide, simeticone.

كيف يبدو الدواء وماذا تحتوي العبوة:

تحتوي علبة أفكامول 250 ملغ على عبوات شخصية (أكياس) من الألومينيوم. في كل عبوة شخصية هناك خيبات دواء بلون أبيض أو بطيء قريب للأبيض. تمت المصادقة على المستحضر للتسيير بالأحجام التالية: 40، 24، 20، 10، 8، 3، 2 عبوة شخصية.

قد لا يتم تسويق جميع أحجام العبوات.

اسم المنتج وصاحب التسجيل وعنوانه:

تيفع إسرائيل م.ض.، شارع دفورا هنينا 124، تل أبيب 6944020

تم تحرير هذه النشرة في شباط 2022 وفق تعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 148.51.33446

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها، ورد النص بصيغة المذكر. مع هذا، فالدواء معد لأنباء كلا الجنسين.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.
إذا كانت لديك أسللة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء، فاستشير الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، قد يسبب استعمال أفكامول 250 ملغ أعراضًا جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تتدesh عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل أنّ تعاني من أيّ منها.
قد تكون الأعراض الجانبية أكثر حدة لدى المسنين.

أعراض جانبية خطيرة:

يجب التوقف عن العلاج والتوجه فوراً إلى الطبيب:

- إذا ظهرت ردود فعل تحسسية حادة مثل تورم الأطراف، الطفح والحكمة، تورم الوجه، الشفتين، اللسان و/أو الحلق الذي قد يسبب صعوبات في التنفس أو البلع.
 - إذا ظهرت، في حالات نادرة، أمراض جلدية وخيمة التي يمكن أن تكون علاماتها أحمرار، طفح، بثور أو إصابة جلدية واسعة النطاق.
- قد تظهر أعراض جانبية جلدية حادة، حتى لو كنت قد تناولت في الماضي مستحضرات تحتوي على المركب الفعال پاراسيتامول ولم تعاني من أعراض جانبية.
- إذا ظهرت أعراض جانبية جلدية، يجب التوقف عن العلاج والتوجه إلى الطبيب على الفور.
 - إذا ظهرت علامات لتغيرات في الجهاز الدموي مثل: النزيف، ظهور كدمات بسهولة، تطور حالات عدوى بسهولة كبيرة نتيجة انخفاض حاد في عدد خلايا الدم البيضاء.
 - إذا ظهر ضيق في التنفس (نادر).

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

الإبلاغ عن أعراض جانبية

يمكن الإبلاغ لوزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "الإبلاغ عن أعراض جانبية نتيجة علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحولك إلى استماراة عبر الإنترنت للإبلاغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>