

אבקמול 250 מ"ג

גרנולות באריזות אישיות

הרכב

כל אריזה אישית מכילה:

פראצטמול 250 מ"ג (Paracetamol 250 mg)

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ואולרגניים בתכשיר ראה סעיף - 2 "מידע חשוב על חלק ממרכיבי התרופה" וסעיף 6 - "מידע נוסף."

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

התרופה מיועדת לילדים מגיל 4 שנים ומעלה. עליך ליטול את התרופה על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה. היועץ ברוקח אם הינך זקוק למידע נוסף. יש לפנות לרופא אם החום נמשך יותר מ-3 ימים או אם התסמינים מחמירים או אינם חולפים תוך 5 ימים, למרות השימוש בתרופה.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לשיכוך כאבים ולהורדת חום.

קבוצה תרופית: משכך כאבים ומוריד חום.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- ידועה רגישות לפראצטמול או לאחד ממרכיביה האחרים של התרופה (ראה סעיף 6).

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

- אם פיתחת בעבר תופעות לוואי עוריות כתוצאה מנטילת תכשירים המכילים פראצטמול, אין ליטול תכשירים המכילים פראצטמול, כדי שלא תגרמנה שוב תופעות עוריות חמורות.
- התכשיר מכיל פראצטמול, העלול לגרום לנזק כבד כאשר:
 - ניתן במינון גבוה מהמומלץ או לתקופה ממושכת
 - בזמן הטיפול שותים משקאות אלכוהוליים
 - נוטלים תרופות נוספות המשפיעות על תפקוד הכבד
- אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות מבלי היועץ ברופא.
- אין ליטול תרופות נוספות להורדת חום ולשיכוך כאבים או תרופות להצטננות ללא התייעצות עם רופא או רוקח, למניעת מינון יתר או הרעלה של פראצטמול.
- אין ליטול תרופות נוספות מ-"משפחת אקמול" ו/או תכשירים נוספים המכילים פראצטמול.
- יש להימנע מלקיחת מינון גבוה (גם אם בתוך טווח המינון המומלץ) של תרופה זו בזמן צום.

ספר לרופא לפני התחלת הטיפול אם אתה סובל או סבלת בעבר מ:

- רגישות למזון כלשהו או לתרופה כלשהי
- מחלת כבד או ליקוי בתפקוד הכבד
- ליקוי בתפקוד הכלייה
- אלכוהוליזם
- אהבת
- אם את בהריון או מניקה

תגובות בין-תרופתיות

אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- תרופות נגד קרישת דם כגון וארפרין
- תכשירים המזרחים ייצור אנזימים בכבד (לדוגמה: ריפמפיצין, ברביטורטים)
- תרופות לאלפסה - פניטואין, קרבמפיין
- תכשירים נגדי זדקת שאינם סטרואידים
- מוסקולופרמיד או דוקפרידון (לטיפול בחילה, הקאה ובעיות עיכול נוספות)
- כלורמפניקול (אנטיביוטיקה)
- פרובנצייד (טיפול בשיגדון)
- כולסטרילמיין (להפחתת עודף שומנים בדם)

שימוש בפראצטמול וצריכת אלכוהול

אין לצרוך אלכוהול בזמן הטיפול בפראצטמול בגלל עלייה בסיכון לנזק לכבד.

היריון והנקה

היריון

אם הינך בהריון יש להיוועץ ברופא לפני התחלת השימוש בתרופה. יש ליטול את המנה הנמוכה ביותר היעילה עבורך לשיכוך הכאב ו/או להורדת החום, למשך הזמן הקצר ביותר האפשרי. היועצי ברופא אם אין הקלה בכאב או בחום או אם את צריכה ליטול את התרופה לעיתים תכופות יותר.

הנקה

כמויות קטנות של פראצטמול עוברות לחלב אם. יש להיוועץ ברופא לפני השימוש.

נהיגה ושימוש במכוונות

פראצטמול אינו משפיע על היכולת לנהוג או להפעיל מכוונות.

מידע חשוב על חלק ממרכיבי התרופה

כל אריזה אישית של אבקמול 250 מ"ג מכילה:

- סוכרוז בכמות של 0.1 מ"ג: אם נאמר לך על ידי הרופא כי אתה רגיש לסוכרים מסוימים, היועץ ברופא לפני נטילת תרופה זו.
- נתרן: תרופה זו מכילה פחות מ-23 מ"ג נתרן במנה ולפיכך נחשבת נטולת נתרן.
- סורביטול בכמות של 601 מ"ג: סורביטול הינו מקור לפרוקטוז, אם יש לך רגישות לסוכרים מסוימים או יש לך רגישות תורשתית לפרוקטוז (HFI) יש להיוועץ ברופא לפני השימוש. סורביטול עלול לגרום לכאב בטן ושלושל.
- סוכרלוז בכמות של 3 מ"ג.
- חומרי טעם: טעם וניל וטעם תות.

שימוש בילדים

תרופה זו מיועדת לילדים מגיל 4 שנים ומעלה, ראה סעיף 3 - "כיצד תשתמש בתרופה".

על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעות הלוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

בהיעדר הוראה אחרת מהרופא המינון המקובל בדרך כלל הוא:

ילדים בגיל 9-12 שנים:

1-2 אריזות אישיות של אבקמול 250 מ"ג כל 4-6 שעות, לפי הצורך. אין ליטול יותר מ-8 אריזות אישיות ביממה (2 גרם פראצטמול).

ילדים בגיל 4-8 שנים:

אריזה אישית אחת של אבקמול 250 מ"ג כל 4-6 שעות, לפי הצורך. אין ליטול יותר מ-4 אריזות אישיות ביממה (1 גרם פראצטמול).

אין לעבור על המנה המומלצת.

עליך לפנות לרופא אם החום נמשך יותר מ-3 ימים או אם התסמינים מחמירים או אינם חולפים תוך 5 ימים, למרות השימוש בתרופה.

אופן השימוש

אין לקחת עם מזון. יש לפתוח את האריזה האישית של אבקמול 250 מ"ג, לרוקן את תוכנה ישירות לתוך הפה, על הלשון, ולבלוע. אין צורך במים.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, יש לפנות מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים ולהביא את אריזת התרופה איתך. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא! גם אם אתה חש בטוב על אף נטילת מינון יתר, טיפול מידי הוא חיוני, בגלל הסיכון להתפתחות נזק חמור לכבד. נטילת יתר עלולה לגרום לתסמינים הבאים: בחילה והקאה, שלשול, אובדן תיאבון, כאבי בטן, נפיחות, הזעה מוגברת, כאב או רגישות בבטן העליונה. ייתכן שהם לא משקפים את חומרת הנזק לכבד.

אין ליטול תרופות בחושר! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באבקמול 250 מ"ג עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

תופעות הלוואי עלולות להיות חמורות יותר בקשישים.

תופעות לוואי חמורות:

יש להפסיק את הטיפול ולפנות לרופא מייד:

- אם מופיעות תגובות אלרגיות חריפות כגון התנפחות הגפיים, פריחה וגרד, התנפחות הפנים, השפתיים, הלשון ו/או הגרון אשר עלולה לגרום לקשיי נשימה או בליעה.
- אם מופיעות, במקרים נדירים, מחלות עור חמורות שהסימנים שלהן יכולים להיות: אודם, פריחה, שלפוחיות או פגיעה עורית נרחבת.
- תופעות לוואי עוריות חריפות עלולות להופיע גם אם בעבר נטלת תכשירים המכילים את המרכיב הפעיל פראצטמול ולא סבלת מתופעות לוואי.
- אם מופיעות תופעות לוואי עוריות, יש להפסיק הטיפול ולפנות לרופא באופן מידי.
- אם מופיעים סימנים של שניונים במערכת הדם כגון: דימומים, הופעת חבורות בקלות, התפתחות זיהומים ביתר קלות כתוצאה מיירידה חמורה במספר תאי הדם הלבנים.
- אם מופיע קוצר נשימה (נדיר).

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על-ידי "כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור, מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן מתחת ל-25°C באריזה המקורית, כדי להגן מאור ומלחות.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Sorbitol, talc, basic butylated methacrylate polymer, strawberry flavor, vanilla flavor, magnesium oxide light, sodium carmellose, sucralose, magnesium stearate, hypromellose, stearic acid, sodium dodecyl sulfate, titanium dioxide, simeticone.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

קופסת אבקמול 250 מ"ג מכילה אריזות אישיות (שקיות) מאלומיניום. בכל אריזה אישית גרנוולות של תרופה בבעב לבן או גוון הקרוב ללבן. התכשיר מאושר לשיווק בדללים הבאים: 2, 3, 8, 10, 20, 24, 40 אריזות אישיות. ייתכן שלא כל גודלי האריזה משווקים.

שם היצרן ובעל הרישום ותכונותיו:

טבע ישראל בע"מ, רחוב דבורה הנביאה 124, תל אביב 6944020

עלון זה נערך בפברואר 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 148.51.33446

למש פטנטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.