

בינוסו

טבליות תוססת

חומר הפעיל וכמותו:

כל טבלית תוססת מכילה:
סודיום אלנדרונט טריהידראט אקוויולנטי ל-70 מ"ג חומצה אלנדרונטית

(sodium alendronate trihydrate equivalent to 70 mg alendronic acid)
שומרים בלתי פעילים או לארגניים: ראה פרק 2 עיפי "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 "מידע נוסף".
קרא בקפידה את הלעילון עד סופו בעת שתתמשם בתרופה. לעילון זה תוכלו מידע נוספי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה להטיפול בעבורך. לא תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק לים, אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה. תרופה זו אינה מיועדת לילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18.

1. למת ימיועדת התרופה?

- לטיפול באוסטאופורוזיס בגברים (בנושם לאחר גיל המעבר, למניעת שבירה).
- לטיפול להגדלת מסת העצם בגברים עם אוסטאופורוזיס.
- **בינוסו היא טיפול של פעם בשבוע.**
- **קבוצה רפואית: ביסופוספונטים** (קבוצת תרופות שאינן הורמונליות).

מהי אוסטאופורוזיס?

אוסטאופורוזיס היא הידלדלות והחלשות של העצמות. היא שכיחה בנשים לאחר גיל המעבר. בגיל המעבר השחלות מפסיקות להרשי את הורמונן הנשי, סטרואדן, אשר מסייע בעשייה על בריותה השלד. כתוצאה מכך, חלה בריחת עצם, והעצמות הופכות לחלשות יותר. ככל שהאישה מגיעה לגיל המעבר מוקדם יותר, הסיכון לאוסטאופורוזיס גבוה יותר. שלבים המוקדמים, אוסטאופורוזיס בדרג כלל אינה מלווה בתסמינים. עם זאת, היא לטיפול, המצטא יכול להגיע לשרירים בעצמות. אף על פי ששבירים בעצמות עומד להגיע בדרג כלל מלווים בכאב, הם יכולים להישאר ללא אבחנה עד אשר חלה ירידה גוברת. שבירים בעצמות יכולים להתרחש במהלך פעילות יומיומית שגרתית, כגון הרמה או מציפה קלה, אשר בדרג כלל או תוביל לשרב בעצם בריאה. שבירים בעצמות בדרג כלל מתרחשים בדרג, כגון שדרה או שורש קף היד, ויכולים להוביל לרק לכאב, אולם גם לבעיות ניכרות יותר, כמו יציבה חלופה (גיבנת) וחוסר נייחות.

כיצד ניתן לטפל באוסטאופורוזיס?

ניתן לטפל באוסטאופורוזיס ואף פעם אל מאוחר מדי להתחיל את הטיפול. בינוסו היא קר מונעת אובדן עצם אלא עם עזרת למעשה לבנת את העצם מחדש, ובנוסף מפחיתה את הסיכון לשרירים בעצמות עומד השדרה והירך.

לצד הטיפול בבינוסו, כדי לשפר את מצבך, הרופא עשוי להציע לך לבצע שינויים באורח החיים, כגון: הפסקת עישון; ראה כי העישון מגביר את קצב אובדן העצם, ולכן עלול להעלות את הסיכון לשרירים בעצמות. פעילות גופנית: בדומה לשרירים, גם עצמות דורשות פעילות גופנית כדי להישאר חזקות ובריאות. עליך היוועץ ברופא לפני התחלת אימון.

חזונה מאוזנת: הרופא יכול ליעץ לך בנוגע לתזונה או צורך בתוספי חזונה (במיוחד סידן וויטמין D).

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (חומצה אלנדרונטית) או לאחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה פרק 6).
- אינך יכול לעמוד או לשבת זקוף לפחות 30 דקות.
- הרופא אמר לך שיש לך רמות סידן נמוכות בדם.

אזהרות ומיידות הנוגעות לשימוש בתרופה

- לפני הטיפול בבינוסו ספר לרופא אם:
 - אתה סובל מבעיות בכליות
 - אתה סובל או סבלת לאחרונה מבעיות עיכול או בליעה כלשהן
 - נאמר לך על ידי הרופא שיש לך תסמונת בארט (מצב הקשור לשינוי בתאים בחלק התחתון של הוושט)
 - נאמר לך שיש לך קושי בספיגת מינרלים בקיבה או במעי (תת-ספיגה)
 - נאמר לך שיש לך רמות סידן נמוכות בדם
 - אתה סובל מבריאות שיניים ירודה, מחלטי שיניים, עקירה מתוכנתת או שאינך מקבל טיפול דנטלי שגרתי
 - אתה סובל מסרטן
 - אתה עובר טיפולים כימוטרפיים או הקרנות
 - אתה נוטל מעכבי אנגיזוגה (כגון בוזוזיזומאב או תלדיומיד) המשמשים לטיפול בסרטן
 - אתה נוטל קורטיקוסטרואידים (כגון פרדניזון או דקסאמתאזון) המשמשים לטיפול באסתמה, זלזלת מפרקים שגרונות ואלרגיות חמורות.
 - אתה מעשן או עשית בעבר (מצב זה עלול להעלות את הסיכון לבעיות בשיניים).
- גירוי, זלזלת או כיבים בוושט עלולים להתרחש לעיתים קרובות עם תוסמין של כאב בחזה, צרבת או קושי בבלעיה או כאב בליעה, במיוחד במטופלים אשר אינם משתמשים בכמות מספקת של מים על מנת להרמי את הטבלית התוססת וא/או במטופלים אשר נשכבו לאחר פחות מ-30 דקות מנטילת בינוסו. תופעות לואי אלו עלולות להחמיר אם החולים משמשים לטיפול בבינוסו לאחר הפחתות תוסמין אלו.
- בדיקות מעיל**
ייתכן שהרופא ייעץ לך לעבור בדיקת שיניים לפני התחלת הטיפול עם בינוסו.
חשוב לשמור על היגיינת פה טובה במהלך הטיפול בבינוסו. עליך לעבור בדיקות שיניים שגרותיות לאחר הטיפול, ועליך לנסות לרופא או לרוקח השיניים אם אתה חש בבעיה כלשהי בפה, או בשיניים, כגון שיניים רופפות, כאב או נפיחות.
- אינטראקציות/הגובות בין תרופות**
אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי חזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח במיוחד אם אתה לוקח:
• תוספי סידן, סותריו חומצה התרופות מסימות ונטילת קולות להיפה; עלולים להפריע לספיגת תרופה זו אם נוטלים אותם באותו הזמן. לכן, חשוב לעקוב אחר ההנחיות בפרק 3 "כיצד שתתמשם בתרופה".

עליך להתייעץ באופן תקופתי עם הרופא על הצורך בהמשך הטיפול בבינוסו ולקבוע האם התרופה עדיין מתאימה לך.
אין ליטול תרופות בחושהן בדוק התוויות והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים או אתה זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לואי

כמו בכל תרופה, השימוש בבינוסו עלול לגרום לתופעות לואי באופן המתמשמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.
פנה מייד לרופא אם מופיעים אחד התסמינים הבאים, העלולים להיות חמורים כך שיתכן ותצטרך טיפול רפואי דחוף:
• תופעות לואי שכיחות (משפיעות על עד 1 מתוך 10 מטופלים):
• צרבת, קושי בבלעיה; כאב בעת בליעה; כיב בוושט אשר עלול לגרום כאב בחזה, צרבת או קושי בבלעיה או כאב בליעה

- תופעות לואי נדירות (משפיעות על עד 1 מתוך 1,000 מטופלים):
- תגובות לואי גורמת כגון סרפדת; נפיחות בפנים; בשפתים, בלשון ו/או בגרון, אשר יכולות לגרום לקושי נשימה או בליעה;
- תגובות עוריות חמורות
- כאב בפה ו/או בלסת, נפיחות או צפצעים בתוך הפה, חוסר תחושה או תחושת נכבדות בלסת, או התרופות של פן, תופעות אלו יכולות להיות סימנים של נזק לעצם בלסת (osteonecrosis), אשר קשורים בדרך כלל לעיוב בריפוי זיהום, לרוב לאחר עקירת שיניים. היוועץ ברופא וברופא השיניים אם אתה חושה תסמינים אלו
- שבר חריג של עצם הירך עלול להתרחש לעיתים נדירות, במיוחד בחולים המטופלים תקופה ארוכה עבור אוסטאופורוזיס. פנה לרופא אם אתה חושה כאב, חלופה או אי חמות בירך או במפשעה מאחר שזה עלול להיות עדות מוקדמת לשרב אשרי של עצם הירך

- תופעות לואי אחרות כוללות:
- תופעות לואי שכיחות מאוד (משפיעות על יותר מ-1 מתוך 10 מטופלים):
- כאב בעצמות, שבירים ו/או במפרקים אשר לעיתים הוא חמור
- תופעות לואי שכיחות (משפיעות על עד 10 מטופלים):
- נפיחות במפרקים
- כאב בטן; אי-נוחות בבטן או גיהוק לאחר אכילה; עצירות;
- תחושת אلامות או נפיחות בטן; שלשול; גזים
- נשירת שיער; ירוד
- כאב ראש; סחרחורת
- עייפות; נפיחות בידיים או ברגליים

- תופעות לואי שאינן שכיחות (משפיעות על עד 1 מתוך 100 מטופלים):
- בחילה; הקאה
- גירוי או זלזלת בוושט או בקיבה
- צואה שחורה או דמוית דפת
- שטטשו שריאה; כאב או אדמומיות בעין
- פריחה; אדמומיות בעור
- תסמינים דמויי שפעת חלופים, כגון כאבי שרירים, תחושה כללית לא טובה לעיתים עם חום, בדרך כלל בחילות הטיפול הפרוטות בטעם

- תופעות לואי נדירות (משפיעות על עד 1 מתוך 1,000 מטופלים):
- תסמינים של רמות סידן נמוכות בדם, כולל התכווצות או עוינות בשרירים ו/או תחושת קעקוע באצבעות או מכסים לפה
- כיבים בקיבה או כיבים עליליים (לעיתים חמורים או עם דמום) היצרות הוושט
- פריחה החמירה בשמש
- כיבים בפה

- תופעות לואי נדירות מאוד (משפיעות על עד 1 מתוך 10,000 מטופלים):
 - שוחח עם הרופא אם לך כאב באוזן, הפרשות מהאוזן ו/או זיהום באוזן. אלו יכולים להיות סימנים של נזק לעצם באוזן.
 - **אם הופיעה תופעת לואי, אם אתה מתופעת הלואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לואי שלא הזכירה בעילון, עליך להתייעץ עם הרופא.**
- ניתן לרואה על תופעות לואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il). המפה לטיפול המוקדם לדיווח על תופעות לואי, או על "ניסוח לקישור": <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ לתעשיית ידם וטווח ארייתם של ילדים ו/או חיות קטנות ועל ידי כך להגביר את רעלונה. אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (date exp.) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותה חודש.
- **תנאי אחסון:**
- יש לאחסן מתחת ל-30°C. יש לאחסן באריזה המקורית כדי להגן מלחות. אין להוציא את הטבליות התוססות מהבליסטר לפני שאתה מוכן ליטול את התרופה.
- אין להשליך תרופות לביו או לאשפה. שאל את הרוקח כיצד להשמיד תרופות שאינן בשימוש. אמצעים אלו יעזרו לשמור על הסביבה.

6. מידע נוסף

- **נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:** Sodium citrate anhydrous, citric acid anhydrous, sodium hydrogen carbonate, sodium carbonate anhydrous, strawberry flavor (PHS-132962), acesulfame potassium, sucralose.
- **כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה**
טבלית שטוחה, עגולה, בצבע לבן עד קרם (אוף-ווייט) עם שוליים משופפים. לאחר התמוססת הטבלית, מתקבלת תמימה צלולה עד עוכרה קלות.
כל אריזה מכילה 4, 12 או 24 טבליות תוססות בבליסטר אלומיניום.
ייתכן שלא כל גודלי האריזה משובקים.
- **בעל רישום וכתובת:** צמל ביו-פארמה בע"מ, המגשמים 20, פתח תקוה.
- **עלון היצרן/כתובת:** סוויסקו-סוויסקו תרופות AG, סיסולן, שווייץ.
- נערך ביום 2022 בהתאם להחלטות משרד הבריאות.
- **מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:** 1589-96-34539
- שלש השפעות להקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

תרופות מסימות טיפול בראומטיסם או כאב מומשש הנקראות NSAIDs (כגון חומצה אצטיל סליצילית או אבופרופן); עלולים לגרום לבעיות עיכול. לכן, לנקוט זהירות אם תרופות אלו ניטלות באותו הזמן עם בינוסו.

שימוש בתרופה ומדון

סביר להניח כי מדון ומשקאות (כולל מים מינרליים) יגרמו לבינוסו להיות פחות יעילה אם צורכים אותם באותו הזמן. לכן, חשוב לעקוב אחר ההנחיות בפרק 3 "כיצד שתתמשם בתרופה?".

הריון והקה

בינוסו מיועדת לשימוש בנשים לאחר גיל המעבר בלבד. אין ליטול בינוסו אם את בהריון או חושבת שאת בהריון או אם את מניקה.

נהיגה ושימוש במכוונות

זוהו תופעות לואי (כולל שטטשו ראיה, סחרחורת וכאב חמור בעצמות, שבירים ו/או במפרקים) עם תרופה זו, אשר עלולות להשפיע על היכולת לנהוג או להפעיל מכונות (ראה פרק 4 "תופעות לואי").

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

טבלית תוססת של בינוסו מכילה נתון. יש להתחשב בחולים הנמצאים בדיטה לדת נתון. כל טבלית תוססת מכילה 603 מ"ג נתון. המוזהו 30% מכמות הנתון המקסימלית המומלצת ליום במבוגר.

3. כיצד שתתמשם בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להנחיות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

יש להימנע את התרופה בחצי כוס של מר יד לפני השימוש. אין ללעוס או לבלוע את הטבלית בשלמותה.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון

מקובל בדרג כלל לואי:

טבלית תוססת אחת פעם בשבוע, כתמימה לשיטה.

אין לעבור על המנה המומלצת.

חבר עקוב בקפידה אחר ההוראות הבאות:

א. עליך לעקוב בשבועות המתאימים ביתר לוח הזמנים שלך. בכל שבוע, ביום שנבחר, יש ליטול טבלית תוססת אחת של בינוסו כתמימה לשיטה.

ב. לאחר שאתה קם בבוקר ולפני שאתה אוכל, שותה או נוטל תרופה אחרת, המס טבלית תוססת של בינוסו בחצי כוס מי **ברז** (לא פחות מ-120 מ"ל) **(לא מים מינרליים)** ברגע שההסמייה הסתיימה והטבלית התוססת התמוססה בשלמותה לתמימה צלולה עד עוכרה קלות, ששה את התמימה, ולאחר מכן ששה לפחות עד 30 מ"ל (שישית כוס) מי ברז. אתה יכול לשנות מי ברז נוספים.

אם אתה רואה חלקי טבלית שלא התמוססו, אתה יכול לערבב את התמימה עד להמסה.

- אין ליטול עם מים מינרליים (מגזים או לא מגזים)
- אין ליטול עם קפה או תה
- אין ליטול עם מיץ או חלב

אין לבלוע טבלית תוססת שלא הומסה או ללעוס טבלית תוססת או לתל טבליות התמוסס בפה.

א. אין לשכב. הישאר זקוף לחלוטין (בישיבה, עמידה או הליכה) למשך לפחות 30 דקות לאחר שתיית התמימה המכילה את התוססת שתמוסה. אין לשכב עד לאחר אכילת הארוחה הראשונה לאותו היום.


ד. אין ליטול בינוסו לפני השינה או לפני הקימה בבוקר.

ה. אם אתה חש קושי או כאב בבלעיה, כאב בחזה, צרבת חדשה או החמרה בצרבת, הפסק ליטול בינוסו ופנה לרוקח.

ו. לאחר שתיית התמימה המכילה טבלית תוססת של בינוסו שהתמוססה, המתן לפחות 30 דקות לפני שאתה אוכל, שותה או נוטל תרופה אחרת לרשותך באותו יום. כולל סותריו חומצה, תוספי סידן וויטמינים. בינוסו יעילה רק אם היא ניטלת על קיבה ריקה.

כיצד ליטול טבלית תוססת של בינוסו

1. הטבליות התוססות מסופקות בסטרפים של 2 טבליות עם טבלית אחת בלידיה. יש לפתוח יחידה אחת לפי הסימון.
2. יש להימנע טבלית תוססת של בינוסו בחצי כוס מי ברז (לא פחות מ-120 מ"ל).
3. יש לשנות את התמימה מייד לאחר שפסקה הסתיימה והטבלית התוססת התמוססה לחלוטין, ולאחר מכן יש לשנות לפחות שישה כוס מי ברז.



אם נוטלת בטעות מינון גבוה יותר, ששה כוס מלאה של חלב ופנה מייד לרוקח. אל תגרסם להקאה ואל תשכב.

אם נוטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרוקח או לחדר מינון של בית-חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו, יש ליטול טבלית תוססת אחת המומסמת בני ברב בבוקר לאחר ששכחת. עקוב אחר ההנחיות בהמשך לטיפול טבלית תוססת אחת לתמימה לשיטה באותו היום. המשך ליטול טבלית תוססת אחת לתמימה לשיטה פעם בשבוע, לפי לוח הזמנים המקורי ביום הנבחר.

יש להמדיד טיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. אם אתה חש שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה לא התיעצות עם הרופא.

אם אתה מופקיד את טבלית התרופה חשוב להמשיך ליטול בינוסו כל עוד הרופא רואה לך את התרופה. מכיוון שלא ידוע למה זמן תצטרך ליטול בינוסו,