

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

קלוריל

טבליות

הרכב

כל טבליה מכילה:

אמילוריד (הכידורכלוריד אנהידראט) 5 מ"ג
Amiloride (as Hydrochloride anhydrous) 5 mg
הידרוכלורתיאזיד 50 מ"ג

Hydrochlorothiazide 50 mg
למידע על מרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים ראה בסעיף 2 - "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 - "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון דע סופו בטרם שתשתמש בתרופה. עלון זה מיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

1. למ מה מיועדת התרופה?

קלוריל מיועדת לטיפול ביתר לחץ דם עם או ללא תרופות נוספות וכן לטיפול בבצקת המקושרת לאי ספיקת לב ולשחמת כבד.

קבוצה תרופתית

שני המרכיבים הפעילים הם מקבוצת המשתנים (Diuretics). קבוצה זו פועלת על-ידי העלאת כמות השתן המופרש מהגוף, דבר המוריד את לחץ הדם או מסלק את עודפי המים מהגוף.
השתן המופרש מהגוף, דבר המוריד את לחץ הדם או מסלק את עודפי המים מהגוף.
אמילוריד: משתן מקבוצת משמרי אשלגן.
הידרוכלורתיאזיד: משתן מקבוצת התיאזידים.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) להידרוכלורותיאזיד או לאמילוריד הידרוכלוריד או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 - "מידע נוסף").

אתה סובל ממסוכנת (תרופה גבוהה של סוכר

- (בדם).
- נאמר לך על-ידי הרופא שלך שיש לך רמות גבוהות בדם של אוראה, קראטינין, אשלגן או סידן.

אתה רגיש לאצטזולאמיד, משתן המשמש לפינוי נוזלים מגופך ולטיפול בלחץ תוך-עיני מוגבר (גלאוקומה), לבעיות לב ולעיתים לפרכוסים או לאפילפסיה.

אתה רגיש לסוג של אנטיביוטיקות הנקרא סולפונאמידים, כגון סולפאמתוקסאזול.

אתה רגיש למשתן אחר ממשפחת התיאזידים.

אתה נוטל משתנים משמרי אשלגן כגון

אפלטון, פיורנולקסון או טריאמטרן.

אתה נוטל תוספי אשלגן או תרופות הכוללות

אשלגן או שאתה אוכל מזונות עשירים באשלגן.

אתה סובל ממחלת כליות, אצירת שתן או

ממחלת כבד.

אתה סובל ממחלת אדיסון (תת תפקוד של

בלוטת האדרנל).

אתה מטופל במקביל בתרופות המכילות

ליתיום.

אל תיקח קלוריל אם אחד מהמצבים האמורים

לעיל חל עליך, אם אתה אל בטוח היוועץ ברופא

שלך או בעורך לפני נטילת התרופה.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בקלוריל, ספר לרופא אם:

- חלית בעבר בסרטן העור, או אם הניך מפתח נגע בלתי צפוי בעור במהלך השימוש בתרופה. שימוש בהידרוכלורותיאזיד עלול העלות את הסיכון לפתח סרטן בעור ושפשוש (סרטן עור מסוג שאינו מלאמאגה), בפרט בשימוש ארוך טווח במינונים גבוהים. יש להגן על העור מחשיפה לשמש ולקרינה אולטרה סגולה (UV) במהלך השימוש בקלוריל.
- חווית בעיות נשימה או ריאוח (כולל דלקת או נוזלים בריאות) בעקבות צריכת הידרוכלורתיאזיד בעבר. אם אתה מפתח קוצר נשימה חמור או קשיי נשימה לאחר נטילת קלוריל, פנה מייד לקבלת טיפול רפואי.
- יש לך ירידה בריאות או כאבי עיניים. אלה עלולים להיות סימפטומים להצטברות נוזלים בשכבת ליחיה הדם של העין (choroidal effusion) או עללייה בלחץ תוך-עיני ויכולים להתרחש תוך שעות עד שבוע מנטילת קלוריל. מצב זה עלול להוביל לאובדן ראייה קבוע. אם לא מטופל. אם אדם חווה היתוך לך אלרגיה לפניצילין או לסולפונאמיד, אתה עלול להיות בסיכון גבוה יותר לפתח אבחה.
- אתה קשיש.
- נאמר לך על-ידי הרופא שיש לך רמות גבוהות בדם של חומצה אורית, כולסטרוול או טריגליצרידים (סוג של כולסטרוול).
- אתה נוטל דיגיטלים כגון דיג'וקסין (משמש לטיפול באי ספיקת לב או בהפרעה בקצב לב).
- אתה מקבל נוזלים לווריד (בעזרת צינורית המחוברת לתוך אחד הוורידים).
- בבולת לאחורנה מהקאות או משלשולים חמורים.
- אתה סובל מצאבת (לופוס).
- אתה סובל משיבדון (גאוט).

אם אינך בטוח, היוועץ ברופא או ברוקח לפני

נטילת קלוריל.

ילדים ומתבגרים

אין לתת תרופה זו לילדים ולמתבגרים מתחת לגיל

18 שנים כיוון שקיים מידע מוגבל לגבי בטחיות

ויעילות השימוש בתכשיר זה בילדים ובמתבגרים.

בדיקות ומעקב

כאשר אתה נוטל תרופה זו, הדבר עלול להשפיע

על בדיקות דם ושתן. יש להזכיר לרופא שאתה

נוטל קלוריל אם הוא מפנה אותך לבצע בדיקה

כלשהי.

אם יש לך סוכרת או אם הרופא חושד שיש לך

סוכרת, ייתכן שתצטרך לעבור מספר בדיקות לפני

קבלת טיפול בקלוריל.

תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות

אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה,

ספר על כך לרופא או לרוקח. זאת כיוון שקלוריל

עולה להשפיע על אופן הפעולה של תרופות אחרות.

כמו כן, תרופות אחדות יכולות להשפיע על

אופן הפעולה של קלוריל. חשוב לספר לרופא או

לרוקח, במיוחד אם אתה לוקח:

- קבלת האזיח ההופך אנגיוטנסין (מעכבי ACE) כגון אנפריל - משמשים לטיפול ביתר לחץ דם או בבציות לב.
- אנטגוניסטים לרצפטור אנגיוטנסין II כגון לוסרטן - משמשים לטיפול ביתר לחץ דם או בסוכרת.
- זקק כליתי.
- תרופות אחרות לטיפול ביתר לחץ דם.
- תרופות לסוכרת כגון אינסולין או כלורפראמיד.
- ליתיום - לטיפול בדיכאון.
- תרופות מגודות דלקת לא סטרואידיות (NSAIDs),

כגון אספירין או איבופרופן - משמשות להפחתת

חום גבוה, כאב או דלקת מפרקים.

- ברביטורטים - משמשים לשינה או להפחתת חרדה.
- משככי כאבים כגון, קודאין, דיהידרוקודאין, דקסטרופרופוקסין, דיאמורפין, פנטזוצין ופטידין.

כולסטרלמיין וכולסטיפול - משמשים לטיפול

בכולסטרוול גבוה (היפרליפידמיה).

סטרואידים - משמשים לטיפול בהרבה מצבים

שונים כגון, שיגרון, דלקת מפרקים, אלרגיות,

בעיות עור, אסטמה או סוג של בעיה בדם.

ACTH - לבדיקה האם בלוטת יותרת הכליה

(אדרנל) שלך עובדת באופן תקין.

זריקות לטיפול בתגובות אלרגיות כגון אדרנלין

(ידוע גם בשם אפינפרין).

טקוליומס - משמש לאחר השתלת כבד או כליה

למניעת דחיית שתל.

ציקלוספורין - משמש לטיפול בדלקת מפרקים

שגרונית או כדי למנוע דחייה לאחר השתלה.

מרפי שרירים מסוג מסוים כגון טובוקוררין.

טרילוטסון - משמש לטיפול בסרטן השד או

בפעילות יתר של בלוטת יותרת הכליה (כגון

תסמונת קון ותסמונת קושינג).

בנוסף, אם אתה עומד לעבור ניתוח, יש לוודא

שהרופא המטפל בך יודע שאתה נוטל קלוריל.

אם אינך בטוח אם האמור לעיל נוגע לך, היוועץ

ברופא או ברוקח לפני נטילת קלוריל.

שימוש בתרופה וזמן

ייתכן שהרופא יבקש ממך לשנות את הדיאטה שלך

מקצאת ולהימנע ממאכלים מסוימים המכילים הרבה

אשלגן. מאכלים אלו כוללים חלב, בננות, צימוקים

וזהיפים מיובושים. הרופא ידריך אותך לגבי מזונות

מהם יש להימנע, התייעץ עם הרופא לפני נטילת

טבליות קלוריל.

שימוש בתרופה וצריכת לאלכוהול

ייתכן שהרופא ידריך אותך להפחית למינימום את

צריכת האלכוהול בזמן השימוש בקלוריל. אלכוהול

עלול להגביר את ההשפעה של קלוריל כך שתרגיש

מסוחרר כאשר אתה קם במהירות.

היריון והנקה

היריון

ספרי לרופא אם את בהיריון, חושבת שיתכן שאת

בהיריון או מתכננת להרות. בדרך-כלל, הרופא שלך

ימליץ לך לקחת תרופה אחרת במקום קלוריל. כיוון

שקלוריל לא מומלצת במהלך ההיריון. הסיבה לכך

היא שקלוריל חוצה את השליה ושימוש בקלוריל

לאחר החודש השלישי של ההיריון עלול להזיק לעובר

ולתינוק הנולד.

הנקה

ספרי לרופא אם את מניקה או מתכוונת להתחיל

להניק. קלוריל אינה מומלצת לאימהות מניקות.

נהיגה ושימוש במכוונת

תרופה זו עלולה לגרום לעייפות או לסחרחורת. אין

לנהוג או להפעיל מכוונת לפני שהתייצצת עם הרופא

או לפני שאתה יודע איך התרופה משפיעה עליך.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

- קלוריל מכילה לקטוז. אם נאמר לך על-ידי הרופא

שלך שיש לך אי-סבילות (רגישות) לסוכרים

מסוימים, התייעץ עם הרופא לפני שאתה נוטל את

התרופה הזו.

תרופה זו מכילה פחות מ-23 מ"ג נתרן בטבליה

ולפיכך נחשבת נטולת נתרן.

התרופה מכילה חומר צבע עזוב סנסט FCF

(Sunset yellow FCF) העלול לגרום לתגובות

אלרגיות.

3. כיצד שתשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות

הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך

בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד.

יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קצובים כפי שנקבע

על-ידי הרופא המטפל.

יש להיוועץ ברופא בנושא התזונה הנכונה בעת

הטיפול (כגון השימוש במלח או בתחליפי מלח).

מומלץ ליטול את התרופה בבוקר מכיוון שהתכשיר

עלול להביא להטלת שתן מרובה.

אין לעבור על ההנח המומלצת.

שים לב!

יש להכות פרק זמן של 2-4 שעות בין נטילת

תרופה זו לנטילת תרופה המכילה כולסטרלמיין או

כולסטיפול.

אופן השימוש

- יש ליטול תרופה זו דרך הפה.

אין מידע לגבי כתישה או לעיסה של הטבליה.

ניתן לחצות את הטבליה בקו החצייה.

יש בלבוץ את התרופה עם מעט מים.

אם נטלת בטעות מינון גבוה ותר

אם נטלת מנות יתר או בטעות בלע ילד מן

התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית

חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיועד, דלג על

המנה שנשכחה וקח את המנה הבאה בזמן הרגיל.

אין ליטול שתי מנות ביחד כדי לפצות על מנה שנשכחה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא שלך.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם

הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה

בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם

הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה,

היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בקלוריל עלול לגרום

לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים.

אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי, ייתכן

שלא תסבול מאף אחת מהן.

תופעות הלוואי הבאות עלולות להופיע בעת שימוש

בקלוריל:

יש להפסיק ליטול קלוריל ולפנות מייד לרופא אם

אתה מבחין באחת מתופעות הלוואי החמורות

הבאות שעלולות להתרחש. ייתכן שתצטרך טיפול

רפואי דחוף:

• תגובות אלרגיות - התסמינים עלולים לכלול דלקת

כלי הדם, קשיי נשימה או בליעה, התעלפות,

אדמומית, שלפוחיות, קילוף עור, כאבי שרירים,

צמרמורת, הרגשה כללית לא טובה, כיבים בפה,

בעיניים או באברי המין

• דופק בלתי סדיר של הלב שיכול להוביל

להתעלפות ולסחרחורת, רפיקות לב

• דופק מהיר, כאבים בחזה (תחושת חזה)

• דימום מהמעיים - התסמינים עלולים לכלול דם

בצואה או צואה צבע כהה יותר

• בעיות כבכד כגון צהבת - התסמינים עלולים לכלול

הצהבת העור ו/או הצהבת לובן העיניים

תופעות לוואי נוספות:

תגובות אלרגיות

• תכמים סגלגלים או אדמדמים, גירוי בעור, רגישות

מוגברת לאור השמש ופריחה דמויית סרפד

(פריחה אלרגית)

לב ומחזור הדם

- תחושת סחרחורת כאשר אתה נעמד במהירות

דם

• אנמיה - תסמינים הכוללים עייפות יוצאת דופן

או אובדן צבע בריריות של העיניים ובעור סביב

העיניים

• הפרעות דם אחרות אשר עלולות לגרום לחום

גבוה, לכאב גרון, לחוסר יכולת לעצור דימום

מתוך

• שינויים ברמות בדם של כימיקלים שונים אשר

תגלים, בדרך-כלל, בבדיקות דם או שתן

קיבה ומערכת העיכול

• בחילות או הקאות, קשיי עיכול, שלשול, עצירות,

כאבי בטן ועוויתות בקיבה, גזים, תחושת נפיחות,

שיהקים

• דלקת בלבלב - התסמינים עלולים לכלול בחילות

והקאות עם כאבים באזור הבטן והגב

• נפיחות בבלוטות הרוק

• יבש בפה

• תחושת צמא