

עלון לצרcn לפי תקנות הרוקחים (תקנירם) התשמ"ו - 1986

תרופה זו משווקת על ידי מרשם רופא בלבד

פסנרה™

תמיisa להזרקה בעט מוכן לשימוש

להזרקה תת עורית

הרכב:

כל עט מוכן לשימוש (1 מ"ל) מכיל:

benralizumab 30 mg

למרכיבים לא פעילים, ראה סעיף 6 - מידע נוסף.

קרא בעיון את העلون עד סופו בטרם תשתחש בתרופה.
יש לשמור את העلون أولי תצטרך אותו בשנית.

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, אנא פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלותך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם/ מצבם הרפואי דומה.

1. מהי פסנרה ולמה מיועדת התרופה?

פסנרה מיועדת לטיפול בשילוב עם טיפול אחזקתי במבוגרים עם אסתמה אוזינופילית חמורה, אשר אינם מגיבים, למרות טיפול משלב במינונים גבוהים בקורטיקוסטרואידים בשאיפה ובטא-אגוניסטים ארוכי טווח.

קבוצה תרפואית:

נוגדן מונוקולוני כנגד הקולtan לאינטראקציין 5 (anti-interleukin-5 receptor α monoclonal antibody)

מהי פסנרה
פסנרה היא תרופה המכילה את החומר הפעיל בנראליזומאב, אשר הננו נוגדן מונוקולוני, סוג של חלבון המתוכנן לזהות ולהיקשר לאחרת מטרה מסוימת בגוף. לאחר המטרה של בנראליזומאב הוא חלבון הנקרא קולtan לאינטראקציין 5, הנמצא באופן ייחודי על סוג מסוים של תא דם לבנים, הנקרים אוזינופילים.

כיצד פועלת פסנרה
אוזינופילים הם סוג של תא דם לבנים המעורבים בתהליכי הדלקתי באסתמה. פסנרה נקשרת לאוזינופילים ובכך מביאה לירידה במספר האוזינופילים.

אסתמה אוזינופילית היא סוג של אסתמה המאפיינת ברמות גבוהות של תא דם לבנים מסווג אוזינופילים בדם או בריאות.

היתרונות בשימוש בפסנרה:

פסנרה יכולה להפחית את מספר התקפי האסתמה שאתה חוות, יכול לסיעע לך לנשום טוב יותר ולהפחית את תסמיini האסתמה. אם הנך נוטל קורטיקוסטרואידים בבליעה, השימוש בפסנרה יכול גם

לאפשר לך להפחית את המינון היומי או להפסיק את השימוש בקורטיקוסטרואידים בבליעת הנדרשים לשיליטה במחלתך.

2. לפני השימוש בתרופה

X אין להשתמש בתרופה אם:

- **הינך רגש לבנראליוזמאב או לאחד ממרכיבי התרופה (המפורטים בסעיף 6). בדוק עם הרופא, האחות או הרוקח אם אתה חושב שייתכן שזה נוגע אליך.**

ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בפנסרה

לפני הטיפול בתרופה ספר לרופא אם:

- יש לך זיהום פרזיטי (שנרגם ע"י טיפול) או שהנركור גור באיזור שנפוציים בו זיהומים פרזיטיים או אם הנrk גור גור צזה. תרופה זו עשוייה להחליש את יכולת הגוף להילחם בסוגים מסוימים של זיהומים פרזיטיים.
- היותה לך בעבר תגובה אלרגית לזריקה או לתרופה (ראה פרק 4, לפירוט תסמינים של תגובה אלרגית).

בנוסף, במהלך הטיפול יש לידע את הרופא אם:

- האסתמה שלך נותרת לא נשלטת או מחמירה בעת הטיפול בתרופה.
- יש לך תסמינים של תגובה אלרגית (ראה סעיף 4). תופעות אלרגיות ארעו במטופלים המקבלים את התרופה.

שים לב לсимנים לתגובה אלרגית חמורה

פנסרה עלולה לגרום לתגובה אלרגית חמורה. عليك לשים לב לсимנים המראים על תגובה כזו (כגון חרקת, פירחה, בעיות בנשימה, עילפון, סחרחורות, תחושת סחרור ו/או נפיחות בפנים, בלשון או בפה) כאשר אתה מטופל בפנסרה.

חשוב שתדבר עם הרופא שלך כיצד זה יזהה תסמינים מוקדמים של תגובה אלרגית חמורה וכייזד להתנהל במידה ומתרחשת תגובה אלרגית חמורה.

ילדים ומתבגרים

פנסרה איננה מיועדת לשימוש ילדים. לא קיים מידע לגבי בטיחות ויעילות השימוש בתכשיר זה בילדים מתחת לגיל 18.

אם אתה לוקח תרופות אחרות

אם אתה לוקח, או אם תקח לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

אין להפסיק באופן פתאומי או לשנות את המינון של התרופה למניעת האסתמה ברגע שאתה מתחילה טיפול בפנסרה. אם תגובה לטיפול בפנסרה אפשר זאת, הרופא שלך יוכל לנסות ולהקטין את

המיןון של חלק מהתרופות, במיעוד אלו הנקראות "קורטיקוסטרואידים". הפסקת השימוש בתרופות אלו (בעיקר הקורטיקוסטרואידים), חייבת להתבצע בהדרגה, בפיקוח ישר של הרופא שלו.

הריוון והנקה

אם הנר בהריון, אם הנר חושבת שאת בהריון או אם הנר מתכונת להיכנס להריון התיעודי עם הרופא שלא רעם השימוש בתרופה.

אין להשתמש בפנסנה במהלך ההריון אלא אם נאמר לך אחרת על ידי הרופא. לא ידוע אם פנסנה עשויה לפגוע בעובר.

לא ידוע אםמרכיבי התרופה עוברים לחלב אם. אם הנר מניקה או מתכונת להניק, יש להתייעץ עם רופא.

נהיגה ושימוש במכונות
לא סביר שפנסנה תשפייע על יכולת נהוג או להפעיל מכונות.

3. כיצד השתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש בפנסנה כפי שהסביר לך על ידי הרופא. בדוק עם הרופא, האחות או הרוקח במידה ואין בטוח.

פנסנה ניתנת בהזרקה מתחת לעור בלבד. אתה והרופא שלך או האחות, צריכים להחליט האם אתה יכול להזיריק לעצמך את התרופה פנסנה. אל תזריק לעצמך פנסנה אם לא קיבלת בעבר זריקה של פנסנה, ואם הייתה לך בעבר תגובה אלרגית לפנסנה.

אתה או איש הצוות הרפואי המטפל לך צריכים לעבורי הדרכה על הדרך הנכונה להכין ולהזריק פנסנה. עליך לקרוא את "הוראות השימוש להזרקה עצמית" בשלמותן, לפני השימוש בפנסנה. המינון המומלץ הוא זריקה אחת של 30 מ"ג. שלוש הזירות הראשונות ניתנו במרווחים של 4 שבועות. לאחר מכן תקבל זריקה נוספת של 30 מ"ג כל 8 שבועות.
אין לעבורי על המנה המומלצת.

אם פספסת מנה של פנסנה

אם פספסת מנה של פנסנה צור קשר עם הצוות הרפואי מהר ככל שניתן.

אם נטלה בטעות מינון גבוהה יותר או אם בטעות בעליל ליד מהתרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית החולים והבא את אריזות התרופה איתך.

הפסקת השימוש בפנסנה

אין להפסיק את הטיפול בפנסנה, אלא אם קיבלת הוראה צו מרופא. הפסקה או הפרעה לטיפול בפנסנה עלולה לגרום לתסמייני והתקפי האסתמה לחוזר. אם תסמייני האסתמה שלך מחמירים בעת נטילת פנסנה צור קשר עם רופא.

כל שאלה לגבי אופן השימוש בפנסנה יש לפנות לרופא, לאחות או לרוקח.
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכיב משקפיים אם הנר זוקק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בפנסנה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל במקרה רשותת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מכך אחת מהן.

תגובהות אלרגיות חמורות

פנה מיד לקבלת עזרה רפואי אם הנך חושב שיש לך תגובה אלרגית. תגובה אלו יכולות להתרחש בתוך מספר שעות או ימים לאחר ההזרקה. **שכיחות לא ידועה (לא ניתן לקבוע את השכיחות המנתוניות שיש בנמצא):**

- **אנאפילקסיס**
התסמינים בדרך כלל כוללים:
 - נפיחות בפנים, בלשון או בפה
 - בעיות נשימה
 - עילפון, סחרחות, תחושת סחרור (בשל ירידת בלוט הדם)

תופעות לוואי שכיחות (עשויות להשפיע על עד 1 מתוך 10 מטופלים):

- חרלה
- פרירה

תופעות לוואי אחרות:

שכיחות (עשויות להשפיע על עד 1 מתוך 10 מטופלים):

- כאבי ראש
- דלקת הלוע (גרון צורב)
- חום (טמפרטורה גבוהה)
- תגובה במקומות ההזרקה (לדוגמא – כאב, אודם, גרד, נפיחות במקום בו ניתנה הזרקה)

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי חמירה או במקרה שאתה סובל מטופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דוחה על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המכוון לדוחה על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- **מנע הרעליה!** תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעליה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

- יש לשמר בין 2°C-8°C (במקרר). במידת הצורך ניתן לשמר את פסנרה בטמפרטורת החדר עד 25°C (למשך 14 יום לכל היותר. לאחר ההוצאה מהמקרר, יש להשתמש בפסנרה תוך 14 ימים או להשליך.
 - יש לשמר את פסנרה באריזה המקורי בכדי להגן מפני.
 - אין לנער, להקפי או לחשוף לחום
 - אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש. בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.
 - אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.
- פסנרה היא לשימוש חד פעמי בלבד.
אין להשליך אף תרופה לביב. יש להטייעץ עם הרוקח כיצד יש להשליך תרופות שאין בשימוש.

6. מידע נוספת

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Water for injection, α,α-trehalose dihydrate, L-histidine hydrochloride monohydrate, L-histidine and polysorbate 20.

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה?
פסנרה הינה תמיסה שקופת עד צהבהבה. התמיסה עשוייה להכיל חלקיקים.

פסנרה זמינה באריזה המכילה עט אחד מוכן לשימוש.

יצרן:

קטלנט אינדיانا LLC, 1300 סאות' פטרסון דרייב, בלומינגטון,
אינדיانا 47403, ארה"ב

בעל הרישום ויבואן:

אסטרהזיניקה (ישראל) בע"מ,
רחוב עתירי ידע 1, כפר סבא 4464301.

מספר רישום התרופה בנקס התרופות הממלכתי משרד הבריאות: 160-82-35371-00

נערך ביוני 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

לשם הפשטות ולהקלת הקראיה, עלון זה נوشט בלשון זכר, התרופה מיועדת לשני המינים.

הוראות שימוש להזרקה עצמית

פסנרה™

תמיisha להזרקה בעט מוכן לשימוש

כל עט מוכן לשימוש (1 מ"ל) מכיל:

benralizumab 30 mg 30 מ"ג

להזרקה תת עורית

�ט מוכן לשימוש חד פעמי

לפני השימוש בעט פסנרה, איש צוות רפואי יראה לך או לאדם המסייע לך איך להשתמש בעט בצורה נכון.

יש לקרוא את ההוראות השימוש להזרקה עצמית לפני שאתה מתחילה לראשונה להשתמש בעט פסנרה ולפני כל שימוש. יתכן שהיא מידע חדש. המידע המופיע כאן אינו מחליף את הצורך לדבר עם הרופא המטפל על מצבך הרפואי או על הטיפול שלך.

אם לך או לאדם המסייע לך יש أيזה שהן שאלות, יש לדבר עם הרופא המטפל.

מידע חשוב

יש לאחסן את פסנרה במקرار בטמפרטורה של בין 2°C ל- 8°C באזיה המקורי עד אשר אתה מוכן להשתמש בתרופה. לאחר הוצאת פסנרה מהמקرار, יש להשתמש תוך 14 יום או להשלים.

במידת הצורך ניתן לשמור את פסנרה בטמפרטורת החדר (25°C) למשך 14 ימים לכל היותר.

אין להשתמש בעט פסנרה אם:

- העט הוקפא או הנוזל בעט קפא
- העט נפל או נפגם
- חותם האזיה נפגם
- תאריך התפוגה של התרופה עבר.

אין לנער את העט המוכן לשימוש


אין לחלק עמו מישחו או לבצע שימוש חוזר בעט המוכן לשימוש

אם אחד מהגורמים המתוארים מעלה קורה, יש לזרוק את העט מייל עמיד לחפצים חדים ולהשתמש בעט מוכן לשימוש חדש.

כל עט מוכן לשימוש של פסנרה מכיל מנת אחת של פסנרה לשימוש חד פעמי בלבד. מנע הרעליה! יש לשמור את פסנרה וכל תרופה אחרת הרחק מהישג ידם ושדה ראייתם של ילדים.

העט המוכן לשימוש

אין להסיר את הפקק עד אשר הגעת לשלב 6 בהוראות שימוש אלו ואתה מוכן להזריק את הפסנירה.




שלב 1 - ארגן את הציוד

- 1 עט מוכן לשימוש מהמקרר
- 1 פד אלכוהול
- 1 צמר גפן או גזה
- 1 מיכל עמיד לחפצים חדים (אנא ראה שלב 10 – השלים את העט המשומש בבטחה)



שלב 2 - הכין את עט הפסנירה לשימוש

בדוק את תאריך התפוגה של העט (EXP). אל תשתמש בעט אם תאריך התפוגה עבר.




הנח את עט הפסנירה מוחוץ למקרר ל-30 דקות לפני הזרקה, על מנת שיתחמס מעט ויגיע לטמפרטורת החדר (בין 20°C ל- 25°C).

אין לחםם את העט בשום דרך אחרת. לדוגמה, אין לחםם אותו במיקרוגל, במים חמים, או להניח אותו ליד מקורות חום כלשהם. יש להשתמש בעט פסנירה תוך 14 ימים מהרגע שהוזاعت אותו מהמקרר. אין להסיר את הפקק עד אשר הגיעו לשלב 6.

שלב 3 - בדוק את הנוזל בעט המוכן לשימוש

הסתכל על הנוזל דרך חלונית הצפיה בעט. הנוזל בעט צריך להיות צלול וחסר צבע או צהבהב. יתכן כי הנוזל בעט יכול חלקיקים לבנים קטנים. אל תשתמש בעט הפסנירה המוכן לשימוש אם הנוזל בעט עכור, אם צבעו שונה מהמתואר מעלה או אם מכיל חלקיקים גדולים. יתכן ותבחן בבועית אוויר קטן בנוזל שבעט. זה תקין. אין צורך לעשות כלום בנידון.



שלב 4 - בחר את מקום ההזרקה

מקום הזרקה המומלץ הוא החלק הקדמי של הירך שלך.

ניתן גם להזריק בחלק התחתון של הבطن שלך.


- אל תזריק למרחק של עד 5 סנטימטרים מהטבור שלך.

- אל תזריק במקום בו העור שלך רגish, חבול, מצולק או קשה.

- אל תזריק על צלקת או עור פגום.

- אל תזריק דרך הבגדים

באם הזרקה מתבצעת על ידי אדם אחר הוא יכול להזריק לך בזרוע העליונה, בירך או בבטן. **אל תנסה להזריק לעצמך בזרוע.** עברו כל הזרקה, בחר מיקום הזרקה שונה הנמצא למרחק של לפחות 3 סנטימטרים ממקום הזרקה האחרון.




שלב 5 - נקה את מקום ההזרקה

רחץ את ידך היטב בעזרת סבון ומים.

נקה את אזור ההזרקה עם פד אלכוהול בתנודות סיבוביות. הנח לאזרור להתייבש.

אל תיגע באזורי שניקית לפני ההזרקה.

אל תיבש את האзор באמצעות נשיפה או כל אוורור שהוא.



שלב 6 - הסר את הפקק

אחזז את גוף העט ביד אחת, ובザירות משור בצורה ישירה את הפקק בעזרת ידך השנייה.

הנח את הפקק בצד על מנת להשליך אותו מאוחר יותר.


מגן המחתת הירוק כתעת חשוף. מטרתו למנוע ממך לגעת במחט.

אל תנסה לגעת במחט או לדחוף את מגן המחתת הירוק עם האצבע שלך.

אל תנסה להחזיר את הפקק חוזרת למקוםו בעט הפסנירה. אתה עלול להפעיל את ההזרקה של העט

מוקדם מדי או לפגוע במחט.

השלם את השלבים הבאים מיד לאחר הסרת הפקק.




שלב 7 - הזרק את התרופה פסנרה

עקבות אחר ההנחיות אשר קיבלת מאיש הצוות הרפואי על אופן ההזרקה. אתה יכול לצבוט בעדינות את העור באזורי ההזרקה או להזריק מבליל לצבוט את העור באזורי ההזרקה.


עקבות אחר ההוראות המפורטים בתמונות הבאות 1, 2, 3 ו- 4 על מנת להזריק את התרופה פסנרה:

החזק את העט המוכן לשימוש במקום למשך כל ההזרקה.
אל תנסה את מנה החזקתו העט לאחר שהזרקה החללה.




מנח העט באזורי ההזרקה


1. הניח את מגן המחת של עט הפסנרה באופן שטוח על פני העור (בזווית של 90 מעלות). וודא כי אתה יכול לראות את חלונית הצפיה.



2. לחץ כלפי מטה בחזקה. אתה תשמע 'קליק'. ה'קליק' יסמן לך שההזרקה החלה. הבוכנה הירוקה תנוע כלפי מטה בחלונית הצפיה במהלך ההזרקה.




3. אחוד כלפי מטה בחזקה למשך 15 שניות. אתה תשמע 'קליק' שני. ה'קליק' השני יסמן לך שההזרקה הסתיימה. הבוכנה הירוקה תמלא את חלונית הצפיה.




4. הרם את עט הפסנורה בצורה ישרה. מגן המחתץ יחליק כלפי מטה, יכסה את המחתץ וינעל במקומו.

שלב 8 - בדוק את חלונית הצפיה




בדוק את חלונית הצפיה על מנת לוודא שכל נוזל התרופה הוזרkan. אם הבוכנה הירוקה לא ממלאת את כל חלונית הצפיה, יתכן כי לא הזרקת את כל המנה של התרופה. אם זה קורה, או אם יש לך שאלות נוספות, התקשר לרופא המטפל.



שלב 9 - בדוק את מקום ההזרקה

יתכן ותבחן במעט דם או נוזל במקום ההזרקה. זה תקין. בעדינות לחץ על מקום ההזרקה באמצעות צמר גפן או גזה עד אשר הדימום נפסק.
אל תשפשף את אזור ההזרקה.
אם נדרש, כסה את מקום ההזרקה בעזרת פלسطר.



שלב 10 - השלים את העט המשומש בבטחה

- כל עט מוקן לשימוש של פסנירה מכיל מנה אחת ולא ניתן להשתמש בו שוב.
 - הכנס את העט המשומש **למיכל עמיד לחפצים חדים** מיד לאחר השימוש.
- אין להשליך את העט המשומש לפח הפסולת הביתית.

זרוק את הפקק ואת הציוד הנוסף בפח הפסולת הביתי.



השלך את המיכל העמיד לחפצים חדים על פי הנקודות שניתנו לך על ידי הרופא או הרוקח.
אין למחזר את המיכל העמיד לחפצים חדים.

לשם הפשטות ולהקלת הקיראה, עלון זה נוסח בלשון זכר, התוורופה מיועדת לשני המינים.