

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة

(مستحضرات) - 1986

يسوّق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

ميتفورمين إينوفامد

أقراص

التركيب

يحتوي كل قرص على:

ميتفورمين هيدروكلوريد 850 ملغ

Metformin hydrochloride 850 mg

المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر - أنظر الفقرة 6 - "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمال الدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. وُصف هذا الدواء للعلاج من إحدك. لا تعطيه للأخرين فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

الدواء مخصص لمعالجة السكري من النوع 2، وخاصة للمتعالجين الذين يعانون من وزن زائد، عندما يكون التغيير في النظام الغذائي والتمارين وحدها غير كافية لموازنة نسب الجلوكوز في الدم.

● لدى الكبار، ميتفورمين إينوفامد مخصص كعلاج منفرد أو بمشاركة أدوية أخرى لمعالجة السكري بالإعطاء الفموي أو مع إنسولين.

● لدى الأطفال من عمر 10 سنوات والمراهقين، ميتفورمين إينوفامد مخصص كعلاج منفرد أو بمشاركة مع إنسولين.

لوحظ إنخفاض في إختلاطات السكري لدى المتعالجين الكبار الذين يعانون من سكري من النوع 2 والوزن الزائد الذين تم علاجهم بـ ميتفورمين كخط علاج أول بعد فشل التغيير في النظام الغذائي.

الفصيلة العلاجية:

أدوية لخفض نسب الجلوكوز في الدم. ننتمي المادة الفعالة إلى فصيلة البيجوانيدات.

الإنسولين هو هورمون ينتجه البنكرياس، الذي يجعل الجسم يستوعب الجلوكوز (السكر) من الدم. يستعمل جسمك الجلوكوز لإنتاج الطاقة أو يخزنه للإستعمال المستقبلي.

إذا كنت تعاني من السكري، فإن البنكرياس لديك لا ينتج ما يكفي من الإنسولين أو أن جسمك لا يمكنه أن يستعمل كما ينبغي الإنسولين الذي ينتجه. يسبب هذا الأمر إلى ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم. يساعد ميتفورمين إينوفامد على خفض نسبة الجلوكوز في الدم إلى الوضع السليم قدر الإمكان. إذا كنت بالغا ولديك وزن زائد، فإن تناول ميتفورمين إينوفامد على المدى البعيد يساعد أيضا في خفض الخطورة لحدوث إختلاطات تتعلق بالسكري. هناك علاقة بين ميتفورمين إينوفامد وبين ثبات وزن الجسم أو إنخفاض معتدل في الوزن.

2. قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

● كنت حساساً (البرجي) للمادة الفعالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية").

● كنت تعاني من مشاكل في الكبد.

● كنت تعاني من خلل شديد في وظيفة الكلى.

● كنت تعاني من سكري غير متوازن مع، على سبيل المثال، حالة شديدة لفرط سكر الدم (نسب مرتفعة للجلوكوز في الدم)، غثيان، تقيؤ، إسهال، إنخفاض سريع في الوزن، حماض لبني (أنظر أدناه "خطورة حدوث حماض لبني")، أو حماض كيتوني. حماض كيتوني هو حالة حيث تتراكم المواد التي تسمى "أجسام كيتونية" في الدم، مما قد يؤدي إلى ما قبل سبات سكري. الأعراض تشمل: ألم في البطن، تنفس سريع وعميق، نعاس أو رائحة فواكه غير عادية في التنفس.

● فقدت أكثر من اللازم سوائل من الجسم (جفاف) على سبيل المثال بسبب الإسهال الشديد/المستمر أو من تقيؤات متواصلة. قد يؤدي الجفاف إلى مشاكل في الكلى، التي قد تؤدي إلى خطورة حدوث حماض لبني (أنظر الفقرة "تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء").

● كنت تعاني من تلوث خطير مثل تلوث يؤثر على الرئتين/ جهاز القصبات الهوائية/الكلى لديك. قد تؤدي التلوثات الخطيرة إلى مشاكل في الكلى، التي قد تؤدي إلى خطورة حدوث حماض لبني (أنظر الفقرة "تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء").

● كنت تعاني من قصور قلبي شديد أو إجتزت مؤخراً نوبة قلبية، تعاني من مشاكل شديدة في الدورة الدموية (مثل صدمة) أو تعاني من صعوبات في التنفس. هذه الحالات قد تؤدي إلى نقص في تزويد الأنسجة بالأكسجين، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى خطورة حدوث حماض لبني (أنظر الفقرة "تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء").

● كنت تستهلك كميات كبيرة من الكحول.

إذا إنطبقت عليك حالة أو أكثر من الحالات المذكورة أعلاه، إستشر الطبيب قبل بدء العلاج بهذا الدواء.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

قبل العلاج بـ ميتفورمين إينوفامد، إحدك للطبيب إذا:

● كنت مقدا على إجتياز فحص، مثل تصوير رنتجن أو مسح، الذي يتطلب حقن مواد ظليلة في دمك تحتوي على اليود.

● كنت مقدماً على إجراء عملية جراحية كبيرة.

عليك التوقف عن تناول ميتفورمين إينوفامد لفترة معينة قبل وبعد الفحص أو العملية الجراحية. سيقرر طبيبك ما إذا كنت بحاجة إلى علاج آخر خلال هذه الفترة. من المهم أن تتبع تعليمات الطبيب بدقة.

تحذيرات خاصة إضافية

خطورة حدوث حماض لبني

يمكن أن يسبب ميتفورمين إينوفامد عرضاً جانبياً نادراً جداً لكن أيضاً خطيراً جداً، يسمى الحماض اللبني، بالأخص إذا كانت كليتيك لا تعملان كما ينبغي. أيضاً تزداد خطورة تطور حماض لبني في الحالات التالية: عندما يكون السكري غير متوازن، تلوثات خطيرة، صوم مطوّل، إستهلاك مبالغ فيه للكحول، تجفاف (أنظر التفصيل أدناه)، مشاكل في الكبد وأي حالة طبية حيث ينخفض تزويد أعضاء الجسم بالأكسجين (مثل مرض حاد وشديد في القلب).

إذا انطبقت عليك حالة واحدة أو أكثر من الحالات المذكورة أعلاه، استشر الطبيب لمزيد من التعليمات.

يجب التوقف عن تناول ميتفورمين إينوفامد لفترة قصيرة إذا كنت تعاني من حالة التي يمكن أن يكون لها علاقة بالجفاف (فقدان كبير للسوائل)، مثل تقيؤات كثيرة، إسهالات، سخونة، التعرض للحرارة أو إذا كان إستهلاك السوائل أقل من المعتاد. إستشر الطبيب لمزيد من التعليمات.

يجب التوقف عن تناول ميتفورمين إينوفامد والتوجه فوراً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى، إذا كنت تقاسي من بعض أعراض الحماض اللبني، لأن هذه الحالة قد تؤدي إلى سبات. أعراض الحماض اللبني تشمل:

- تقيؤات
- ألم في البطن
- تقلصات عضلية
- شعور عام غير جيد يرافقه إرهاق شديد
- صعوبات في التنفس
- إنخفاض في درجة حرارة الجسم والنض

يعتبر الحماض اللبني حالة طبية طارئة التي تتطلب علاجاً في المستشفى. إذا توجب عليك إجتياز عملية جراحية كبيرة، فعليك التوقف عن تناول ميتفورمين إينوفامد خلال فترة زمنية ما بعد الإجراء. يقرر طبيبك متى عليك التوقف ومتى عليك أن تبدأ من جديد العلاج بـ ميتفورمين إينوفامد.

ميتفورمين إينوفامد كعلاج منفرد لا يسبب حالة نقص سكر الدم (نسبة منخفضة جداً للجلوكوز في الدم). مع ذلك، إذا كنت تتناول ميتفورمين إينوفامد مع أدوية أخرى لعلاج السكري التي من شأنها التسبب في حالة نقص سكر الدم (مثل: سولفونيل - أوربا، إنسولين، ميغلينيدات)، هنالك خطورة لحدوث حالة نقص سكر الدم. إذا كنت تقاسي من أعراض حالة نقص سكر الدم مثل ضعف، دوام، تعرق زائد، نبض سريع، اضطرابات في الرؤية أو صعوبة في التركيز - عادة ما يساعد في هذه الحالة هو شرب أو تناول الأطعمة التي تحتوي على السكر.

الفحوص والمتابعة

● سيجري طبيبك فحوص منتظمة للجلوكوز في الدم ويلائم المقدار الدوائي لـ ميتفورمين إينوفامد إلى نسب الجلوكوز في دمك. يجب الحرص على التحدث مع الطبيب بشكل روتيني. هذه المراقبة مهمة بشكل خاص في حال معالجة الأطفال والمراهقين أو المسنين.

● سيقوم الطبيب أثناء العلاج بـ ميتفورمين إينوفامد بفحص وظائف كليتيك على الأقل مرة واحدة في السنة أو بوتيرة أعلى إذا كنت مسناً و/أو إذا حدث تدهور في وظائف كليتيك.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت مقدا على إجراء حقنة للدم لمادة ظليلة التي تحتوي على اليود، مثل ما أجل تصوير رنتجن أو مسح، يجب أن تتوقف عن تناول ميتفورمين إينوفامد قبل أو أثناء الحقن. سيقرر طبيبك متى عليك التوقف ومتى عليك أن تستأنف العلاج بـ ميتفورمين إينوفامد.

إذا كنت تستعمل أو إذا استعملت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحدك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. قد تحتاج إلى مراقبة أكثر تواتراً لنسب الجلوكوز في الدم ووظائف الكلى، أو قد يقوم طبيبك بملاءمة المقدار الدوائي لـ ميتفورمين إينوفامد. إحدك للطبيب أو للصيدلي بالأخص إذا كنت تتناول:

- أدوية تزيد من كمية البول (مدرات بولية).
- أدوية لمعالجة الألم والإلتهاب (NSAID) ومثبطات COX-2، مثل ايبوبروفين وسيليكوكسيب).
- أدوية معينة لمعالجة ارتفاع ضغط الدم (مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين [ACE]، وحاجبات المستقبل لأنجيوتنسين II).
- مقدرات المستقبل بيتا-2، مثل سالبوتامول أو تيربوتالين (لمعالجة الربو).
- كورتيكوستيروئيدات (لعلاج حالات مختلفة، مثل معالجة إلتهاب شديد في الجلد أو الربو).
- أدوية من شأنها أن تغير نسب ميتفورمين إينوفامد في دمك، بالأخص في حال أداء وظيفي كلوي متدني (مثل فيراياميل، ريفامپيسين، سيميثيدين، دولوتيجرافير، رانولازين، تريميتوبريم، فانديتانيب، إيسافوكونازول، كريتزينيب، أولاباريب).
- أدوية أخرى لمعالجة السكري.

إستعمال الدواء والطعام

يجب تناول ميتفورمين إينوفامد مع وجبة الطعام أو بعدها مباشرة من أجل منع أعراض جانبية في الجهاز الهضمي.

إستعمال الدواء وإستهلاك الكحول

تجنّب الإفراط في إستهلاك الكحول أثناء العلاج بـ ميتفورمين إينوفامد، لأنه من الجائر أن تزداد الخطورة للإصابة بالحماض اللبني (أنظر الفقرة "تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء").

الحمل والإرضاع

أخبري الطبيب إذا كنت في فترة الحمل، تعتقدين بأنك حامل أو تخططين لحصول حمل، ليقرر فيما إذا هنالك حاجة لتغيير علاجك أو القيام بمراقبة نسب الجلوكوز في الدم. لا يوصى بإستعمال ميتفورمين إينوفامد إذا كنت مرضعة أو تخططين للإرضاع.

السياسة وإستعمال الماكنات

ميتفورمين إينوفامد لوحده لا يسبب حالة نقص سكر الدم (نسبة منخفضة جداً للجلوكوز في الدم). لذلك ليس من المفترض أن يؤثر الدواء على قدرتك على القيادة أو تشغيل ماكنات.

مع ذلك، يجب إتخاذ الحذر إذا كنت تتناول ميتفورمين إينوفامد سوية مع أدوية أخرى لمعالجة السكري التي يمكنها أن تسبب حالة نقص سكر الدم (مثل: سولفونيل-أوريا، إنسولين، ميغلينيديات). أعراض حالة نقص سكر الدم تشمل ضعف، دوام، تعرّق زائد، نبض سريع، إضطرابات في الرؤية أو صعوبة في التركيز. لا يجوز القيادة أو إستعمال الماكنات إذا بدأت تشعر بهذه الأعراض.

3. كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائماً إستعمال المستحضر بحسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بالنسبة للمقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر. المقدار الدوائي وطريقة العلاج محددين من قبل الطبيب فقط. ميتفورمين إينوفامد لا يشكل بديلاً لإتباع نمط حياة صحي. يجب إتباع إرشادات التغذية الموصى بها من قبل الطبيب، والحفاظ على نشاط بدني منتظم.

المقدار الدوائي الإعتيادي هو:

أطفال من عمر 10 وما فوق والمراهقين:

المقدار الدوائي الإبتدائي عادة هو 500 ملغ أو 850 ملغ (قرص واحد) مرة في اليوم. المقدار الدوائي الأعظمي هو 2,000 ملغ في اليوم مقسم إلى 2 أو 3 مقادير دوائية. يوصى بمعالجة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم 12 - 10 سنة فقط إذا تم إعطاء تعليمات صريحة من الطبيب نظراً لأن التجربة محدودة في هذه الفئة العمرية.

الكبار:

المقدار الدوائي الإعتيادي الإبتدائي هو عادة 500 ملغ أو 850 ملغ (قرص واحد) 2-3 مرات في اليوم. المقدار الدوائي الأعظمي هو 2,550 ملغ في اليوم، مقسم لـ 3 مقادير دوائية.

إذا كنت تعاني من خلل في وظائف الكلى، فمن الممكن أن يصف لك الطبيب مقداراً دوائياً أقل.

إذا كنت متعالجاً أيضاً بإنسولين، فسيشركك الطبيب عن كيفية بدء تناول ميتفورمين إينوفامد.

لا يجوز شطر قرص ميتفورمين إينوفامد. عندما تكون هناك حاجة إلى مقدار دوائي 500 ملغ، يجب العثور على مستحضر يحتوي على ميتفورمين 850 ملغ الذي بالإمكان شطره (للحصول على مقدار دوائي 425 ملغ)، الذي بإمكانه أن يكون بديلاً لقرص يحتوي على 500 ملغ.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

كيفية تناول ميتفورمين إينوفامد:

يجب تناول ميتفورمين إينوفامد مع وجبة الطعام أو مباشرة بعدها لتجنب حدوث أعراض جانبية في الجهاز الهضمي.

يجب بلع القرص مع كأس من الماء.

● إذا كنت تتناول مقداراً دوائياً واحداً في اليوم، تناوله في الصباح (مع وجبة الفطور).

● إذا كنت تتناول الدواء مرتين في اليوم، تناوله في الصباح (مع وجبة الفطور)، وفي المساء (مع وجبة العشاء).

● إذا كنت تتناول الدواء 3 مرات في اليوم، تناوله في الصباح (مع وجبة الفطور)، وفي الظهر (مع وجبة الغداء) وفي المساء (مع وجبة العشاء).

السحق/ الشطر/ المضغ:

لا يجوز شطر، مضغ أو سحق القرص.

إذا كنت تعتقد بعد مدة من الزمن أن تأثير ميتفورمين إينوفامد قوي أو ضعيف أكثر من اللازم، فاستشر الطبيب.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر

إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً، فقد تعاني من حماض لبني. أعراض الحماض اللبني غير محددة، مثل تقيؤات، ألم في البطن مع تقلصات عضلية، شعور عام غير جيد يترافق بإرهاق شديد وصعوبات في التنفس. أعراض إضافية تشمل إنخفاض درجة حرارة الجسم والنبض. إذا قاسيت من هذه الأعراض، يجب التوجه فوراً لتلقي علاجاً طبيياً، لأن الحمض اللبني قد يؤدي إلى سبات. توقّف فوراً عن تناول ميتفورمين إينوفامد وتوجه فوراً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى.

إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفلاً بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وإحضر عبلة الدواء معك.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المحدد، لا يجوز تناول مقداراً دوائياً مضاعفاً للتعويض عن المقدار الدوائي المنسي. تناول المقدار الدوائي القادم في الوقت المعتاد.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب. لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

لا يجوز تناول الدواء في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع نظارات إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال ميتفورمين إينوفامد قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين.

لا تندهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

قد يسبب ميتفورمين إينوفامد عرضاً جانبياً نادراً جداً (عرض الذي يظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10,000) لكنه خطير جداً يسمى حماض لبني (أنظر الفقرة 2 "تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء"). إذا حدث هذا العرض فيجب التوقف عن تناول ميتفورمين إينوفامد والتوجه فوراً للطبيب أو للمستشفى، لأن الحمض اللبني قد يؤدي إلى سبات.

أعراض جانبية إضافية:

أعراض جانبية شائعة جداً (أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من بين عشرة):

● إضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل غثيان، تقيؤ، إسهال، ألم في البطن وفقدان الشهية للطعام. تحدث هذه الأعراض الجانبية عادة عند بدء العلاج بـ ميتفورمين إينوفامد. بالإمكان التخفيف من هذه الأعراض بواسطة تقسيم المقدار الدوائي خلال اليوم وكذلك بواسطة تناول ميتفورمين إينوفامد مع أو مباشرة بعد وجبة الطعام. في حال استمرار الأعراض، توقف عن تناول ميتفورمين إينوفامد وإستشر الطبيب.

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100):

● تغيرات في حاسة الذواق.
● تدني أو إنخفاض نسب فيتامين B12 في الدم (الأعراض من شأنها أن تشمل إرهاق حاد، ألم وإحمرار في اللسان [التهاب اللسان - glossitis]، الشعور بدبابيس وإبر [paresthesia] أو شحوب أو إصفرار الجلد). من شأن طبيبك أن يجري عدة فحوص من أجل الكشف عن المسبب لهذه الأعراض لأن بعضها من شأنه أن ينجم أيضاً عن السكري أو عن مشاكل صحية أخرى ليس لها علاقة.

أعراض جانبية نادرة جداً (أعراض تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10,000):

● حماض لبني. إختلاط نادر جداً لكنه خطير جداً، خاصة إذا كانت كليتيك لا تعملان كما ينبغي. أعراض الحمض اللبني غير محددة (أنظر الفقرة 2 "تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء").
● شذوذ في فحوص وظائف الكبد أو يرقان (إلتهاب الكبد قد يسبب إرهاق، فقدان الشهية للطعام، إنخفاض في الوزن، مع أو بدون إصفرار الجلد أو بياض العينين). إذا قاسيت من هذه الأعراض، توقف عن تناول ميتفورمين إينوفامد وراجع طبيبك.
● ردود فعل جلدية، مثل إحمرار في الجلد (حمامى)، حكة أو طفح حاك (شرى).

الأطفال والمراهقون

أظهرت بيانات محدودة بشأن الأطفال والمراهقين أن الأعراض الجانبية كانت مماثلة في مدى نوعها وخطورتها لتلك التي بلغ عنها لدى البالغين.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمتم إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين الدواء؟

● تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

● لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العبلة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

● يجب التخزين في مكان جاف، دون 25 درجة مئوية.
● لا يجوز رمي الأدوية إلى المجاري أو للقمامة المنزلية. إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. هذه الوسائل تساعد في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمركب الفعال أيضاً:

Hypromellose, Povidone (K-90), Magnesium stearate, Macrogol 400, Macrogol 6000.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبلة؟

قرص مطلي، دائري، محدب، بلون أبيض، طبع على جانب واحد 'A' وطبع على الجانب الثاني '61'. يتم تعبئة الأقراص في لويحات (بليستر) بداخل عبلة كرتون محتواها 30 قرصاً.

المنتج: أورويبندو فارما م.ض، مايتريفيهار 2، أميريبيت، حيدرأباد-500038، الهند.

صاحب الإمتياز والمستورد: إينوفامد م.ض، شارع بثير جنيم 55، ص.ب. 55، إيفن يهودا 40500.

تم إعدادها في حزيران 2022 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 162-59-35148

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.