

פורטם עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידי **עלון לזכרון לפי הקטגורי הרוקחים (מכשירי "המשמרי" 1986** התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

ויגהמוקס

טיפות עיניים, תמיסה.

הרכב: מוקסיפלוקסצין (הכידורכולויד) 0.5% Moxifloxacin (as Hydrochloride) 0.5% מרכיבים הבלתי פעילים מופיעים בסך הכל 6 - "מידע נוסף".

קרא בעיון על העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו גרשמה עוברי. אל תעביי אותה לאחרים. היא עלולה להזיק לילד אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי זומה.

1. למה מיועדת התרופה?

לטיפול בדיקולת בלחמית העין הנגרמת על ידי חיידקים הרגישים לתרופה.

קבוצה תרופית: האנטיביוטיקה הרגישה פחת הפלואורוקווינולונים דור רביעי.

2. לפני השימוש בתרופה

- ❗ **אין להשתמש בתרופה אם:**
 - דווחו עליך רגישות למוקסיפלוקסצין (Moxifloxacin) או לאחד ממרכיבי התרופה או לתרופות אנטיביוטיות אחרות מסוג הקווינולונים.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
אלרגיה אם: אם הנך חש תגובת אלרגיה ל**ויגהמוקס**. תגובות אלרגיה אינן נפוצות ותגובות אלרגיה מורחות הינן נדירות. אם הנך חש תגובת אלרגיה כלשהי או תופעת לוואי כלשהי, אגז רגא סידוף 4.

אם הנך מרכיב עדשות מגע - הפסק את השימוש בעדשות המגע אם מופיעים סימנים או סימפטומים של זיהום בעין. הרכב משקפיים במקום. אין להרכיב את עדשות המגע על עיניו שיסימני הזיהום חלפו ולפני שהפסקת את השימוש בויגהמוקס.

• נפוחות וקרע בגיד מופיעים באנשים שנוטלים פלואורוקווינולונים דרך הפה או על ידי הזרקה תוך ורידית, במיוחד במטופלים מבוגרים ובלאה שמטופלים במקביל בקורטיקוסטרואידים. הפסק את השימוש בויגהמוקס אם אתה מפתח כאב או נפוחות בגידים (דלקת גבד).

• אפשר להשתמש בויגהמוקס עבור ילדים, מטופלים מבוגרים ומטופלים עם הפרעות בתפקוד הכליות או הכבד.

בדומה לכל אנטיביוטיקה, שימוש ממושך בויגהמוקס עלול להוביל לזיהומים אחרים.

❗ **אם אתה לוקח, או אם לוקח לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, שפך על כך לרופא או רוקח.**

❗ הירון והקנה

אם הנך בהריון, מתכננת הריון או מניקה יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה.

❗ הנגיה ושימוש בטובנות

הנך עלול לחוש בטשטוש בריאה לזמן קצר אחרי השימוש בתרופה. אין לנהוג או להפעיל מכונות עד שתופעו זו חולפת.

❗ טיפול בילדים ובתינוקות:

ההכשר והגומוקס בטוח ויעיל לשימוש בילדים ותינוקות. אין מסיק מידע על השימוש בויגהמוקס בילודים, לכן עבורם השימוש אינו מומלץ.

❗ כיצד תשתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. עליו לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מהרופא: טיפה אחת בעין המטופלת 3 פעמים ביום למשך 4 ימים.

אין לעבור על המנה המומלצת.

יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קצובים כפי שנקבע על ידי הרופא המטפל.

אין לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

• כבדי להימנע מזיהום, אין לתת לקצה הבקבוק לגעת במשטח כלשהו (כולל העין עצמה). יש לשמור על הבקבוק סגור היטב.

• יתכן ובקבוק הטיפול אינו מלא; הדבר נועד לאפשר שליטה טובה יותר על קצב הטיפול.

• אין לסחוט את הבקבוק, לחיצה עדינה על בסיס הבקבוק מסיקה להוצאת הטיפה.

• כיצד להשתמש בטיפות: שימוש במראה יכול להקל על השימוש בתרופה. ראשית, רחץ את ידך. הטה את הראש לאחור. בעזרת האצבע המורה, משוך כלפי מטה את העפעף החתון, לצירת מעין "כיס" (אור 1).

• יש לטפטף את התרופה אל תוך ה"כיס" שנוצר (אור 2). עצום עיניך בעדינות. אין למצמצץ. השאר בעיניים עצומות למשך 1 עד 2 דקות.

• בנוסף להוראות שימונן לעיל - מיד לאחר טפטוף הטיפה אל העין, לחץ באמצעות האצבע האמצעית על הפינה הפנימית של העין (אור 3). יש להמשיך בלחץ 1 עד 2 דקות לאחר הטפטוף אל העין. פעולה זו עוזרת להימנע מספיגת התרופה אל תוך הגוף ובכך עוזרת למנוע תופעות לוואי.

• לאחר השימוש בתרופה, שטוף היטב את ידך בכדי לנקותן משאריות של תרופה.

• כבדי להימנע מהפצת זיהום, אין להשתמש באותו בקבוק של תרופה ליותר מאדם אחד.

• סגור את הבקבוק היטב מיד לאחר השימוש.

• עיניים, ואתה משתמש ב יותר מסוג אחד של טיפות עיניים, יהיוגומוקס טיפות עיניים אחרות. יש להשתמש במשחות ליעניים רק לאחר סיום טיפול טיפות עיניים.

• סגור את הבקבוק היטב מיד לאחר השימוש.

• במידה ואתה משתמש ביותר מסוג אחד של טיפות עיניים, יש להמתין לפחות 10-15 דקות בין נטילת יהיוגומוקס טיפות עיניים אחרות. יש להשתמש במשחות ליעניים רק לאחר סיום טיפול טיפות עיניים.

אם נטלת טבעות מינון גבוה יותר, עליו לשטוף את העין במים פושרים.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד להדריך מיון של בית-חולים, והבא אריות התרופה איתך.

אם סכחת לישול תרופה זו בזמן הדרוש, אין לישול מנה כפולה. יש לישול מנה מיד שכונצרת. עם זאת, אם הנך קרוב לזמן נטילת המנה הבאה, יש ללדג על זה המנה ששכחה ולשוב למטטר המיון התקין עם הנטילה הבאה.

יש להחליט בטיפולו כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם אתה שומר במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אין לישול תרופות בחיבורן יש לבדוק את הותיות והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. יש להרכיב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בויגהמוקס עלול לגרום לתופעות לוואי. חלקן מהמשמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מיד לרופא אם הנך סובל מתגובת אלרגיה רצינית מ**מאחת מהתופעות הבאות:** נפוחות בידים, ברגליים, בקרסוליים, בפנים, בשפתיים, בפה או בגרון שעלולה לגרום לקושי בנשימה או בשמימה, פריחה או סרפדת (פריחת עור מקצצצצצ), שלפוחיות, פצעים וכיבים.

תופעות לוואי נוספות:

תופעות לוואי נפוחות - תופעות שמופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 100:

תופעות לוואי שאינן נפוחות - תופעות שמופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 1,000:

תופעות לוואי נדירות - תופעות שמופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 10,000:

תופעות לוואי נדירות - תופעות שמופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 10,000:

• רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 31054 10 133

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

תופעות לוואי שכיחות: אינה ידועה - תופעות שכיחות טורם נקבע:

תופעות בעיניים: זיהום בעין, עכירות בפני שטח העין, נפוחות בקרנית, משקעים בפני שטח העין, עלייה בלחץ בעין, שריטה בפני שטח העין, אלרגיה בעין, הפרשות מהעין, יצור מוצב ל דמעות, רגישות לאור.

תופעות כלליות: קוצר נשימה, קצב לב לא רגיל, סחרחורת, סימפטומים מוגברים של אלרגיה, גירוד, פריחה, אדמומיות בעור, בחילות ופריחת עור מקצצצצ (סרפדת).

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il). המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על "כניסה לקישור":

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

• מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור ומחוץ לישול ידם של ילדים /או תינוקות, ועל ידי כך תמנע הרעלה. **אל תגרום להקצאה ללא הוראה מפורשת מרופא.**

• סגור היטב ומנע חדירת אוויר ורטיבות. גם לפי תנאי האריזה/האחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד.

• אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי הקרטון/תווית. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותה חודש.

• אין לזרוק תרופות למערכת הביוב או לפח האשפה הביתי. יש להתייעץ עם הרוקח לגבי אופן ההיפטרות מתרופות לאחר סיום השימוש וזאת בכדי להגן על הסביבה.

• אחסן מתחת ל- 25°C. אין להשתמש בתרופה לאחר 28 יום מהפתיחה הראשונה.

• אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם: Sodium Chloride, Boric Acid, Hydrochloric Acid OR Sodium Hydroxide, Purified Water

• כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה: התרופה הינה תמיסה המסוקפת באריזה המכילה בקבוק פלסטיק בנפח 5 מ"ל עם מכסה בורג.

• בעל הרישום ותכונות: נוברטיס ישראל בע"מ, ת.ד. 7126, תל אביב.

• שם היצרן ותכונות: אלקון פארמאטיקלס בע"מ, פריבורג, שוויץ.

• עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: אוגוסט 2017.

• רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 31054 10 133

• לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

• סגור את הבקבוק היטב מיד לאחר השימוש.

• עיניים, ואתה משתמש ב יותר מסוג אחד של טיפות עיניים, יהיוגומוקס טיפות עיניים אחרות. יש להשתמש במשחות ליעניים רק לאחר סיום טיפול טיפות עיניים.

• סגור את הבקבוק היטב מיד לאחר השימוש.

• עיניים, ואתה משתמש ב יותר מסוג אחד של טיפות עיניים, יהיוגומוקס טיפות עיניים אחרות. יש להשתמש במשחות ליעניים רק לאחר סיום טיפול טיפות עיניים.

• סגור את הבקבוק היטב מיד לאחר השימוש.

• עיניים, ואתה משתמש ב יותר מסוג אחד של טיפות עיניים, יהיוגומוקס טיפות עיניים אחרות. יש להשתמש במשחות ליעניים רק לאחר סיום טיפול טיפות עיניים.

• סגור את הבקבוק היטב מיד לאחר השימוש.

• עיניים, ואתה משתמש ב יותר מסוג אחד של טיפות עיניים, יהיוגומוקס טיפות עיניים אחרות. יש להשתמש במשחות ליעניים רק לאחר סיום טיפול טיפות עיניים.

• סגור את הבקבוק היטב מיד לאחר השימוש.

• עיניים, ואתה משתמש ב יותר מסוג אחד של טיפות עיניים, יהיוגומוקס טיפות עיניים אחרות. יש להשתמש במשחות ליעניים רק לאחר סיום טיפול טיפות עיניים.



- אם אתה לוקח, או אם לוקח לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, שפך על כך לרופא או רוקח.
- אם אתה לוקח, או אם לוקח לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, שפך על כך לרופא או רוקח.
- אם אתה לוקח, או אם לוקח לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, שפך על כך לרופא או רוקח.
- אם אתה לוקח, או אם לוקח לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, שפך על כך לרופא או רוקח.