نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) - 1986

يُسوّق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

سيمڤاكسون, حبسولات 10,20,40,80 ملغ

تحتوي كل حبسولة على سيمڤاستاتين (Simvastatin) بجرعة 10، 20، 40 و- 80 ملغ على التوالي.

مواد غير فعالة ومسببات الحساسية في الدواء – انظر للبند 6 "معلومات إضافية" وللبند 2 "معلومات مهمة حول جزء من مركبات الدواء".

اقرأ النشرة بامعان قبل أن تستعمل الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

هذا الدواء وصف لشفاء مرضك. لا تعطه إلى آخرين. فهو قد يسبب لهم الضرر حتى لو بدا لك ان حالتهم الطبية مماثلة.

الدواء غير مخصص للأطفال والمراهقين دون جيل 20 سنة.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

لدى مرضى لديهم مرض القلب التاجي وفرط كولسترول الدم, يقلل سيمڤاستاتين من:

- اختطار الوفاة بشكل عام من خلال خفض الوفيات نتيجة لأمراض القلب.
- اختطار حدوث نوبة قلبية غير مميتة.
- اختطار القيام بعمليات جَرَوية لاستعادة جريان الدم (للقلب (مثل توسيعات بالبالون أو جراحات المجازة).
- الاختطار لسكتة دماغية ولنوبة اقفارية عابرة (Transient Ischemic Attack–TIA).

سيمڤاستاتين مُستطب لخفض مستويات LDL والمركبات الدهنية الأخرى في الدم ولزيادة مستويات HDL في الدم لدى مرضى لديهم فرط دهنيات في الدم (مستوى مرتفع من الدهنيات في الدم).

الفصيلة العلاجية: ستاتينات, مثبطات عمل الإنزيم HMG-CoA ريدوكتاز.

كيف يعمل سيمڤاستاتين:

سيمڤاكسون يحتوي على مادة فعالة باسم سيمڤاستاتين. يستعمل سيمڤاستاتين لخفض مستوى الكولسترول الإجمالي في الدم (total cholesterol), مستوى الكولسترول "السيء" (كولسترول ال- LDL), ومستويات المركبات الدهنية التي تسمى الچليسيريدات الثلاثية. بالإضافة, يزيد سيمڤاستاتين من مستويات الكولسترول "الجيد" (كولسترول ال- HDL).

الكولسترول هو أحد المركبات الدهنية الموجودة في الدم. يتألف الكولسترول العام بشكل أساسي من كولسترول ال- LDL وال- HDL. يسمى كولسترول ال- LDL في الكثير من الأحيان الكولسترول "السيء", لأنه قد يتراكم على جدران الشرايين ويسبب تكون اللويحات. مع الوقت قد يؤدي تراكم اللويحات إلى تضيق الشرايين. هذا التضيق قد يبطء أو يسد جريان الدم إلى أعضاء حيوية مثل القلب أو الدماغ. قد يؤدي انسداد جريان الدم إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية. يسمى كولسترول ال-HDL في الكثير من الأحيان الكولسترول "الجيد", لأنه يساعد في منع تراكم اللويحات في الشرايين, ويمنع مرض القلب. الچليسيريدات الثلاثية هي نوع آخر من الدهنيات الموجودة في الدم والتي قد تزيد من الاختطار لحدوث مرض قلب.

عليك أن تحرص على نظام غذائي قليل الكولسترول في الفترة التي تتناول بها هذا الدواء.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساسًا (أرجي) للمادة الفعالة (سيمڤاستاتين) أو لأي واحد من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر للبند 6 - "معلومات إضافية" وللبند 2 - "معلومات مهمة عن بعض مركبات الدواء").
- كنت تعاني حاليًا من مشاكل كبد.
- كنت حاملاً أو مرضعةً.
- كنت تتناول أدوية تحتوي على واحد أو أكثر من المواد الفعالة التالية:
  - إيتراكونازول, كيتوكونازول, پوساكونازول أو ڤوريكونازول (التي تستعمل لعلاج العدوى الفطرية).
  - إيريثروميسين, كلاريثروميسين أو تيليثروميسين (التي تستعمل لعلاج العدوى).
  - مثبطات پروتياز HIV مثل: إينديناڤير, نيلفيناڤير, ريتوناڤير أو ساكيناڤير (التي تستعمل لعلاج الـ-HIV).
  - أدوية مضادة للفيروسات لعلاج التهاب الكبد C مثل بوسيپريڤير, تيلاپريڤير, إيلباسڤير أو چيرازوپريڤير (تستعمل لعلاج العدوى بڤيروس التهاب الكبد C).
  - نيفازودون (يستعمل لعلاج الاكتئاب).
  - أدوية مع المادة الفعالة كوبيسيستات.
  - أميودارون (الذي يستعمل لعلاج نظم القلب الغير منتظم).
  - ڤيراپاميل, ديلتيازيم أو أملوديپين (التي تستعمل لعلاج فرط ضغط الدم, ألم في الصدر المتعلق بمرض قلب أو حالات قلبية أخرى).
  - لوميتاپيد (دواء يستعمل لعلاج حالة طبية وخيمة ونادرة من الكولسترول الوراثي).
  - دابتوميسين (دواء يستعمل لعلاج حالات العدوى المعقدة في الجلد وفي انسجة الجلد ولعلاج تَجَرُثُم الدَّم). قد تكون الأعراض الجانبية التي تؤثر على العضلات أقوى عند تناول هذا الدواء خلال العلاج بسيمڤاستاتين. قد يقرر الطبيب بأن عليك التوقف عن تناول **سيمڤاكسون** بشكل مؤقت.
  - كولشيسين (الذي يستعمل لعلاج النقرس).

إضافة للأدوية المفصلة أعلاه, أخبر الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تأخذ أو إذا أخذت مؤخرًا, أدوية أخرى يشمل أدوية بدون وصفة طبيب. بلغ الطبيب خاصة إذا كنت تأخذ دواء واحد من الأدوية التالية:

- أدوية مع مادة فعالة مضادة لتخثر الدم, مثل وارفارين, فينيروكومون أو أسينوكومارول (مضادات التخثر).
- فينوفيبرات (الذي يستعمل كذلك لخفض الكولسترول).
- نياسين (الذي يستعمل كذلك لخفض الكولسترول).
- ريفامپيسين (الذي يستعمل لعلاج السل).
- تيكاچريلور (دواء مضاد للتخثر).

أخبر كل طبيب يسجل لك دواء جديد بأنك تتناول **سيمڤاكسون**.

استعمال الدواء والطعام

يحتوي عصير الچريب فروت على واحد أو اكثر من المركبات التي تؤثر على طريقة تفكيك الجسم لأدوية معينة, بشمل سيمڤاستاتين. **يجب تجنب استهلاك عصير الچريب فروت.**

الحمل والإرضاع

لا تستعملي سيمڤاستاتين إذا كنت حاملاً, تحاولين الدخول في حمل أو تظنين بأنك حامل. إذا حملت خلال العلاج بالدواء, توقفي عن تناوله واتصلي بطبيبك فورًا.

لا يجوز تناول سيمڤاستاتين إذا كنت مرضعةً, لأنه لا يعرف فيما إذا كان الدواء ينتقل لحليب الأم.

يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

السياقة واستعمال الآلات

لا يتوقع أن يؤثر الدواء على قدرة السياقة أو تشغيل الآلات. بالرغم من ذلك, يجب الأخذ بعين الاعتبار أن أشخاص معينون قد يشعروا بدوخة بعد تناول الدواء.

معلومات مهمة حول جزء من مركبات الدواء

يحتوي هذا الدواء على سكر يسمى **لاكتوز**. إذا قيل لك من قبل طبيب بأن لديك عدم تحمل لسكريات معينة, يجب استشارة الطبيب قبل استعمال الدواء.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب دائمًا استعمال الدواء وفقًا لتعليمات الطبيب. عليك التحقق من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا بخصوص الجرعة وطريقة العلاج بالدواء.

الجرعة وطريقة العلاج تحددان من قبل الطبيب فقط. الجرعة الاعتيادية بشكل عام هي: الجرعة الابتدائية الموصى بها هي 10 ملغ أو 20 ملغ مرة في اليوم, في المساء, مع أو من دون طعام.

طريقة التناول:

يجب بلع الدواء مع القليل من الماء.

لا يجوز شطر الحبسولة, حيث أنه لا يوجد خط شطر.

لا تتوفر معلومات بخصوص السحق والمضغ.

بسبب الاختطار الزائد لمشاكل في العضلات, فإن جرعة 80 ملغ هي فقط لمتعالجين يتناولون جرعة 80 ملغ بشكل مزمن (مثل 12 شهرًا فما فوق) من دون ضرر للعضل والذين لا ينبغي عليهم أخذ أدوية معينة سويةً مع سيمڤاستاتين, والتي قد تزيد من احتمالك لتطوير ضرر في العضل.

قد يسجل لك طبيبك جرعات أقل, خاصة إذا كنت تتناول أدوية معينة من تلك التي تظهر أعلاه أو إذا كانت لديك مشاكل معينة في الكلية.

إذا كنت تتناول أيضًا أدوية رابطة للأحماض الصفراوية (أدوية لخفض الكولسترول) مثل كوليستيرامين, عليك تناول سيمڤاستاتين على الأقل ساعتين قبل أو أربع ساعات بعد تناول هذه الأدوية.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة أعلى أو إذا بلع طفل من الدواء عن طريق الخطأ, عليك التوجه فورًا لغرفة الطوارئ في المستشفى وإحضار عبوة الدواء معك.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المخصص, لا يجوز تناول جرعة مضاعفة. خذ الجرعة التالية في الوقت المعتاد واستشر الطبيب.

يجب المداومة على العلاج كما أوصي من قبل الطبيب. حتى لو طرأ تحسن على حالتك الصحية, لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء من دون استشارة طبيبك.

إذا توقفت عن تناول الدواء

استمر بتناول سيمڤاستاتين إلا إذا قال لك الطبيب بأن تتوقف. إذا توقفت عن تناول الدواء, قد يعود مستوى الكولسترول لديك للارتفاع مجددًا.

- **لا يجوز تناول ادوية في الظلام! تحقق من الملصق والجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع نظارات إذا كنت بحاجة إليها.**
- **إذا كانت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء, استشر الطبيب أو الصيدلي.**

4. الأعراض الجانبية

ككل أيّ دواء, قد يسبب استعمال **سيمڤاكسون** أعراضًا جانبيةً لدى جزء من المستخدمين. لا تفزع من قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

أعراض جانبية وخيمة نادرة (rare) (أعراض تظهر لدى 10-1 مستعملين من بين 10,000)

يجب التوقف عن استعمال الدواء والتوجه إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ فورًا إذا ظهرت احدى الأعراض التالية:

- ألم عضلات, حساسية عضلات, وهن عضلات, تقلصات عضلية أو تمزق في العضل (نادر جدًا). في حالات نادرة قد تكون مشاكل العضل هذه وخيمة, يشمل انحلال العضلات الذي يسبب ضررًا للكلية, بل الموت في حالات نادرة جدًا.
- ردود فعل فرط تحسس (أرجية) تشمل:
  - انتفاخ الوجه, اللسان, أو الحلق الذي قد يسبب صعوبة في التنفس (وذمة وعائية).
  - ألم عضلات وخيم, عادةً في الكتفين أو الفخذين (ألم العضلات الروماتيزميّة).
  - طفح مع وهن في الأطراف وفي عضلات الرقبة.
  - طفح الذي قد يظهر في الجلد وتقرحات في الفم (lichenoid drug eruptions) (نادر جدًا).
  - ألم أو التهاب في المفاصل.
- التهاب في الأوعية الدموية (vasculitis).
- كدمات غير عادية, طفح وانتفاخ الجلد (التهاب الجلد والعضل), شرى, حساسية الجلد للشمس, حمّى, تورد.
- ضيق تنفس (dyspnea) وشعور عام سيء.
- حالة تشبه الذئبة (تشمل طفح, مشاكل في المفاصل وتأثير على خلايا الدم).
- التهاب في الكبد المصحوب بالأعراض التالية: اصفرار الجلد والعينين, حكة, بول بلون داكن أو براز بلون فاتح, شعور بالتعب أو الوهن, فقدان الشهية؛ فَشَل كبد مميت وغير مميت (نادر جدًا).
- التهاب في البنكرياس المصحوب بشكل عام بألم بطن وخيم.

أعراض جانبية وخيمة نادرة جدًا (very rare) (أعراض تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10,000):

- رد فعل تحسسي وخيم الذي يؤدي لصعوبات تنفس أو دوخة (تَلَق).
- تثَدِّي الرَّجُل (تضخم الصدر لدى الرجال).

أعراض جانبية نادرة (rare) (أعراض تظهر لدى 1-10مستعملين من بين 10,000):

- تعداد منخفض لخلايا الدم الحمراء (فقر دم).
- اخدرار أو وهن في اليدين والساقين.
- صداع, شعور بالنخر, دوخة.
- رؤية مشوشة, خلل في الرؤية.
- اضطرابات في الجهاز الهضمي (ألم في البطن, إمساك, انتفاخ, صعوبات في الهضم, إسهال, غثيان, تقيؤ).
- طفح, حكة, تساقط الشعر.
- وهن.
- مشاكل في النوم (نادر جدًا).
- ضعف الذاكرة (نادر جدًا), فقدان الذاكرة, ارتباك.

أعراض جانبية شيوعها غير معروف (أعراض لم يُحدّد شيوعها بعد):

- مشاكل في الانتصاب.
- اكتئاب.
- مشاكل في الأوتار, التي قد تتعقد أحيانًا لدرجة تمزق الوتر.
- وهن عضلات ثابت.

سيمڤاكسون 20: حبسولات مطلية بلون بيج مطوّلة, مع الختم "SST" في جهة واحدة و "20" في الجهة الأخرى.

سيمڤاكسون 40: حبسولات مطلية بلون بني مائل للوردي مطوّلة, مع الختم "SST" في جهة واحدة و "40" في الجهة الأخرى.

سيمڤاكسون 80: حبسولات مطلية بلون بني مائل للوردي مطوّلة, مع الختم "SL" في جهة واحدة.

أحجام العبوات المصادق عليها من **سيمڤاكسون 10, 20, 40**: 10, 14, 28, 30 حبسولات.

أحجام العبوات المصادق عليها من **سيمڤاكسون 80**: 7, 10, 14, 28, 30 حبسولات.

قد لا تسوق كافة أحجام العبوات.

قيم نتائج المختبر:

شوهدت ارتفاعات في فحوصات دم معينة لفحص وظائف الكبد وإنزيم العضل (كرياتين كيناز).

إذا ظهر عرض جانبي, إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة, عليك استشارة الطبيب.

يمكن التبليغ عن الأعراض الجانبيّة لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجه إلى الاستمارة الإنترنتية للتبليغ عن الأعراض الجانبيّة, أو عن طريق دخول الرابط:

https://sideeffects.health.gov.il

5. كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (תאריך תפוגה) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين: يجب التخزين دون 25 درجة مئوية.

6. معلومات إضافية

إضافة للمركب الفعّال, يحتوي الدواء أيضًا على:

Lactose monohydrate, starch pregelatinised, microcrystalline cellulose, ascorbic acid, magnesium stearate, citric acid monohydrate, hydroxypropyl cellulose, hypromellose, titanium dioxide (E171), talc, butylhydroxyanisole, iron oxide (red, black, yellow) (E172), carnauba wax.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

سيمڤاكسون 10: حبسولات مطلية بلون وردي فاتح مطوّلة, مع الختم "SST" في جهة واحدة و- "10" في الجهة الأخرى.

سيمڤاكسون 20: حبسولات مطلية بلون بيج مطوّلة, مع الختم "SST" في جهة واحدة و "20" في الجهة الأخرى.

سيمڤاكسون 40: حبسولات مطلية بلون بني مائل للوردي مطوّلة, مع الختم "SST" في جهة واحدة و "40" في الجهة الأخرى.

سيمڤاكسون 80: حبسولات مطلية بلون بني مائل للوردي مطوّلة, مع الختم "SL" في جهة واحدة.

أحجام العبوات المصادق عليها من **سيمڤاكسون 10, 20, 40**: 10, 14, 28, 30 حبسولات.

أحجام العبوات المصادق عليها من **سيمڤاكسون 80**: 7, 10, 14, 28, 30 حبسولات.

قد لا تسوق كافة أحجام العبوات.

المنتج وصاحب التسجيل: دكسل م.ض., شارع دكسل 1, أور عكيڤا 3060000, إسرائيل

إذا ظهر عرض جانبي, إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبيّة أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة, عليك استشارة الطبيب.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

سيمڤاكسون 10 حبسولات: 00 31147 83 132

سيمڤاكسون 20 حبسولات: 00 31148 84 132

سيمڤاكسون 40 حبسولات: 00 31149 85 132

سيمڤاكسون 80 حبسولات: 00 33890 85 151

للتبسيط وتسهيل القراءة, تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. بالرغم من ذلك, الدواء مُخصص لكلا الجنسين.

صاحب التسجيل:

دكسل فارما تكنولوجيا م.ض,

شارع دكسل 1, أور عكيڤا 3060000, إسرائيل

- إذا كنت تعاني من فشل تنفسي وخيم.
- إذا كنت من أصل أسيوي. قد يتطلب الأمر جرعة أخرى لك.
- إذا كنت تتناول أو إذا تناولت خلال الـ-7 أيام الماضية دواء يسمى حمض الفوسيديك (دواء لعلاج العدوى البكتيرية) بإعطاء عن طريق الفم أو بحقنة. إن دمج حمض الفوسيديك مع سيمڤاستاتين قد يؤدي لمشاكل عضلات وخيمة (انحلال الرُّبَيْدات).

اتصل بالطبيب المعالج بشكل فوري إذا كنت تشعر بألم عضلات, حساسية أو وهن عضلات غير مفسّر. هذا لأنه في حالات نادرة, قد تكون مشاكل العضلات وخيمة, يشمل انحلال العضلات الذي يؤدي لضرر للكلية, وفي حالات نادرة جدًا للموت.

ان اختطار حدوث انحلال العضلات أعلى لدى المرضى الذين يتناولون جرعات عالية من السيمڤاستاتين, خاصة جرعة 80 ملغ. بالإضافة, الاختطار لانحلال العضلات أعلى لدى مرضى معينين. تحدث مع طبيبك إذا انطبقت عليك واحدة من الحالات التالية:

- كنت تستهلك كميات كبيرة من الكحول.
- كانت لديك مشاكل في الكلية.
- كانت لديك مشاكل في الغدة الدرقية.
- عمرك 65 سنة أو أكثر.
- كنت امرأة.
- كانت لديك في الماضي مشاكل عضلات خلال العلاج بأدوية لخفض الكولسترول تسمى "ستاتينات" أو "فيبرات".

كان لديك أو لدى أحد أقاربك مرض عضلات وراثي.

كذلك, بلغ الطبيب أو الصيدلي إذا كان لديك وهن عضلات ثابت. قد يتطلب الأمر فحوصات وأدوية إضافية لتشخيص وعلاج هذا الأمر.

فحوصات ومتابعة

قبل بداية استعمال الدواء وخلال فترة العلاج بالدواء إذا كانت لديك أية أعراض لمشاكل كبد, سوف يوجهك الطبيب لفحص دم. هذا من أجل فحص وظائف الكبد لديك.

بعد بدء العلاج بالدواء, قد يتم توجيهك من قبل الطبيب لفحص دم لفحص وظائف الكبد.

إذا كان لديك سكري أو كنت في خطر لتطوير سكري, سوف يقوم طبيبك بمتابعة لصيقة لك. أنت في خطر لتطوير سكري إذا كان لديك مستويات مرتفعة من السكريات والدهنيات في الدم, وزن زائد وضغط دم مرتفع.

تفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تأخذ, أو أخذت في الآونة الأخيرة, أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب ومكملات غذائية, أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

إن تناول سيمڤاستاتين مع أحد الأدوية المسجلة أدناه قد يزيد من الاختطار لمشاكل عضلات (بعضها مذكورة في البند 2 "لا يجوز استعمال الدواء إذا"):

- **إذا كان عليك تناول حمض الفوسيديك بإعطاء عن طريق الفم لعلاج عدوى بكتيرية, سوف يتوجب عليك التوقف مؤقتًا عن العلاج بسيمڤاستاتين. سوف يرشدك الطبيب متى يمكن البدء من جديد بتناول الدواء بشكل آمن. إن تناول سيمڤاستاتين سويةً مع حمض الفوسيديك قد يؤدي, في حالات نادرة, لوهن عضلات, لحساسية عضلات أو لألم عضلات (انحلال الرُّبَيْدات). للمزيد من المعلومات بخصوص انحلال الرُّبَيْدات انظر للبند 4 – "أعراض جانبية".**
- سيكلوسپورين (الذي يعطى في الكثير من الأحيان لمتعالجين بعد زرع عضو).
- دانازول (هرمون اصطناعي يستعمل لعلاج الانتباذ البطانيّ الرَحِميّ, حالة تنمو فيها أجزاء من نسيج بطانة الرحم خارج الرحم).
- أدوية مع مواد فعالة مثل إيتراكونازول, كيتوكونازول, فلوكونازول, پوساكونازول أو ڤوريكونازول (التي تستعمل لعلاج العدوى الفطرية).
- فيبرات مع مواد فعالة مثل جيمفيبروزيل أو بيزافيبرات (تستعمل لخفض الكولسترول).
- إيريثروميسين, كلاريثروميسين, تيليثروميسين (التي تستعمل لعلاج العدوى البكتيرية).
- مثبطات پروتياز HIV مثل: إينديناڤير, نيلفيناڤير, ريتوناڤير أو ساكيناڤير (التي تستعمل لعلاج الـ-HIV).

أدوية مضادة للفيروسات لعلاج التهاب الكبد C مثل بوسيپريڤير, تيلاپريڤير, إيلباسڤير أو چيرازوپريڤير (تستعمل لعلاج العدوى بڤيروس التهاب الكبد C).

- نيفازودون (يستعمل لعلاج الاكتئاب).
- أدوية مع المادة الفعالة كوبيسيستات.
- أميودارون (الذي يستعمل لعلاج نظم القلب الغير منتظم).
- ڤيراپاميل, ديلتيازيم أو أملوديپين (التي تستعمل لعلاج فرط ضغط الدم, ألم في الصدر المتعلق بمرض قلب أو حالات قلبية أخرى).
- لوميتاپيد (دواء يستعمل لعلاج حالة طبية وخيمة ونادرة من الكولسترول الوراثي).
- دابتوميسين (دواء يستعمل لعلاج حالات العدوي المعقدة في الجلد وفي انسجة الجلد ولعلاج تَجَرُثُم الدَّم). قد تكون الأعراض الجانبية التي تؤثر على العضلات أقوى عند تناول هذا الدواء خلال العلاج بسيمڤاستاتين. قد يقرر الطبيب بأن عليك التوقف عن تناول **سيمڤاكسون** بشكل مؤقت.
- كولشيسين (الذي يستعمل لعلاج النقرس).

إضافة للأدوية المفصلة أعلاه, أخبر الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تأخذ أو إذا أخذت مؤخرًا, أدوية أخرى يشمل أدوية بدون وصفة طبيب. بلغ الطبيب خاصة إذا كنت تأخذ دواء واحد من الأدوية التالية:

- أدوية مع مادة فعالة مضادة لتخثر الدم, مثل وارفارين, فينيروكومون أو أسينوكومارول (مضادات التخثر).
- فينوفيبرات (الذي يستعمل كذلك لخفض الكولسترول).
- نياسين (الذي يستعمل كذلك لخفض الكولسترول).
- ريفامپيسين (الذي يستعمل لعلاج السل).
- تيكاچريلور (دواء مضاد للتخثر).

أخبر كل طبيب يسجل لك دواء جديد بأنك تتناول **سيمڤاكسون**.

استعمال الدواء والطعام

يحتوي عصير الچريب فروت على واحد أو اكثر من المركبات التي تؤثر على طريقة تفكيك الجسم لأدوية معينة, بشمل سيمڤاستاتين. **يجب تجنب استهلاك عصير الچريب فروت.**

الحمل والإرضاع

لا تستعملي سيمڤاستاتين إذا كنت حاملاً, تحاولين الدخول في حمل أو تظنين بأنك حامل. إذا حملت خلال العلاج بالدواء, توقفي عن تناوله واتصلي بطبيبك فورًا.

لا يجوز تناول سيمڤاستاتين إذا كنت مرضعةً, لأنه لا يعرف فيما إذا كان الدواء ينتقل لحليب الأم.

يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء:

قبل العلاج بسيمڤاكسون, أخبر الطبيب:

- عن كافة مشاكلك الطبيّة بشمل حساسيّات.
- إذا كنت تشرب كميات كبيرة من الكحول.
- إذا عانيت في الماضي من مرض كبد. قد يكون العلاج بالدواء غير ملائم لك.
- إذا كنت على وشك الخضوع لعملية جراحية. قد تكون هناك حاجة للتوقف عن تناول الدواء لفترة قصيرة.