

היקומיציין®

משחת עור

הרכב

הידרוקורטיזון	2.5%
נאומיציין סולפאט	0.5%

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים ראה פרק 2 תחת סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 - "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

לטיפול בדלקות זיהומיות של העור.

קבוצת תרופיטי

הידרוקורטיזון: קורטיקוסטרואיד
נאומיציין סולפאט: אנטיביוטיקה מקבוצת האמינוגליקוזידים

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- ידועה לך רגישות לאחד ממרכיביה או לתרופות אחרות משפחת האמינוגליקוזידים.
- אתה סובל מזיהומים פטרייתיים, משחפת העור, משלבת פשוטה (הרפס סימפלקס) או מאבעבועות רוח.
- כמו עם כל התכשירים לשימוש חיצוני המכילים נאומיציין, אין להשתמש בתרופה זו בדלקת האוזן החיצונית אם קיים נקב בעור התוף.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

אין להשתמש בתכשיר למטרה שונה מזו שלשמה נרשם. אין להשתמש בתרופה זו על שטחי עור נרחבים או פצעים פתוחים, אלא על פי הוראה מפורשת מהרופא. אין לתת לתכשיר לבוא במגע עם עיניים. במקרה של מגע יש לשתוף מיד עם מים.

לפני הטיפול בהיקומיציין, ספר לרופא אם:

- את בהיריון או מניקה
- אתה סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד מערכת החיסון, מסכרת, מבעיות בכליה, מסחרחורת, מבעיות שמיעה או מאובדן שמיעה, מצלצולים באזניים

ילדים ומתבגרים

זהירות מיוחדת נדרשת בשימוש בילדים ובמתבגרים. השימוש בגילאים אלה חייב להיות מלווה במעקב רפואי.

תגובות בין-תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות, כולל תרופות לזיכרון, מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

היריון והנקה

אם את בהיריון או מניקה, יש להתייעץ עם הרופא לפני התחלת הטיפול.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

התרופה מכילה את המרכיב לנולין (Lanolin anhydrous) אשר עלול לגרום לגירוי בעור (למשל דלקת עור ממגע).

התרופה מכילה את המרכיב מתיל פרבן (Methyl E218) (p-hydroxybenzozate), העלול לגרום לתגובות אלרגיות (ייתכן שמאוחרות).

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא.

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע לימינון ולאופן הטיפול בתכשיר.

- הימינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.
- אם לא חל שיפור במצבך תוך שבוע ימים או אם חלה הרעה במצב, יש לפנות לרופא שנית.

אין לטפל בתכשיר בתינוקות ובילדים מתחת לגיל 4 שנים יותר מ-3 שבועות, במיוחד באזורים המכוסים על ידי חיתולים.

• במידה הולך והתווה על ידי הרופא יש להימנע מחבישה אוטמת באזור הנגוע. (חיתולים מפילטיק מהווים חבישה אוטמת).
יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קצובים כפי שנקבע על-ידי הרופא המטפל.

אין לעבור על המנה המומלצת.

צורת השימוש

אין לבלוע, לשימוש חיצוני בלבד.

יש להימנע ממגע עם עיניים או עם רקמות ריריות (כגון בפה ובאף) (ראה אזהרות בפרק 2).

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בודק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש במשחת היקומיציין עלול לגרום לתופעות לוואי. אל תיבהל במקרה רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את הטיפול ולפנות לרופא מייד אם מופיעה אחת מתופעות הלוואי הבאות:

- גירוי, פריחה או דלקת מקומיים (שלא היו קיימים לפני השימוש בתכשיר)
- התנפחות הפנים, השפתיים, הלשון או חלקים אחרים בגוף
- קוצר או קשיי נשימה, צצופים (נדיר)

תופעות לוואי נוספות שעלולות להופיע

אדמומיות, נפיחות, יובש, הרגשת חום מקומית ועקצוץ, כשלון ריפוי.

תופעות אלו חולפות בדרך כלל תוך זמן קצר לאחר תקופת ההסתגלות לתכשיר. אולם אם התופעות האלו מתמשכות ו/או מטרידות, יש לפנות לרופא.

טיפול חוזר בתכשיר למשך זמן ארוך עלול לגרום לשינויים במציחת השיער ובצבע העור, הופעת סימני מתיחה על העור והבלטת ורידים, החמרה של זיהומים. במקרים אלו, הפסק הטיפול ופנה לרופא מיד.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על-ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן תרופה זו במקום יבש, מתחת ל-25°C.**
- אין להשליך תרופות לביוב או לפסולת הביתית. שאל את הרוקח איך להשליך תרופות שאינן בשימוש עוד. אמצעים אלה יסייעו בהגנה על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיבים הפעילים התרופה מכילה גם:

White petrolatum, Mineral oil, Lanolin anhydrous, Paraffin hard, Super harlotan woolwax alcohols, Methylparaben, Butylparaben.

כיצד נראית התרופה ומה התוכן האריזה

בכל אריזה שפופרת המכילה 15 גרם משחה בצבע לבן-צהבהב.

שם בעל הרישום והיצרן וכתובות

טבע ישראל בע"מ,
רח' דבורה הנביאה 124, תל אביב 6944020

עלון זה נערך ביוני 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 051-45-24387

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.