

هيكوميسين

مرهم للجلد

التركيبية

هيدروكورتيزون	2.5%
نيوميسين سولفات	0.5%

للحصول على معلومات عن المركبات غير الفعالة ومسببات الأرجية انظر الفصل 2 تحت البند "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفصل 6 - "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

لقد وُصف هذا الدواء من أجل علاجك. لا تعطه للآخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

لعلاج التهابات الجلد التلوثية.

الفصلية العلاجية

هيدروكورتيزون: كورتيكوستيرويد

نيوميسين سولفات: مضاد حيوي من فصيلة الأمينوجليكوزيدات

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- علمت بوجود حساسية لأحد مركباته أو لأدوية أخرى من فصيلة الأمينوجليكوزيدات.
- كنت تعاني من تئثرات فطرية، سل جلدي، حلا بسيط (هريس سيمبليكس) أو جندي الماء.
- كما هو الحال مع جميع المستحضرات المخصصة للاستعمال الخارجي والتي تحتوي على نيوميسين، فإنه لا يجوز استعمال هذا الدواء لالتهاب الأذن الخارجية إذا وُجد ثقب في طبلة الأذن.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

لا يجوز استعمال المستحضر لهدف آخر غير الذي وُصف له. لا يجوز استعمال هذا الدواء على مساحات جلدية واسعة أو على جروح مفتوحة، إلا بموجب أمر واضح من الطبيب. لا يجوز إتاحة ملامسة المستحضر للعينين. في حالة الملامسة، يجب الشطف فوراً بالماء.

قبل العلاج بهيكوميسين، أخبر الطبيب إذا:

- كنت حاملاً أو مرضعاً
- كنت تعاني الآن أو عانيت في الماضي من خلل في وظيفة الجهاز المناعي، من سكري، من مشاكل في الكلية، من دوار، من مشاكل في السمع أو فقدان السمع، من طنين في الأذنين

الأولاد والمرافقون

الاستعمال لدى الأولاد والمرافقين يستلزم حذراً خاصاً. يجب أن يكون الاستعمال في هذه الأعمار مصحوباً بمتابعة طبية.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل الأن، أو قد استعملت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملاً أو مرضعاً، فيجب استشارة الطبيب قبل البدء بالعلاج.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي الدواء على المركب لانولين (Lanolin anhydrous) الذي قد يسبب تهيجاً جلدياً (مثلاً التهاب الجلد التماسي).

يحتوي الدواء على المركب ميثيل بارابين (Methyl (p-hydroxybenzoate) (E218)، الذي قد يسبب ردود فعل تحسسية (قد تكون متأخرة).

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دوماً وفق تعليمات الطبيب.

عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية وكيفية العلاج سيحددهما الطبيب فقط.

• إذا لم يطرأ تحسن على حالتك خلال أسبوع، أو إذا ازدادت الحالة سوءاً فيجب مراجعة الطبيب مجدداً.

• لا يجوز علاج الأطفال الرضع والأولاد الذين عمرهم أقل من 4 سنوات بالمستحضر لأكثر من 3 أسابيع، خاصةً في المناطق المغطاة بالحفاظات.

• إذا لم يُشتر الطبيب إلى ذلك فيجب الامتناع عن استعمال ضمادة محكمة الإغلاق (سادة) في المنطقة المصابة. (تعتبر الحفاظات البلاستيكية ضمادة محكمة الإغلاق).

يجب استعمال هذا الدواء في أوقات منتظمة، كما حدّد من قبل الطبيب المعالج. يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

طريقة الاستعمال

لا يجوز البلع، للاستعمال الخارجي فقط.

يجب الامتناع عن ملامسته للعينين أو الأنسجة المخاطية (مثلاً في الفم والأنف) (انظر التحذيرات في الفصل 2).

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء خطأً، فتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

حتى لو طرأ تحسن على حالتك الصحية، فلا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواءً. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال مرهم هيكوميسين إلى نشوء أعراض جانبية. لا تتلق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

يجب إيقاف العلاج والتوجه فوراً إلى الطبيب إذا ظهر أحد الأعراض الجانبية التالية:

- تهيج، طفح جلدي أو التهاب بشكل موضعي (والتي لم تكن موجودة قبل استعمال المستحضر)
- انتفاخ الوجه، الشفتين، اللسان أو أجزاء أخرى من الجسم
- ضيق أو صعوبات في التنفس، أزيز (نادر)

أعراض جانبية إضافية من شأنها أن تظهر

احمرار، انتفاخ، جفاف، شعور بالحرارة الموضعية والوخز، فشل في التعافي. تزول هذه الأعراض عادةً خلال مدة قصيرة بعد فترة التكيف للمستحضر.

لكن إذا استمرت هذه الأعراض وأو كانت مزعجة، فيجب مراجعة الطبيب.

قد يسبب العلاج المتكرر بالمستحضر لفترة زمنية طويلة تغيرات في نمو الشعر وفي لون الجلد، ظهور علامات شد على الجلد وبروز الأوردة، تقلم التئوالت. في هذه الحالات، أوقف العلاج وتوجه فوراً إلى الطبيب.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي لم يُذكر في هذه النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأعراض الجانبية

بإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.au)، والذي يوجه إلى الاستشارة المتصلة بالتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.au>

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

- امنع التسمم! هذا الدواء، وكل دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأولاد وأول الأطفال الرضع ومجال رؤيتهم، وبذلك ستمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) المدوّن على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.
- يجب تخزين هذا الدواء في مكان جاف، فيما دون 25°C.
- لا يجوز إلقاء الأدوية في الصرف الصحي أو النفايات البيئية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد قيد الاستعمال. هذه الوسائل ستساهم في حماية البيئة.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركبين الفعالين، يحتوي الدواء أيضاً على:

White petrolatum, Mineral oil, Lanolin anhydrous, Paraffin hard, Super harlotan woolwax alcohols, Methylparaben, Butylparaben.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة

في كل عبوة توجد أنبوبة تحتوي على 15 غراماً من المرهم ذي اللون الأبيض الضارب إلى الصفرة.

اسم صاحب الامتياز والمصنّع وعنوانه

تُبع إسرائيل م.ض،

شارع دفور هانيشيه 124، تل أبيب 6944020

تم تحرير هذه النشرة في حزيران/يونيو 2022 وفقاً لإرشادات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجلّ الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 051-45-24387

من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.