

تريتايس 1.25 ملغ



تريتايس 2.5 ملغ



تريتايس 5 ملغ



SANOFI

أقراص

المادة الفعالة:

كل قرص من تريتايس 1.25 ملغ يحتوي على:

رامبيرييل 1.25 ملغ

كل قرص من تريتايس 2.5 ملغ يحتوي على:

رامبيرييل 2.5 ملغ

كل قرص من تريتايس 5 ملغ يحتوي على:

رامبيرييل 5 ملغ

المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر: أنظر الفقرة 6.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. وصف هذا الدواء من أجله. لا تعطيه للأطفال. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

الدواء مخصص لمعالجة فرط ضغط الدم، لتقليل الخطورة لحدوث نوبة قلبية أو سكتة، لتقليل الخطورة أو لإعاقة تفاقم مشاكل في الكلية (لدى متعاطي مع أو بدون مرض السكري)، لعلاج قصور القلب، للعلاج بعد نوبة قلبية مشتركة مع قصور قلبي. **الفصيلة العلاجية:** خافض لضغط الدم، من فصيلة مثبطات ACE.

2) قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء:

- * إذا وجدت لديك حساسية مفرطة لرامبيرييل أو لمستحضر آخر من فصيلة مثبطات ACE أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6)، علامات لرد فعل تحسسي يمكن أن تشمل: طفح جلدي، صعوبات في البلع أو في التنفس، إنفاخ في الشفتين، في الوجه، في الحنجرة أو اللسان.
- * إذا عانيت في الماضي من رد فعل تحسسي خطير المسمى وذمة وعائية، حيث أن علاماته تشمل: وخز، شرى (urticaria)، بقع حمراء على الديدن، راحتي القدمين والرقبة؛ إنفاخ في الحنجرة واللسان، إنفاخ حول العينين والشفتين، صعوبات في التنفس والبلع.
- * إذا تناولت في الماضي أو كنت تتناول حالياً ساكوبيترييل/فالسارتان، دواء يُستعمل لعلاج نوع من القصور القلبي المزمن لدى الكبار.
- * إذا كنت تجري ديلزة أو لفترة للدم من نوع آخر. من الجائز ألا يكون تريتايس مناسب لك، وذلك مرتبط بنوع الآلة المستعملة.
- * إذا كنت تعاني من مشكلة في الكلية حيث يقل فيها تزويد الكلية بالدم - Renal artery stenosis.
- * خلال الأشهر الستة الأخيرة من الحمل (أنظري فقرة «الحمل، الإرضاع والخصوبة»).
- * إذا كنت تعاني من ضغط دم منخفض أو غير مستقر. يتم هذا التقييم من قبل الطبيب.
- * إذا كنت تعاني من السكري أو من خلل في الأداء الوظيفي الكلوي وتعالج بدواء لخفض ضغط الدم يحتوي على اليوسكيزين.
- لا تتناول تريتايس إذا كان ما ذكر أعلاه ينطبق عليك. في حالة الشك، استشر الطبيب قبل تناول تريتايس.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

قبل العلاج بالدواء، احك للطبيب إذا:

- كنت تعاني من مشاكل في القلب، في الكبد أو في الكلية.
- كنت تعاني من فقدان للكثير من الأملاح أو السوائل (نتيجة تقيؤ، إسهال، زيادة التعرق، حمية فقيرة بالأملاح، تناول الأدوية المدرة للبول لفترة مطوّلة أو إذا اجتذرت ديلزة).
- كنت مقدماً على إجراء علاج لتقليل الحساسية للسعات النحل أو الدبابير (إزالة التحسس).
- كنت مقدماً على تلقي مواد تخدير خلال عملية جراحية أو علاج في الأسنان. من الجائز أن تحتاج للتوقف عن العلاج بـ تريتايس يوماً واحداً مسبقاً؛ استشر الطبيب.
- نسبة اليوتاسيوم في دمك عالية (حسب نتائج فحص الدم).
- كنت تتناول أدوية قد تؤدي إلى خفض نسبة الصوديوم في دمك أو تعاني من حالة طبية قد تؤدي إلى خفض نسبة الصوديوم في دمك. من شأن طبيبك أن يوجهك لإجراء فحوص دورية لنسب الصوديوم في دمك، خاصة إذا كنت مسناً.
- كنت تتناول أدوية التي قد تزيد من خطورة حدوث رد فعل تحسسي خطير يُسمى وذمة وعائية، مثل مثبطات mTOR (مثلاً: تيمسيروليموس، إيفيروليموس، سيروليموس)، فيلداجليبتين، مثبطات نيبيريليسين (NEP inhibitors). مثل: راسيكادوترييل أو ساكوبيترييل/فالسارتان. بالنسبة لـ ساكوبيترييل/فالسارتان أنظر أيضاً الفقرة «لا يجوز استعمال الدواء».
- كنت تعاني من أمراض النسيج الضام مثل تصلب الجلد أو الذئبة (systemic lupus erythematosus).
- عليك إبلاغ طبيبك إذا كنت تعتقدن بأنك حامل أو من شأنك أن تصبحي حاملاً. تريتايس غير موصى به في الأشهر الـ 3 الأولى من الحمل وقد يسبب ضرراً جدياً للجنين بعد الشهر الثالث (أنظري فقرة «الحمل، الإرضاع والخصوبة»).
- كنت تتناول إحدى الأدوية التالية التي تستعمل لخفض ضغط الدم:
 - أدوية مثبطة لمستقبل أنجيوتنسين II (Angiotensin-II receptor blockers)، المعروفة أيضاً بـ sartans. مثلاً: فالسارتان، تيلميسارتان، إيربيسارتان، خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى تتعلق بالسكري.
 - اليوسكيزين.

من شأن طبيبك أن يجري فحوصات دورية للأداء الوظيفي الكلوي، لضغط الدم ولنسب الأملاح في دمك (اليوتاسيوم مثلاً). أنظر أيضاً فقرة «لا يجوز استعمال الدواء».

الأطفال والمراهقون:

لا يوصى باستعمال تريتايس لدى أطفال ولدى مراهقين دون عمر 18 سنة، لأن نجاعة وسلامة تريتايس لدى الأطفال لم تحدد بعد.

إذا كان ما ذكر أعلاه ينطبق عليك (أو في حالة الشك)، الرجاء استشر الطبيب قبل تناول تريتايس.

التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، احك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. ذلك لأن تريتايس قد يؤثر على عمل أدوية أخرى وأيضاً أدوية أخرى قد تؤثر على عمل تريتايس. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي خاصة إذا كنت تتناول:

إن مشاركة الدواء مع الأدوية التالية قد يؤدي إلى تقليل نجاعة تريتايس:

- أدوية لتخفيف الألم والالتهاب (مثلاً NSAIDs مثل إيبوبروفن أو إيندوميثاسين وأسبيرين)

- أدوية لعلاج ضغط الدم المنخفض، الصدمة، قصور القلب، الربو أو التحسس مثل إيفيدرين، نورأدرينالين أو أدريالين. على الطبيب متابعة ضغط دمك بحرص.

إن مشاركة الدواء مع الأدوية التالية قد يسبب زيادة احتمال حدوث أعراض جانبية:

- ساكوبيترييل/فالسارتان - دواء لعلاج نوع من القصور القلبي المزمن لدى الكبار (أنظر أيضاً الفقرة «لا يجوز استعمال الدواء»)

- أدوية لتخفيف الألم والالتهاب (مثلاً NSAIDs مثل إيبوبروفن أو إيندوميثاسين وأسبيرين)

- أدوية لمعالجة السرطان (أدوية كيميائية)

- أدوية لمنع رفض نسيج مزروع مثل سيكلوسبورين

- أدوية مدرة للبول مثل فوروسيميد

- أدوية التي يمكنها أن تزيد نسبة اليوتاسيوم في الدم مثل سبيرونولاكتون، تريامتيرين، أميلوريد، أملاح اليوتاسيوم، تريمتوبريم لوحده أو بمشاركة سولفاميتوكسازول (للتلوثات) وهيبارين (لتمميم الدم)

- ستيرويدات لعلاج الالتهاب مثل بريدنيزولون

- ألوپورينول (لتقليل نسبة حمض البول في الدم)

- بروكايناميد (لعلاج مشاكل نظم القلب)

- تيمسيروليموس (لعلاج السرطان)

- سيروليموس، إيفيروليموس (لمنع رفض عضو مزروع)

- فيلداجليبتين (لعلاج السكري من نوع 2)

- راسيكادوترييل (مضاد للإسهال)

من الجائز أن يسيطر الطبيب على تغيير جرعتك الدوائية و/أو يتخذ وسائل حذر أخرى إذا كنت تتناول أدوية مثبطة لمستقبل أنجيوتنسين II (ARB) أو اليوسكيزين (أنظر أيضاً الفقرتين «لا يجوز استعمال الدواء» و «تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء»).

إن المشاركة مع الأدوية التالية قد يؤثر على فعاليتها:

- أدوية السكري مثل الأدوية التي تعطى عن طريق الفم لتخفيض السكر والإنسولين. قد يقلل تريتايس نسبة السكر في دمك، يجب مراقبة نسبة السكر في الدم بدقة أثناء تناول تريتايس.

- ليتيوم (الذي يعطى لعلاج المشاكل النفسية). قد يؤدي تريتايس إلى زيادة نسبة الليتيوم في الدم. على الطبيب مراقبة نسبة الليتيوم بدقة أثناء تناول تريتايس.

إذا كان ما ذكر أعلاه ينطبق عليك (أو في حالة الشك)، الرجاء استشر الطبيب قبل تناول تريتايس.

استعمال الدواء والطعام:

يمكن تناول الدواء مع الطعام أو بدونه.

● استعمال الدواء وإستهلاك الكحول:

● إن شرب الكحول أثناء العلاج بـ تريتايس قد يسبب الدوار. استشر طبيبك حول إمكانية شرب الكحول أثناء العلاج بـ تريتايس، نظراً لأن الكحول يمكن أيضاً أن يكون له تأثير إضافي على خفض ضغط الدم.

الحمل، الإرضاع والخصوبة:

الحمل

عليك إبلاغ طبيبك إذا كنت تعتقدن بأنك حامل أو من شأنك أن تصبحي حاملاً. تريتايس غير موصى به خلال الـ 12 أسبوعاً الأولى للحمل ويُمنع بتاتاً استعماله ابتداء من الأسبوع الـ 13، لأن استعماله خلال فترة الحمل قد يلحق الضرر بالجنين. إذا أصبحت حاملاً خلال علاجك بـ تريتايس، احكي لطبيبك فوراً. من الجائز أن يقرر الطبيب استعمال علاجاً بديلاً آمناً للإستعمال خلال الحمل. إذا تطلب الأمر، فإن الإنتقال إلى علاج بديل مناسب يجب أن يتم قبل حمل مخطط له.

الإرضاع

قبل أن تتلقي تريتايس، احكي لطبيبك إذا كنت مرضعة أو تخططين للإرضاع نظراً لتوفر معلومات محدودة بخصوص استعمال تريتايس خلال فترة الرضاعة. لا يوصى باستعمال تريتايس خلال فترة الرضاعة.

السياقة وإستعمال المركبات:

قد تشعر بدوار أثناء تناول تريتايس. من المحتمل أكثر حدوث هذا الأمر عند بدء العلاج أو عند زيادة الجرعة الدوائية. إذا حدث هذا فلا يجوز لك السياقة أو تشغيل ماكينات.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي هذا المستحضر على أقل من 1 ميليوم (23 ملغ) صوديوم في القرص، أي يعتبر "خالٍ من الصوديوم".

3) كيفية استعمال الدواء؟

يجب دائماً استعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن وثاقاً بخصوص الجرعة الدوائية وطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

المرضى المسنون

قد يخفف طبيبك الجرعة الدوائية الإبتدائية ويقوم بملاءمة الجرعة الدوائية بشكل أبطأ. لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

طريقة تناول

- يجب تناول الدواء في ساعة محددة كل يوم.
- يجب بلع القرص بشكله الكامل مع سائل.
- لا يجوز مضغ أو سحق القرص.
- بالإمكان شطر أقراص تريتايس 2.5 ملغ و تريتايس 5 ملغ وفقاً لخط الشطر إلى نصفين متساويين وتناول نصف جرعة دوائية عند الحاجة.
- بأقراص تريتايس 1.25 ملغ، فإن خط الشطر حُصص لتسهيل الكسر قبل البلع، وليس للتقسيم إلى نصفين متساويين.

إذا تناولت جرعة دوائية أكبر أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء:

توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك، كي يعرف الطبيب ماذا تناولت. لا تقوم بالسياقة بنفسك، اطلب من شخص آخر نقلك أو إستدع الإسعاف.

إذا نسيت تناول الدواء:

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الموعد المُخصص فقم بتناول الجرعة الدوائية التالية في الموعد المُخصص التالي واستشر الطبيب. لا يجوز تناول جرعة دوائية مضاعفة كتعويض عن الجرعة الدوائية المنسية.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز تناول أوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظرات الطبية إذا لزم الأمر ذلك. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية بخصوص استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن استعمال تريتايس قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا تندهم من قائمة الأعراض الجانبية من الجائز ألا تعاني أياً منها.

توقف عن العلاج بـ تريتايس وراجع الطبيب فوراً إذا كنت تشعر بإحدى الأعراض الجانبية الشديدة التالية - من الجائز أن تحتاج لعلاج طبي مستعجل.

- إنتفاخ في الوجه، في الشفتين أو في الحنجرة الذي يؤدي إلى صعوبات في البلع أو التنفس، وكذلك وخز وطفح - هذه الأمور يمكن أن تكون علامات لرد فعل تحسسي شديد لـ تريتايس.
- رد فعل جلدي شديد يشمل طفح، تقرحات في الفم، تفاعم مرض جلدي قائم، إحمراء، حويصلات أو إنسلاخ الجلد (مثل متلازمة ستيفنس - جونسون Stevens Johnson، إنحلال البشرة الخري السمي toxic epidermal necrolysis أو الحماض متعددة الأشكال erythema multiforme).

بلغ الطبيب فوراً إذا كنت تشعر بإحدى الأعراض الجانبية التالية:

- تزايد نظم القلب، ضربات قلب شديدة أو غير منتظمة (palpitations)، ألم في الصدر، ضغط في الصدر أو مشكلة أخطر مثل نوبة قلبية أو سكتة.
- ضيق تنفس أو سعال - هذه الأمور يمكن أن تكون علامات لمشكلة في الرئتين.
- ظهور علامات رض بسهولة أكثر، نزف لفترة زمنية أطول من المعتاد، أي علامة لنزف (نزف من اللثة مثلاً)، نقاط بنفسجية، بقع على الجلد أو ظهور تلوّثات بسهولة مقارنة بالوضع الإعتيادي، ألم في الحنجرة وسخونة، الشعور بالتعب، إغماء، دوار أو لون جلد شاحب - هذه الأمور يمكن أن تكون علامات لمشاكل في الدم أو في نخاع العظمي.
- ألم شديد في البطن يمكن أن يمتد إلى الظهر - يمكن أن يكون علامة لإلتهاب البنكرياس.
- سخونة، قشعريرة، إرقاق، فقدان الشهية للطعام، ألم في البطن، غثيان، إصفرار الجلد أو العينين (يرقان) - يمكن أن تكون هذه علامات لمشاكل في الكبد مثل إلتهاب في الكبد أو إصابة في الكبد.

أعراض جانبية إضافية تشمل:

الرجاء إبلاغ طبيبك فيما إذا تفاعمت إحدى الأعراض الجانبية المذكورة أدناه أو إذا استمرت أكثر من عدة أيام.

أعراض شائعة (تظهر لدى حتى مستعمل 1 من بين 10)

- صداع أو الشعور بإرهاق
- الشعور بدوار - من المحتمل أن يظهر عند بدء العلاج بـ تريتايس أو عند زيادة الجرعة الدوائية لـ تريتايس
- إغماء، ضغط دم منخفض بشكل شاذ، خاصة عند الوقوف أو الجلوس بسرعة
- سعال جاف، إلتهاب الجيوب الأنفية أو إلتهاب القصبات الهوائية، ضيق في التنفس
- ألم في البطن أو في الأمعاء، إسهال، صعوبات هضمية، غثيان وتقيؤات
- طفح جلدي يتراقف أو لا يتراقف بآماكن باردة
- ألم في الصدر
- تقلص أو ألم عضلي
- نتائج فحوص دم تبدي نسبة أعلى من المعتاد لليوتاسيوم.

أعراض غير شائعة (تظهر لدى حتى مستعمل 1 من بين 100)

- مشاكل في التوازن (فيرتيغو)
- حكة وأحاسيس غير اعتيادية في الجلد مثل خدران، وخز، نخذ، حرق أو تمل على الجلد (paraesthesia)
- فقدان أو تغير في حاسة المذاق
- مشاكل في النوم
- الشعور بإكتئاب، قلق، عصبية زائدة عن المعتاد أو عدم الإرتياح
- أنف مسدود، صعوبات تنفسية أو تفاعم الربو
- إنتفاخ في الأمعاء (intestinal angioedema) يتمثل بألم في البطن، تقيؤ أو إسهال
- حرقان، إمساك أو جفاف في الفم
- تبول زائد عن المعتاد
- تعرق زائد عن المعتاد
- إنخفاض أو فقدان الشهية للطعام
- زيادة أو تغير في نظم القلب
- إنتفاخ في الذراعين وفي الرجلين - يمكن أن يكون علامة لتراكم السوائل في الجسم أكثر من المعتاد
- تورّد الوجه
- تشوّش الرؤية
- آلام في المفاصل
- سخونة

عجز جنسي لدى الرجال، تدني الرغبة الجنسية لدى الرجال أو النساء

- زيادة خلايا دم بيضاء معينة (eosinophilia) - شوهدت في فحوص الدم
- نتائج فحوص دم التي تدل على تغيّر في وظيفة الكبد، البنكرياس أو الكلى.

أعراض نادرة (تظهر لدى حتى مستعمل 1 من بين 1,000)

- شعور بقلّة الثبات أو إرتباك
- إحمراء وإنتفاخ اللسان
- تقشر شديد للجلد، وخز، طفح على شكل كتل
- مشاكل في الأظافر (مثلاً تحرر أو إنفصال الظفر من قاعدته)
- طفح أو كدمات في الجلد
- بقع في الجلد وشعور ببرودة الأطراف
- في العينين - إحمراء، وخز، إنتفاخ أو تدمع
- إضطرابات في السمع وطنين في الأذنين
- شعور بضعف عام
- نتائج فحوص دم تبدي إنخفاضاً في عدد خلايا الدم الحمراء، خلايا الدم البيضاء أو الصفيحات الدموية أو كمية الهيموغلوبين.

أعراض نادرة جداً (تظهر لدى حتى مستعمل 1 من بين 10,000)

- حساسية زائدة لضوء الشمس.

أعراض جانبية إضافية بلّغ عنها:

الرجاء إبلاغ طبيبك في حال تفاعمت إحدى الأعراض المذكورة أدناه أو إذا استمرت أكثر من عدة أيام:

- صعوبات في التركيز
- إنتفاخ في الفم
- نتائج فحوص دم تبدي قلّة خلايا الدم في دمك

- نتائج فحوص دم تبدي نسبة أقل من المعتاد للبوديوم في دمك
- بول مُركّز (ذو لون داكن)، غثيان أو تقيؤات، تقلصات عضلية، إرتباك وإختلاجات، التي يمكن أن تكون نتيجة إضطراب في إفراز الهرمون الذي ينظم إفراز البول (ADH). إذا كنت تشعر بتلك الأعراض، راجع الطبيب بأسرع ما يمكن
- تغير لون أصابع اليدين والرجلين عندما تشعر بالبرد ومن ثم الشعور بالوخز أو الألم عندما تشعر بالدفء (عرض يُسمى Raynaud's phenomenon)
- تضخم الثديين لدى الرجال
- بقاء أو تغيّر في الإستجابات
- شعور بحرق
- تغيّر في روائح أشياء
- نساظ الشعر.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاعمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبلغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العبوة/لويحة (بليستر). يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين:

يجب التخزين بدرجة حرارة لا تزيد عن 25 درجة مئوية.

6) معلومات إضافية

بالإضافة للمادة الفعالة، تريتايس 1.25 ملغ، تريتايس 2.5 ملغ، تريتايس 5 ملغ يحتوي أيضاً على:

1.25 mg: Pregelatinized starch, microcrystalline cellulose, sodium stearyl fumarate, hydroxypropyl methylcellulose.

2.5 mg: Pregelatinized starch, microcrystalline cellulose, sodium stearyl fumarate, hydroxypropyl methylcellulose, yellow ferric oxide.

5 mg: Microcrystalline cellulose, pregelatinized starch, hydroxypropyl methyl cellulose, sodium stearyl fumarate, red ferric oxide.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

الأقراص معبأة ضمن عبوة لويحة (بليستر).

أقراص تريتايس 1.25 ملغ هي بلون أبيض أو تقريباً أبيض، مطاولة، مع وجود خط للشرط. طبع على أحد جانبيها «1.25» وشعار، وعلى جانبيها الثاني طبع «HMN» و - «1.25». خصص خط الشرط لتسهيل كسر القرص قبل البلع، وليس لتقسيمه لأنصاف متساوية.

أقراص تريتايس 2.5 ملغ هي بلون مائل إلى الأصفر أو أصفر، مطاولة، مع وجود خط للشرط. طبع على أحد جانبيها «2.5» وشعار، وعلى جانبيها الثاني طبع «HMR» و - «2.5». يمكن تقسيم القرص لأنصاف متساوية.

أقراص تريتايس 5 ملغ هي بلون زهري، مطاولة، مع وجود خط للشرط. طبع على أحد جانبيها «5» وشعار، وعلى جانبيها الثاني طبع «HMP» و - «5». يمكن تقسيم القرص لأنصاف متساوية.

كافة العبوات معبأة ضمن لويحات (بليستر) من PVC/Aluminum ذات 20، 28 أو 50 قرصاً.

ليست كافة أحجام العبوة مسوّقة.

لا تحتوي هذه النشرة على كافة المعلومات عن المستحضر. إذا توفّر لديك أي سؤال أو إذا لم تكن واثقاً من أمر ما، الرجاء توجّه للطبيب.

صاحب الإمتياز والمستورد وعنوانه: سانوفي - أفنتيس إسرائيل م.ض،

شارع بني جايون 10 ص.ب. 8090، نتانيا 4250499.

تم إعدادها في آب 2021 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

تريتايس 1.25 ملغ: 1245930412

تريتايس 2.5 ملغ: 1246030413

تريتايس 5 ملغ: 1246130414

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.