

התרופה משוקת ללא מרשם רופא

דקסמול®, קפליות, 500 מ"ג

- ליקוי בתפקוד המליה
- אלכוהוליזם
- צהבת
- אם את בהריון או מניקה

לל קפליה מכליה פראצטמול (Paracetamol) 500 מ"ג חומר בלתי פעילם ואלרגיים בתרופה - 800 מ"ג מידע נוסף" ובסעיף 2 מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה.

גבולות התרופות

אם אתה לוקה, או אם לקחת לאחרונה, תרופות תוספת כולל תרופות לרופא או מרשם תרופות, תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקה:

- תרופות נגד קרישת דם כגון ורפארין.
- תכשירים המזרזים ייצור אמינים כבכד (לדוגמה: ריפמציין, ברביטורטם).
- תרופות אינופלטיס - פניטואין, קרבמזין.
- תכשירים נגדי דלקת שאינם סטרואידים.
- מטרקולופראמיד או דומפרדון (לטיפול בכיילה, הקאה גבועות עיכול נוספות).
- כלורמפיקול (אנטיביוטיקה).
- פרובנצייד (טיפול בידורן).
- קולטיאמיין (להפחתת יתר שומני הדם).

שימוש בתרופה וזריכת אלכוהול

אין לצרוך אלכוהול בזמן הטיפול בפרצטמול בגלל עלייה בסיכון לנדק לכבד.

הריון והנקה

אם את בהריון או מניקה יש להתייעץ ברופא לפני התחלת השימוש בתרופה. יש ליטול את המנה המומלצת ביותר היעילה עבורך לשיכון הכאב ו/או החרדה, לומר למשך הזמן הקצר ביותר האפשרי. הוועיץ ברופא אם את הקלה בכאב או בחום או אם את צריכה ליטול את התרופה לעיתים תכופות יותר.

תקנה
כמות קטנת של פראצטמול. עברות וחלב אם. יש להוועיץ ברופא.

הגיהה שימוש במכוונת
פראצטמול אינו משפיע על היכולת לנהוג או להפעיל מכוונת.

שימוש בילדים

תרופה זו מועדפת למבוגרים ולילדים מעל גיל 6 שנים, ראה סעיף 3. על ההורים לדווח לרופא המפיע על כל תופעות הלוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

תרופה זו מכילה sunset yellow (E110), FCF aluminum lake (E110), העלול לגרום לתגובות אלרגיות. תרופה זו מכילה פחות מ-1 מיליומול (23 מ"ג) נתרן לקפלייה, כלומר היא למעשה "נטולת נתרן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עלך לדבוק עם התרופה או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.

הנדרה הרוקח אחרת מהרופא

המינון המקובל ברל כל יום הוא:

מבוגרים וילדים מגיל 12 שנים ומעלה: 1-2 קפליות כל 4-6 שעות לפי הצורך.

אין לעבור על מינון של 8 קפליות ליממה. **ילדים בגיל 6-9 שנים:** ½ קפלייה כל 4-6 שעות לפי הצורך. אין לעבור על מינון של 3 קפליות ליממה (1.5 גרם ביום).

ילדים בגיל 9-12 שנים: 1-1½ קפלייה כל 4-6 שעות לפי הצורך. אין לעבור על מינון של 4 קפליות ליממה (2 גרם ביום). אין לתת קפלייה לילדים מתחת לגיל 6 שנים.

אין לעבור על המנה המומלצת.

עלך לרופא לרופא אם החום נמשך יותר מ-3 ימים או אם התסמינים אינם חופפים תוך 5 ימים למרות השימוש בתרופה.

צורת הנטילה:

יש לבלוע את התרופה עם מעט מים. מותר לחצות את הקפליות. אין מידע לגבי ליעט או תכשוע.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

אם נטלת מעט יותר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של חיות הבהב אריות. התרופה אינה. אל תגרם להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא גם אם הרגשתך טובה. טיפול מייד הוא חיוני, בגלל הסיכון להתפתחות צדק חמור. תופעות לוואי יכולות להיות בחיילה והקאה, שלשול, אבדון תיאבון, כאב בריאה, נפיחות, הערעה מוגברת, כאב ראש וצטטות בחוט העליונה ייתכן שכן אתן. משקפות את חמרת התופעות לכבד.

אין ליטול תרופות תוספת בדוק

החיות והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב מוספתיים אם אתה לוקה להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, הוועיץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי חמורות:

כמו בכל תרופה, השימוש בתרופה עלול לגרום לתופעות לוואי כגון סחרחורת, בחלק מהמשתמשים, אל תיבהל להקרא רישית הפעטת הלוואי. ייתכן שלא תסמל מאף אחת מהן.

תופעות הלוואי עלולות להיות חמורות יותר בקופשיים.

תופעות לוואי חמורות:

- **של תהסיקה:** תופעות הלוואי חמורות מיד לרופא הפועת:
- גבולות אדירות חרפות כגון פריחה
- תגרות, התנפחות של הפנים, השפתיים, הלשון, הגרון אשר עלולים לגרום לקושי
- שימה או בדיעה, התנפחות הגפיים.
- בקריקס בלורים, מחלות עור חרפות
- שחמימם שלחן קוילים הליות: רוחות
- פריחה, פלופיות, פגיעה רחית רחבת.
- תופעות לוואי עוריות חרפות עלולות להופיע גם אם בכבר נוטל תכשירים המכילים את המרכיב הפעיל פראצטמול ללא בעיה.

אם מופיעות תופעות לוואי עוריות, יש להפסיק הטיפול ולפנות לרופא באופן מיידי.

סימנים של שגינים במערכת הדם כגון: דימומים, הופעת חבורות בקלות, ישראל

התפתחות דלקות ביתר קלות כתוצאה מירידה חמורה במספר תאי הדם הלבנים.

• קוצר נשימה (נדר).

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת תופעות הלוואי חמורות או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא ציגה בעליון, לפנות בהרעיינן עם הרופא.

דיוח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לוחיה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לתוסף המקוון לדיווח על תופעות לוואי. על ידי נכיסה לקושי: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

מעט הערלה תרופה זו וכל תרופה אחרת יש שמור במקום מוגן מחוץ להישג ידם וטווח אריימם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הערלה. אל תגרם להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של איות חודש.

גבאי אחסון: אין לאחסן מעל 25°C. באריזת בקבוק, ניתן להשתמש בתרופה לאחר פתיחתה עד לתאריך התפוגה המצויין על גבי האריזה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם: Povidone, hypromellose, titanium dioxide (E171), croscarmellose sodium, magnesium stearate, macrogol, quinoline yellow aluminum lake (E104), sunset yellow FCF aluminum lake (E110), carnauba wax

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

קפליה מוארכת בצבע צהוב עם קו חזיה בשני הצדדים.

גודל אריזה מוארים: 20, 32, 50, 64, 100, 1000 קפליות.

אריזת בקבוק: 100 קפליות. ייתכן שלא כל גודלי האריזה משווקים. ערך בינוי 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפקט

התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 039-64-25921-039

למש הפטנט והלקחת הרואה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מועדפת לבני שני המינים.

יצרן וקבלן רשום:

דקסל® בי.ס
ר"ח דקסל 1, אור עקיבא 3060000, ישראל

1. למה מועדפת התרופה?

התרופה מועדפת לשיכון כאבים ולוהדת חום הגרמנים סיבות נשונת, כגון כאב ראש, כאב שיניים, הצטננות, שפעת, נגיפים שריוניים (קורונה) וכאב מוזחו.

קבוצה תרופית: משכך כאבים ומוריד חום.

2. לפני השימוש בתרופה

אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (פראצטמול) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכלה התרופה (ראה סעיף 6).

אזהרות מיוחדות ההגעות לשימוש

- **תרופה**
- אם פיתחת בעבר תופעות לוואי עוריות כתוצאה מגבולות תכשירים המכילים פראצטמול, אין ליטול תכשירים המכילים פראצטמול, כדי שלא יגרמו לך תופעות עוריות חמורות.
- השימוש במיל פראצטמול העלול לגרום לנדק בכבד כאשר:
- ייתכן מינון גבוה מהמומלץ או לתקופה ממושכת.
- בזמן הטיפול שותים משקאות אלכוהוליים.
- עלולות תרופות נוספות המשפיעות על נטיית הכבד.
- אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות בלי להוועיץ ברופא.
- אין ליטול תרופות נוספות לוהדת דם ושיכון כאבים או תרופות הצטננות ללא התייעצות עם רופא או רוקח למניעת מינון יתר או הרעה של פראצטמול.
- אין ליטול תרופות נוספות ממשפחת דקסמול או תכשירים נוספים המכילים פראצטמול.
- יש למנע מלקחת מינון גבוה (בגבול המומלץ) של תרופה זו בזמן צום.

ספר לרופא לפני התחלת הטיפול אם אתה סובל או סובלת בעבר מ:

- רגישות לחלב ולשנה או תרופה כלשהי
- מחלת כבד או ליקוי בתפקוד הכבד