

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ СТАНДАРТАМИ (ПРЕПАРАТЫ) - 1986

Препарат продается без рецепта врача

### Дексамоль, Каплеты, 500 мг

Каждая каплета содержит парацетамол (Paracetamol) 500 мг. Неактивные ингредиенты и аллергены в лекарстве - см. раздел 6 "Дополнительная информация" и раздел 2 "Важная информация о некоторых ингредиентах этого лекарства".

**Перед применением этого лекарства внимательно ознакомьтесь с инструкцией.** Эта инструкция содержит краткую информацию о лекарстве. Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту. Это лекарство отпускается без рецепта врача и предназначено для взрослых и детей в возрасте от 6 лет и старше. Принимайте лекарство в соответствии с указаниями в разделе 3 данной Инструкции "Как применять это лекарство". Проконсультируйтесь с фармацевтом, если вам нужна дополнительная информация. Обратитесь к врачу, если высокая температура сохраняется более 3 дней или если симптомы усугубляются или не проходят в течение 5 дней, несмотря на применение лекарства.

### 1. Для чего предназначено лекарство?

Лекарство предназначено для облегчения боли и снижения повышенной температуры различной этиологии, такой как головная боль, зубная боль, простуды, грипп, ревматические боли и менструальные боли.

**Терапевтическая группа:**  
Аналгетик и жаропонижающее.

### 2. Перед применением лекарства.

Не применяйте это лекарство, если:

- Вы чувствительны (у вас есть аллергия) к активному ингредиенту (парацетамолу) или к любому из других ингредиентов, содержащихся в этом лекарстве (см. раздел 6).

**Особые предостережения относительно применения лекарства**

• Если в прошлом у вас развились побочные эффекты со стороны кожи в результате приема препаратов, содержащих парацетамол, не принимайте препараты, содержащие парацетамол, чтобы не повторились подобные явления.

• Препарат содержит парацетамол, который может вызвать поражение печени, если:

- Дается в дозе выше рекомендованной или в течение длительного времени.

- Во время курса лечения вы употребляете алкогольные напитки.
  - Вы принимаете другие лекарства, влияющие на функцию печени.
  - Не используйте это лекарство слишком часто без консультации с врачом.
  - Не принимайте другие жаропонижающие и анальгетики или лекарства от простуды без консультации с врачом или фармацевтом, чтобы не допустить передозировки или отравления парацетамолом.
  - Не принимайте другие лекарства из группы **Дексамола** или иные другие препараты, содержащие парацетамол.
  - Избегайте приема высоких доз (даже в рекомендуемых интервалах) этого лекарства на протяжении.
- Сообщите врачу перед началом лечения, если у вас имеется или имелись в прошлом:**
- Чувствительность к какой-либо пище или лекарству.
  - Заболевание печени или нарушение функции печени.
  - Нарушение функции почек
  - Аллергия
  - Желтуха
  - Если вы беременны или кормите грудью

**Лекарственные взаимодействия**  
Если вы принимаете или недавно принимали другие лекарства, в том числе лекарства, отпускаемые без рецепта, и пищевые добавки, сообщите об этом врачу или фармацевту. Особенно, если вы принимаете:

- Антикоагулянты, такие как варфарин.
- Препараты, стимулирующие выработку ферментов печени (например, рифампицин, барбитураты).
- Противозиленептические средства - фенитоин, карbamазепин.
- Нестероидные противовоспалительные препараты.
- Метоклопрамид или домперидон (для лечения тошноты, рвоты и других проблем с пищеварением).
- Хлорамfenикол (антибиотик).
- Пробенецид (для лечения подагры).
- Холестирамин (для снижения избытка жиров в крови).

**Использование этого лекарства и употребление алкоголя**  
Не употребляйте алкоголь во время лечения парацетамолом ввиду повышенного риска поражения печени.

**Беременность и кормление грудью**  
Если вы беременны или кормите грудью, проконсультируйтесь с врачом перед началом приема этого лекарства. Принимайте

наименьшую дозу, которая эффективна для облегчения боли и/или снижения температуры, в течение как можно более короткого времени. Проконсультируйтесь с врачом, если боль или температура не снижаются, или если возникла необходимость чаще принимать лекарство.

**Кормление грудью:**  
Небольшие количества парацетамола проникают в грудное молоко. Проконсультируйтесь с врачом.

**Вождение и использование машин**  
Парацетамол не влияет на способность управлять автомобилем или работать с механизмами.

**Применение у детей**  
Это лекарство предназначено для взрослых и детей старше 6 лет, см. раздел 3. Родители должны сообщать лечащему врачу о любых побочных эффектах и любых дополнительных лекарствах, которые получает ребенок.

**Важная информация о некоторых ингредиентах этого лекарства**  
Это лекарство содержит Sunset Yellow FCF aluminum lake (E110), который может вызывать аллергические реакции.

Это лекарство содержит менее 1 миллимоля (23 мг) натрия на каплю, то есть оно практически не содержит натрия.

**3. Как применять лекарство**  
Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом, если вы уверены в дозировке и способе лечения этим лекарством.

При отсутствии других указаний врача обычная рекомендуемая доза составляет:

**Взрослые и дети в возрасте 12 лет и старше:**

1-2 капletы каждые 4-6 часов, по мере необходимости. Не превышайте дозу 8 каплет в день.

**Дети в возрасте 6-9 лет:** ½

каплеты каждые 4-6 часов по мере необходимости. Не превышайте дозу 3 каплеты в день (1,5 г в день).

**Дети в возрасте 9-12 лет:** ½-1

каплеты каждые 4-6 часов по мере необходимости. Не превышайте дозу 4 каплеты в день (2 грамма в день). Не давайте каплеты детям младше 6 лет.

**Не превышайте рекомендуемую дозу.**

Обратитесь к врачу, если высокая температура сохраняется более 3 дней или если симптомы не проходят в течение 5 дней, несмотря на применение лекарства.

**Способ применения:**

Проглотите каплету и запить небольшим количеством воды. Можно расоловинить таблетку.

• Одыши (редко).

Информация о жевании или изменении отсутствует.

Если вы случайно приняли более высокую дозу

Если вы приняли слишком высокую дозу или ребенок

случайно проглотил лекарство,

немедленно обратитесь к врачу

или в приемное отделение

больницы и возьмите с собой

упаковку лекарства. Не высыпайте

рвоту без четких указаний врача!

Даже если вы чувствуете себя

хорошо, необходимо немедленно

заканчивать лечение **ввиду риска**

развития серьезного повреждения

печени.

Побочными эффектами

могут быть тошнота и рвота,

диарея, потеря аппетита, боль в

животе, метеоризм, чрезмерное

потоотделение, боль или

чувствительность в верхней части

живота, и они могут не отражать

тяжести поражения печени.

Не принимайте лекарства в

темноте! Проверьте этикетку и

дозу **каждый раз**, когда

принимаете лекарство. Наденьте

очки, если они вам помогают.

Если у вас есть дополнительные

вопросы относительно этого

лекарства, проконсультируйтесь с

врачом или фармацевтом.

### 4. Побочные эффекты

Как и любое лекарство, Дексамол может вызвать побочные эффекты, такие как головокружение, у некоторых людей. Не лугайтесь, читая список побочных эффектов. У вас может не разиться ни один из них. Побочные эффекты могут быть более серьезными у пожилых людей.

**Серьезные побочные эффекты:**

Прекратите лечение и немедленно

обратитесь к врачу при появлении:

• Острых аллергических реакций,

таких как сыпь и зуд, отек

конечностей, отек лица, губ,

языка и горла, которые могут

вызвать затруднение дыхания

или гипотонию.

В редких случаях - острых кожных

проявлений, признаками которых

могут быть: покраснение, сывь,

волосы, распространенное

поражение кожи. Острые кожные

побочные эффекты могут

появиться, даже если в прошлом

препараты, содержащие активный

ингредиент парацетамол, не

вызывали у вас проблем.

При появлении побочных

эффектов со стороны кожи

прекратите лечение и немедленно

обратитесь к врачу.

• Признаков изменений в системе

крови, таких как кровотечение,

быстрое образование синяков,

более быстрое развитие

всплесков в результате резкого

снижения количества белых

кровяных клеток.

• Одыши (редко).

При появлении побочного эффекта, при ухудшении одного из побочных

эффектов или при появлении

одного из побочных

эффектов в листке

вкладыше, обратитесь к врачу.

**Сообщение о побочных эффектах**

О побочных эффектах можно

сообщить в Министерство

здравоохранения по ссылке

"אַפְלָגָה לִשְׁוֹרָה עַל פִּי" -

которую можно найти на домашней

странице Министерства

здравоохранения

([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)), ведущей к

онлайн-форум для сообщений

о побочных эффектах, или по

следующей ссылке:

<https://sideeffects.health.gov.il>

### 5. Как хранить лекарство

• Избегайте отравления! Это лекарство и любое другое лекарство необходимо хранить в закрытом месте, недоступном для детей и/или младенцев, во избежание отравления. Не высыпайте рвоту, если не получили прямых указаний врача.

• Не используйте лекарство после истечения срока годности (צ'קע) (צ'קע), указанного на упаковке. Срок годности относится к последнему дню указанного месяца.

• Условия хранения: Не хранить при температуре выше 25°C. После вскрытия фланкона-упаковки можно использовать лекарство до истечения срока годности, указанного на упаковке.

### 6. Дополнительная

информация

Помимо действующего вещества, это лекарство также содержит:

Povidone, hypromellose, titanium

dioxide (E171), croscarmellose

sodium, magnesium stearate,

macrogol, quinoline yellow aluminum

lake (E104), Sunset Yellow FCF

aluminum lake (E110), carnauba wax

Как выглядят лекарство и что

содержится в упаковке:

Продолжавшаяся желтая каплета с

насечками с обеих сторон.

Утвержденные размеры упаковки:

Блистерная (покровная) упаковка:

8, 10, 16, 20, 32, 50, 56, 64, 100,

1000 каплет.

Упаковка-флакон: 50 каплет.

Не все размеры упаковки могут

передаваться.

Пересмотрено в июне 2022 г. в

соответствии с рекомендациями

Минздрава.

Регистрационный номер

лекарственного средства

в национальном реестре

лекарственных средств

Министерства здравоохранения:

039-64-25921-00

### Производитель и владелец

лицензии:

**ДЕКСЕЛЬ LTD.**

ул. Дексель 1, Ор Акива

3060000, Израиль