

**نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصادلة (مستحضرات) - 1986**  
يسوق الدواء وفق وصفة طبيب فقط

**فيرزنيو 100 ملغ**

أقراص مطلية

المادة الفعالة وكميتها:

يحتوي كل قرص على:

أبماسيكليب 100 ملغ abemaciclib 100 mg

**فيرزنيو 50 ملغ**

أقراص مطلية

المادة الفعالة وكميتها:

يحتوي كل قرص على:

أبماسيكليب 50 ملغ abemaciclib 50 mg

**فيرزنيو 150 ملغ**

أقراص مطلية

المادة الفعالة وكميتها:

يحتوي كل قرص على:

أبماسيكليب 150 ملغ abemaciclib 150 mg

مواد غير فعالة ومسببات حساسية في المستحضر: انظر البند 2 "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" والبند 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتعمّن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي. هذا الدواء وصف لعلاج مرضك. لا تعطه للآخرين؛ لأنه قد يضرّ بهم، حتى لو بدا لك تشابه بين مرضك ومرضهم.

**1. لم أعدّ الدواء؟**

**سرطان الثدي المبكر**

- فيرزنيو بالدمج مع علاج هرموني، معد كعلاج مكمل للبالغين الذين لديهم سرطان الثدي المبكر الإيجابي لـ HR (hormone receptor positive) والسلبى لـ (HER2) human epidermal growth factor receptor 2، مع عقد ليمفاوية إيجابية وخطر مرتفع لانتكاس المرض.

لدى النساء قبل سن انقطاع الحيض أو قريبا من سن انقطاع الحيض، يجب دمج علاج هرموني بمثبط أروماتاز مع ناهض للهرمون المنشط للجسم الأصفر (LHRH) luteinizing hormone-releasing hormone agonist.

**سرطان الثدي المتقدم أو النقيلي**

- فيرزنيو، بالدمج مع دواء من نوع مُثبط أروماتاز غير ستيرويدي (non-steroidal aromatase inhibitor)، معدّ لعلاج النساء بعد سن انقطاع الحيض واللواتى يعانين من سرطان ثدي متقدم أو نقيلي، إيجابي لـ HR

هرموني أولي (hormone receptor positive) وسلي ل (HER2) human epidermal growth factor receptor 2، كعلاج

- فيرزينيو، بالدمج مع فولفيسترات (fulvestrant)، معدّ لعلاج النساء اللواتي يعانين من سرطان ثدي متقدم أو سرطان ثدي نقيلي، إيجابي ل (hormone receptor positive) HR وسلي ل human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)، واللواتي حصل تقدم في المرض لديهن بعد علاج هرموني.
- فيرزينيو كعلاج منفرد معدّ لعلاج متلقي العلاج البالغين الذين يعانون من سرطان ثدي متقدم أو نقيلي، إيجابي ل (hormone receptor positive) HR وسلي ل HER2، الذين حصل تقدم في المرض لديهم بعد علاج هرموني لمرض نقيلي وكذلك علاج كيميائي كعلاج لمرض نقيلي، الذي يشمل تاكسان كعلاج مُكمل أو نقيلي. يُمنع إعطاء علاج بفيرزينيو لنساء تمّ علاجهن في الماضي بمثبطات الإنزيم كيناز المعتمد على السيكلين 4 و 6 (CDK4، CDK6).

عند إعطاء علاج فيرزينيو بالدمج مع فولفيسترات أو تاموكسيفين أو مثبطات أروماتاز يجب أيضا قراءة نشرة المستهلك للدواء الذي وُصف لك. اسأل الطبيب إذا لم تكن متأكدا.

المجموعة العلاجية: مُثبط الإنزيم كيناز المعتمدة على السيكلين (cyclin-dependent kinase inhibitor).

## 2. قبل استعمال الدواء

يُمنع استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أليرجي) للمادّة الفعّالة abemaciclib أو لأحد المركّبات الأخرى التي يحتويها الدواء. لقائمة المركّبات غير الفعّالة، انظر البند 6.

### تحذيرات خاصّة متعلّقة باستعمال الدواء

قبل بدء العلاج بفيرزينيو أخبر طبيبك عن حالتك الطبيّة، وذلك يشمل إذا:

- كنت تعاني من سخونة، قشعريرة، أو علامات أخرى للعدوى.
- عانيت في الماضي من تخثرات دموية في الأوردة.
- كنت تعاني من مشاكل رئوية أو مشاكل في التنفّس.
- كنت تعاني من مشاكل في الكبد أو في الكلى.

### تحذيرات إضافيّة:

- **الإسهال.** الإسهال هو عرض شائع، قد يكون خطيراً في بعض الأحيان. قد يؤدي الإسهال إلى الجفاف أو التلوث. الوقت الأكثر شيوعاً للإصابة بالإسهال هو خلال الشهر الأول من العلاج بفيرزينيو. إذا كنت تعاني من إسهال خلال العلاج بفيرزينيو، من المحتمل أن يأمرك الطبيب بالتوقف مؤقتاً عن تناول فيرزينيو، إيقاف العلاج نهائياً، أو تقليص الجرعة.
- **تعداد منخفض لخلايا الدم البيضاء (قلة العدلات - Neutropenia).** التعداد المنخفض لخلايا الدم البيضاء (Neutropenia) هو أمر شائع خلال العلاج بفيرزينيو وقد يؤدي إلى ذلك إلى حالات عدوى خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة. يجب على الطبيب أن يفحص تعداد خلايا الدم البيضاء قبل وخلال العلاج. إذا بدأ يتطور لديك انخفاض في تعداد خلايا الدم البيضاء خلال العلاج بفيرزينيو، قد يأمرك الطبيب بالتوقف مؤقتاً عن تناول فيرزينيو، تقليص الجرعة أو الانتظار قبل أن تبدأ الشهر التالي من العلاج.

- **مشاكل رئوية.** قد يؤدي فيريزنيو إلى التهاب حاد في الرئتين أو قد يشكل خطراً على الحياة أثناء العلاج، ما قد يؤدي إلى الوفاة. إذا حصلت لديك مشاكل في الرئتين خلال العلاج بفيريزنيو، فقد يأمرك الطبيب بالتوقف مؤقتاً عن تناول فيريزنيو، تقليص الجرعة أو إيقاف العلاج نهائياً.
  - **مشاكل في الكبد.** قد يؤدي فيريزنيو إلى مشاكل كبد خطيرة. يجب أن يجري الطبيب فحوصات دم لفحص الكبد قبل وخلال العلاج بفيريزنيو. إذا تطورت لديك مشاكل في الكبد خلال العلاج بفيريزنيو، قد يقلص الطبيب الجرعة أو يوقف العلاج.
  - **تخثرات دموية في أوردة أو شرايين الرئتين.** قد يؤدي فيريزنيو إلى تخثرات دموية خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة. إذا أصبت بتخثرات دموية خلال العلاج بفيريزنيو، فقد يأمرك الطبيب بالتوقف مؤقتاً عن تناول فيريزنيو.
- لمعلومات إضافية انظر البند 4 "أعراض جانبية".

### الأطفال والمراهقون

سلامة وبنجاعة الدواء للأطفال غير معروفة.

### الفحوص والمتابعة

- يتعين على الطبيب أن يجري لك فحص تعداد كريات الدم البيضاء قبل العلاج وخلالها.
- يتعين على الطبيب أن يجري لك فحوص دم لفحص الكبد قبل العلاج وخلالها.
- إذا كنت قادرة على الحمل، فيجب على الطبيب أن يجري لك فحص حمل قبل ابتداء العلاج بفيريزنيو.

### تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبية والمكملات الغذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. قد يؤثر فيريزنيو على طريقة عمل الأدوية الأخرى، ومن شأن الأدوية الأخرى أن تؤثر على طريقة عمل فيريزنيو والتسبب بأعراض جانبية خطيرة. بشكل خاص، أخبر الطبيب إذا كنت تتناول:

- المثبطات المتوسطة والقوية لإنزيمات CYP3A: تزيد هذه الأدوية من التعرض لفيريزنيو، وقد تؤدي إلى سمية مفرطة. قد يقوم الطبيب بقياس ومراقبة الأعراض الجانبية، ويقلص جرعة فيريزنيو عند الحاجة.
- كيتوكونازول - يجب الامتناع عن تناول الأدوية التي تحتوي على كيتوكونازول خلال العلاج بفيريزنيو.
- محفزات قوية أو متوسطة لإنزيمات CYP3A تخفض مستويات فيريزنيو في الدم وقد تؤدي إلى انخفاض فعالية فيريزنيو. يجب الامتناع عن تناول محفزات قوية أو متوسطة لإنزيمات CYP3A خلال العلاج بفيريزنيو.

اعرف الأدوية التي تتناولها. احتفظ بقائمة لهذه الأدوية لتتمكن من عرضها على الطبيب أو الصيدلي عندما تتلقى دواءً جديداً.

### استعمال الدواء والغذاء

يمكن تناول فيريزنيو مع أو بدون طعام. يجب الامتناع عن تناول جريب-فروت ومنتجات تحتوي على جريب-فروت خلال العلاج بفيريزنيو. قد يزيد الجريب-فروت من كمية الدواء في الدم.

### الحمل، الإرضاع والخصوبة

إذا كنت حاملاً أو تخططين أن تحملي، مرضعة أو تخططين للإرضاع، يجب أن تستشيري الطبيب قبل استعمال الدواء.

قد يسبب فيريزنيو الضرر للجنين.

- **الحمل**

### النساء القادرات على الحمل:

- يجب إجراء فحص حمل قبل بدء العلاج بفيرزيبو.
- يجب استعمال وسائل ناجعة لمنع الحمل خلال فترة العلاج بفيرزيبو، ولمدة 3 أسابيع بعد تناول آخر جرعة من فيرزيبو.
- أخبري الطبيب فوراً إذا حملت أو إذا اعتقدت بأنك قد تكونين حاملاً خلال فترة العلاج بفيرزيبو.

### • الإرضاع

ليس معروفاً إذا كان فيرزيبو ينتقل إلى حليب الأم. يُمنع الإرضاع خلال العلاج بفيرزيبو، ولمدة 3 أسابيع على الأقل بعد تناول آخر جرعة من فيرزيبو.

### • الخصوبة

استناداً إلى أبحاث أجريت على حيوانات في المختبر، قد يُسبب فيرزيبو مشاكل في الخصوبة لدى الرجال. قد يؤثر هذا الأمر على قدرتك على إنجاب الأطفال. استشر طبيباً إذا كان الأمر صلة بك.

### السياقة واستعمال الماكينات

من الممكن أن يسبب فيرزيبو دوارة. يُمنع السياقة أو تشغيل ماكينات قبل أن تعرف كيفية تأثير المستحضر عليك.

### معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء

#### يحتوي فيرزيبو على اللاكتوز

على متلقي العلاج الذين يعانون من عدم احتمال للاكتوز، أن يتنبهوا إلى أن أقراص فيرزيبو تحتوي على لاكتوز. إذا أخبرك الطبيب بأنك تعاني من عدم احتمال أنواع معينة من السكر، توجه إلى الطبيب قبل تناول هذا الدواء.

#### يحتوي فيرزيبو على الصوديوم

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 مليمول صوديوم (23 ملغ) في القرص، أي أنه يعتبر عملياً "خالياً من الصوديوم".

### 3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائماً حسب تعليمات الطبيب. يجب عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة وطريقة العلاج سيحددهما الطبيب، فقط. من المحتمل أن يغير الطبيب جرعة الدواء إذا لزم الأمر.

يجب تناول الدواء تقريباً في نفس الساعة يومياً.

### يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

طريقة تناول: يجب بلع الدواء كاملاً. يُمنع مضغ، سحق أو شطر الأقراص قبل بلعها. يُمنع تناول أقراص فيرزيبو إذا كانت مكسورة، متصدعة أو تالفة.

### إذا تناولت عن طريق الخطأ، جرعة أعلى

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام طفل بابتلاع الدواء عن طريق الخطأ فتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر عبوة الدواء معك.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد أو إذا تقيأت، يُمنع تناول جرعة مضاعفة للتعويض عن الجرعة المنسية. تناول الجرعة التالية في وقتها المعتاد واستشر الطبيب.

يجب الاستمرار في العلاج حسب توصية الطبيب.

حتى إذا طرأ تحسّن على حالتك الصحيّة، يُمنع التوقّف عن العلاج بالدواء أو تغيير الجرعة بدون استشارة الطبيب.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقّق من المصلق ومن الجرعة الدوائيّة في كلّ مرّة تناول فيها دواء. ضع النظّارات الطّيبة إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافيّة بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشر الطبيب أو الصيدليّ.

#### 4. الأعراض الجانيّة

كجميع الأدوية، قد يسبّب استعمال فيريزنيو أعراضاً جانيّة لدى قسم من المستخدمين. لا تُصدّم عند قراءة قائمة الأعراض الجانيّة. من المحتمل ألاّ تعاني من أيّ منها.

يمكن أن يؤدي فيريزنيو إلى أعراض جانيّة خطيرة تشمل:

- **إسهال.** هو عرض جانبيّ شائع، قد يكون خطيراً في بعض الأحيان. قد يؤدي الإسهال إلى الجفاف أو العدوى.
- **تعداد منخفض لخلايا الدم البيضاء (قلة العدلات - Neutropenia).** هو أمر شائع خلال العلاج بفيريزنيو وقد يؤدي ذلك إلى حالات عدوى خطيرة من الممكن أن تؤدي إلى الوفاة.
- **مشاكل في الكبد.**
- **مشاكل رئوية.** قد يؤدي فيريزنيو إلى التهاب حاد في الرئتين أو قد يشكل خطراً على الحياة، ما قد يؤدي إلى الوفاة.
- **تخثرات دموية في الأوردة، أو في شرايين الرئتين.** قد يؤدي فيريزنيو إلى تخثرات دموية خطيرة التي قد تؤدي إلى الوفاة.

يجب التوجه إلى الطبيب فوراً إذا:

- كنت تعاني من براز رخو. ابدأ بتناول دواء لعلاج الإسهال (مثل لوبيراميد). احرص على شرب كمية سوائل أكبر وتوجه للطبيب فوراً.
- كنت تعاني من علامات وأعراض تعداد منخفض لخلايا الدم البيضاء أو حالات عدوى، مثل السخونة والقشعريرة.
- كنت تعاني من إحدى العلامات والأعراض التالية لمشاكل الكبد: شعور متزايد بالتعب، ألم في الجهة اليمنى العليا من منطقة البطن، فقدان الشهية، حالات نرف أو كدمات التي تظهر بسهولة أكبر من المعتاد.
- كنت تعاني من إحدى العلامات والأعراض التالية لتخثر الدم: ألم أو انتفاخ في اليدين أو الرجلين، ضيق تنفس، ألم في الصدر، تنفس سريع، وتيرة قلب سريعة.
- كنت تعاني من أعراض التهاب الرئتين التي تشكل خطراً على الحياة. يجب إبلاغ الطبيب فوراً إذا شعرت بأعراض جديدة لمشاكل في التنفس، أو تفاقم الأعراض الموجودة التي تشمل: اضطرابات التنفس أو ضيق التنفس، سعال مع أو من دون بلغم، ألم في الصدر.

أعراض جانيّة تمت مشاهدتها في الأبحاث السريريّة

سرطان الثدي المبكر

- الأعراض الجانيّة الأكثر انتشاراً لفيريزنيو بالدمج مع تاموكسيفين أو مثبط أروماتاز (أعراض تظهر لدى 20% أو أكثر من متلقّي العلاج): إسهال، حالات عدوى، قلة العدلات، إنهاك، انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء، غثيان، فقر الدم وصداع.
- أعراض جانيّة تظهر لدى 10% أو أكثر من متلقّي العلاج بفيريزنيو بالدمج مع تاموكسيفين أو مثبط أروماتاز:

- اضطرابات في الجهاز الهضمي: إسهال، غثيان، تقيؤ والتهاب في الطبقة المخاطية في الفم (stomatitis).
- حالات عدوى وآفات: حالات عدوى.
- اضطرابات عامة: إنهاك.
- اضطرابات في الجهاز العصبي: صداع، دوام.
- اضطرابات في الأيض والتغذية: نقص الشهية.
- اضطرابات الجلد والأنسجة تحت الجلد: طفح، تساقط الشعر (alopecia).

- أعراض جانبية تظهر لدى أقل من 10% من متلقي العلاج بفيرزيبو بالدمج مع تاموكسيفين أو مثبط أروماتاز: حكة، مشاكل في الهضم (dyspepsia)، ضرر في الأظافر، فرط إنتاج الدموع، ضرر في حاسة التذوق (dysgeusia)، مرض رئوي خلالي (ILD – interstitial lung disease) أو التهاب الرئتين، حالات الانصمام الخثاري الوريدي (VTEs- Venous thromboembolic events).

- نتائج شاذة في فحوصات المخبرية التي ظهرت لدى 10% أو أكثر من متلقي العلاج بفيرزيبو: ارتفاع الكرياتين في الدم، انخفاض تعداد خلايا الدم البيضاء، قلة العدلات في الدم، فقر الدم، انخفاض تعداد الخلايا الليمفاوية في الدم، انخفاض تعداد الصفائح الدموية في الدم، ارتفاع إنزيمات الكبد (ALT و AST) في الدم، مستوى منخفض من البوتاسيوم في الدم (hypokalemia).

### سرطان الثدي المتقدم أو النقلي

- الأعراض الجانبية الأكثر انتشارا لفيرزيبو بالدمج مع مثبط أروماتاز غير ستيرونيدي (أعراض تظهر لدى 20% أو أكثر من متلقي العلاج): إسهال، غثيان، ألم في البطن، تقيؤ، حالات عدوى، قلة العدلات، فقر الدم، انخفاض تعداد كريات الدم البيضاء، إنهاك، فقدان الشعر (Alopecia) وقلة الشهية.

- أعراض جانبية ظهرت لدى 10% أو أكثر من متلقي العلاج بفيرزيبو بالدمج مع مثبط أروماتاز غير ستيرونيدي:

- اضطرابات في الجهاز الهضمي: إسهال، غثيان، ألم في البطن، تقيؤ وإمساك.
- حالات عدوى وإصابات: حالات عدوى.
- اضطرابات عامة: إنهاك، مرض شبيه بالإنفلونزا.
- اضطرابات في الجلد وفي الأنسجة تحت الجلدية: فقدان الشعر (Alopecia)، طفح جلدي، حكة.
- اضطرابات في الأيض والتغذية: انخفاض الشهية.
- الفحوص المخبرية: انخفاض في الوزن.
- اضطرابات في المجاري التنفسية وفي تجويف الصدر: سعال، ضيق تنفس.
- اضطرابات في الجهاز العصبي: دوام.

- أعراض جانبية إضافية لفيرزيبو بالدمج مع مثبط أروماتاز غير ستيرونيدي: حالات الخثار الوريدي الانصمامي (VTEs- Venous thromboembolic events).

- الأعراض الجانبية الأكثر شيوعاً لفيرزيبو بالدمج مع فولفيسترات (أعراض تظهر لدى 20% أو أكثر من متلقي العلاج): غثيان، حالات عدوى، فقر الدم، قلة الشهية، صداع، ألم في البطن، إسهال، تعداد منخفض لكريات الدم البيضاء (Neutropenia، leukopenia)، تقيؤات وإسهال.
- أعراض جانبية ظهرت لدى 10% أو أكثر من متلقي العلاج بفيرزيبو بالدمج مع فولفيسترات:
  - اضطرابات في الجهاز الهضمي: إسهال، غثيان، ألم في البطن، تقيؤات، التهاب الغشاء المخاطي في الفم (التهاب الفم).
  - حالات عدوى وإصابات: حالات عدوى.
  - اضطرابات عامة: إسهال، وذمة محيطية، حمى.
  - اضطرابات في الأيض والتغذية: انخفاض الشهية.
  - اضطرابات في المجاري التنفسية وفي تجويف الصدر: سعال.
  - اضطرابات في الجلد وفي الأنسجة تحت الجلدية: فقدان الشعر (Alopecia)، حكة، طفح جلدي.
  - اضطرابات في الجهاز العصبي: ألم في الرأس، تضرر حاسة الذوق، دوار.
  - الفحوص المخبرية: انخفاض في الوزن.
- أعراض جانبية إضافية لفيرزيبو بالدمج مع فولفيسترات: حالات الخثار الوريدي الانصمامي ( VTEs- Venous thromboembolic events).
- الأعراض الجانبية الأكثر شيوعاً لفيرزيبو عند إعطائه كعلاج أحادي الدواء (أعراض تظهر لدى 20% أو أكثر من متلقي العلاج): إسهال، إسهال، غثيان، انخفاض في الشهية، ألم بطن، تعداد منخفض لخلايا الدم البيضاء (قلة العدلات - Neutropenia)، تقيؤات، حالات عدوى، فقر دم، صداع وتعداد منخفض لصفائح الدم (Thrombocytopenia).
- أعراض جانبية ظهرت لدى 10% أو أكثر من متلقي العلاج بفيرزيبو عند إعطائه كعلاج أحادي الدواء:
  - التهاب الغشاء المخاطي في الفم (التهاب الفم).
  - حالات عدوى وإصابات: حالات عدوى.
  - اضطرابات عامة: إسهال، حمى.
  - اضطرابات في الأيض والتغذية: انخفاض الشهية، جفاف.
  - اضطرابات في المجاري التنفسية وفي تجويف الصدر: سعال.
  - اضطرابات في أنسجة الهيكل العظمي والعضلات: ألم في المفاصل (ألم مفصلي).
  - اضطرابات في الجهاز العصبي: ألم في الرأس، تضرر حاسة الذوق، دوار.
  - اضطرابات في الجلد وفي الأنسجة تحت الجلدية: فقدان الشعر (Alopecia).
  - الفحوص المخبرية: انخفاض في الوزن.
- نتائج استثنائية في الفحوص المخبرية ظهرت لدى 10% أو أكثر من متلقي العلاج بفيرزيبو: ارتفاع الكرياتينين في الدم، انخفاض خلايا الدم البيضاء، تعداد منخفض للعدلات في الدم، أنيميا (فقر دم)، تعداد منخفض للخلايا اللمفاوية في الدم، تعداد منخفض للصفائح في الدم، ارتفاع في إنزيمات الكبد (ALT و AST) في الدم.

- أعراض جانبية شوهدت بعد التسويق بوتيرة غير معروفة:

اضطرابات في جهاز التنفس: مرض رئوي خلالي (ILD – interstitial lung disease) أو التهاب في الرئتين.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي غير مذكور في النشرة فعليك استشارة الطبيب.

### الإبلاغ عن الأعراض الجانبية

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية نتيجة لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يحوّلك إلى استشارة عبر الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

### 5. كيف يخزن الدواء؟

- تجنب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد وأو الأطفال، وهكذا تتجنب التسمّم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب الحفظ في درجة حرارة أقل من 30°C.
- يجب الحفظ في العبوة الأصلية.
- يُمنع إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحيّ أو في سلّة المهملات. اسأل الصيدليّ بالنسبة إلى كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد ضمن الاستعمال. تساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

### 6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المادة الفعّالة، يحتوي الدواء، أيضاً:

microcrystalline cellulose 102, microcrystalline cellulose 101, lactose monohydrate; lactose hydrate, croscarmellose sodium, sodium stearyl fumarate, silicon dioxide; silica, colloidal hydrate; hydrated silicone dioxide.

**150 mg:**

color mixture: polyvinyl alcohol, titanium dioxide, macrogol 4000/PEG MW 3350, talc, iron oxide yellow.

**100 mg:**

color mixture: polyvinyl alcohol, titanium dioxide, macrogol 4000/PEG MW 3350, talc.

**50 mg:**

color mixture: polyvinyl alcohol, titanium dioxide, macrogol 4000/PEG MW 3350, talc, iron oxide yellow, iron oxide red.

كل قرص من فيريزنيو 50 ملغ يحتوي على 0.7 ملغ من الصوديوم و 14 ملغ لاکتوز (ك مونوهيدرات).  
كل قرص من فيريزنيو 100 ملغ يحتوي على 1.4 ملغ من الصوديوم و 28 ملغ لاکتوز (ك مونوهيدرات).  
كل قرص من فيريزنيو 150 ملغ يحتوي على 2.0 ملغ من الصوديوم و 42 ملغ لاکتوز (ك مونوهيدرات).

### كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة

**فيريزنيو 50 ملغ:**

قرص بيضوي الشكل لونه بيج، مع ختم كلمة "Lilly" من جهة واحدة و "50" من الجهة الأخرى. تحتوي كل عبوة على 14 قرصاً في الشريط (البليستر).

فيرزينو 100 ملغ:

قرص بيضوي الشكل لونه أبيض حتى تقريباً أبيض، مع ختم كلمة "Lilly" من جهة واحدة و "100" من الجهة الأخرى. تحتوي كل عبوة على 14 قرصاً في الشريط (البليستر).

فيرزينو 150 ملغ:

قرص بيضوي الشكل لونه أصفر، مع ختم كلمة "Lilly" من جهة واحدة و "150" من الجهة الأخرى. تحتوي كل عبوة على 14 قرصاً في الشريط (البليستر).

**صاحب التسجيل وعنوانه:**

إيلي ليلي إسرائيل م.ض.، شارع هشيزاف 4، ص.ب. 4246، رعانا 4366411.

**المنتج وعنوانه:**

إيلي ليلي، إنديانابوليس، إنديانا 46285، الولايات المتحدة.

تم تحريرها في آب 2022 وفق تعليمات وزارة الصحة

**أرقام تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:**

فيرزينو 50 ملغ: 161-43-35390-00

فيرزينو 100 ملغ: 161-44-35391-00

فيرزينو 150 ملغ: 161-45-35392-00

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكّر. مع هذا فالدواء معدّ لكلا الجنسين.