

## سلوكوكس 100 ملغ، سلوكوكس 200 ملغ

كيسولات

التركيبة:

سلوكوكس 100 ملغ: تحتوي كل كيسولة على 100 ملغ سيليكوكسيب

(celecoxib 100 mg).

سلوكوكس 200 ملغ: تحتوي كل كيسولة على 200 ملغ سيليكوكسيب

(celecoxib 200 mg).

مواد غير فعالة في المستحضر - أنظر الفصل 6 "معلومات إضافية" والفصل 2 البند

معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء".

اقرأ النشرة وتبمغن حتى نهايتها وذلك قبل استعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات

موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

وصف هذا الدواء لك. لا تعطيه للأطفال. في بعض بهم، حتى لو بدا لك تشابه بين حالتك

وحالتهم الصحية.

### 1) لم أعد هذا الدواء؟

علاج أعراض التهاب المفاصل والآلم الناتجة عن التهاب المفاصل التنكسي (فصال عظمي)

والتهاب المفاصل الروماتويدي (التهاب المفاصل الالتهابي).

المجموعة العلاجية: مجموعة فرعية من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية

(NSAIDs): مثبطات COX-2 inhibitors (cyclooxygenase).

يُنتِج الجسم بروتوستاجلاندينات، والتي من شأنها التسبب بالألام والالتهاب. في حالات

مثل التهاب المفاصل التنكسي والتهاب المفاصل الروماتويدي، يُنتِج الجسم كمية أكبر

من البروستاجلاندينات. يعمل سلوكوكس من خلال تقليل إنتاج البروستاجلاندينات، مما

يقل الآلم والالتهاب.

يجب توقع بدء عمل الدواء بعد ساعات من تناول الجرعة الأولى، لكن من الممكن ألا

تشعر بالتحسن الكامل لعدة أيام.

### 2) قبل استعمال الدواء

يُمنَعُ استعمال الدواء إذا:

- وجدت لديك حساسية (حساسا) للمادة الفعالة سيليكوكسيب أو لأي مركب من المركبات الأخرى التي يحتويها الدواء (انظر الفصل 6: "معلومات إضافية").
- وجدت لديك حساسية (حساسا) للسلفوناميدات (مضاد حيوي لعلاج حالات العدوى).
- كنت تعاني من تفرح شطط في البطن أو في الأمعاء أو من نزيف في البطن أو في الأمعاء.
- أصبت بدم، سلاخ في الالب، احتقان شديد في الالب أو ردة فعل تحسسية مثل الطفح الجلدي المصحوب بالحكة، انتفاخ في الوجه، في الشفتين، في اللسان أو الحلق، صعوبات في التنفس أو صعوبة بعد تناول الأسبرين أو مستحضر لاسترويدي آخر مضاد للالتهاب.
- كنت حاملا. إذا كان هنالك احتمال أن تحملي خلال تناول سلوكوكس، عليك مناقشة الطبيب بشأن وسائل منع الحمل.
- كنت مرضعة.
- كان لديك مرض كلوي شديد.
- كان لديك مرض كلوي شديد.
- كنت تعاني من مرض التهابي في الأمعاء مثل التهاب القولون التقرحي أو داء كرون.
- كنت مصابا بقصور القلب، مرض قلبي إقفاري موجود أو أمراض ترتبط بالأوعية الدموية الدماغية، مثلا عند تشخيص عانيت من نوبة قلبية، سكتة دماغية أو نوبة إقفارية عابرة (انقاص مؤقت في تدفق الدم للدماغ، والذي يطلق عليه أيضا "ميني سكتة")، نبحة صدرية أو انسداد في الأوعية الدموية للقلب أو للدماغ.
- إذا كان لديك مشاكل في الدورة الدموية (مرض شرياني محيطي) أو إذا خضعت لجراحة في شرايين الرجلين.

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

قبل بدء العلاج بسلوكوكس، أخبر الطبيب إذا:

- كان لديك في الماضي تفرح أو نزيف في البطن أو في الأمعاء (يُمنَعُ تناول سلوكوكس عندما تكون هنالك تفرح أو نزيف في البطن أو في الأمعاء).
- كنت تتناول حمض الأسيتيل ساليسيليك (الأسبرين) (حتى جرعة منخفضة بهدف حماية القلب)
- كنت تتناول علاجات مضادة للمصفائح (Antiplatelet).
- كنت تستعمل أدوية لتقليل تخثر الدم (مثلا وارفارين أو أدوية مشابهة مضادة للتخثر أو أدوية حديثة مضادة للتخثر يتم إعطاؤها عبر اللم، مثلا إبيكسابان).
- كنت تستخدم أدوية تُسمى كورتيكوستيرويدات (مثلا بريدنيزون).
- كنت تستخدم سلوكوكس بالتزامن مع مضادات التهاب الالتهابي (NSAIDs) أخرى،

ليست حمض الأسيتيل ساليسيليك مثل إيبوبروفين أو ديكولوفيناك. يجب الامتناع عن

استعمال هذه الأدوية معا.

• كنت تتخّن، تعاني من السكري، ارتفاع ضغط الدم أو كولسترول مرتفع.

• كان لديك خلل في أداء القلب، الكبد أو الكلى. قد يرغب الطبيب بفحصك بصورة دائمة

و/أو قد تحتاج لجرعة أقل.

• كان لديك تراكم سوائل (مثل انتفاخ الكاحلين والقدمين).

• كنت مصابا بالجلطات، مثل نتيجة لمرض، إسهال أو استعمال مدرّات البول (التي تستخدم

لعلاج فاضل السوائل في الجسم).

• كانت لديك ردة فعل تحسسية شديدة أو ردة فعل جلدية شديدة لأي أدوية.

• كنت تشعر بالمرض نتيجة لعدوى أو تعتقد بأنك مصاب بعدوى، لأن سلوكوكس قد يخفي

الحثى أو أعراض العدوى والالتهاب الأخرى.

• كان عمرك فوق 65 عاما، وخصوصا إذا كان وزنك أقل من 50 كغم، قد يرغب

الطبيب بمتابعة علاجك في أوقات أكثر تقريبا.

### تحذيرات إضافية

• يجب على الطبيب تحديد أقل جرعة فعالة لأصغر وقت ممكن من أجل الحد من مخاطر

الأعراض الجانبية المرتبطة بمشاكل القلب. نظرا لأن مخاطر الأعراض الجانبية

المرتبطة بمشاكل القلب قد تزداد مع ارتفاع الجرعة ومدة الاستعمال، فمن المهم

استعمال أقل جرعة كافية للسيطرة على الألم، وعدم تناول سلوكوكس لفترة أطول مما

يجب للسيطرة على الأعراض، ومما يأمرك به الطبيب.

• مثل أدوية أخرى مضادات الالتهاب الالتهابي الستيرويدية (NSAIDs) (مثلا إيبوبروفين أو

ديكلوفيناك)، قد يؤدي هذا الدواء لارتفاع ضغط الدم، ولذلك قد يطلب الطبيب متابعة

ضغط الدم بصورة دائمة.

• تم الإبلاغ عن عدة حالات من رذات الفعل الخطيرة في الكبد، مثل التهاب الكبد الشدي،

تضخم الكبد، قصور الكبد (بعضها كانت نتائجها قاتلة أو استدعت زرع كبد)، خلال

استعمال سلوكوكس. من بين الحالات التي تم الإبلاغ عنها، حصلت رذات الفعل الكبدية

الأكثر خطورة خلال شهر من بدء العلاج.

• قد يزيد سلوكوكس من صعوبة حصول الحمل. عليك إبلاغ الطبيب إذا كنت تخططين

للحمل أو إذا كانت لديك صعوبات في الحمل (انظري البند المتعلق بالحمل، الرضاعة

والخصوبة).

### الأطفال والمرافقون

هذا الدواء مخصص للبالغين فوق سن 18 عاما.

تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو تناول مؤخرا، أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبية

والمكملات الغذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك، وبشكل خاص، إذا كنت تتناول:

• ديكستروميثورفان (يُستعمل لعلاج السعال).

• مثبطات ACE، مضادات مستقبلات الأنجيوتنسين II، حاصرات الببتا ومدرّات البول

(تستخدم لارتفاع ضغط الدم وقصور القلب).

• فلونازول وريفامبيسين (تُستعمل لعلاج حالات العدوى الفطرية والبكتيرية).

• وارفارين أو أدوية أخرى شبيهة بوارفارين (أدوية "مسيلة لدم" تقلل تخثر الدم) وبضمن

ذلك الأدوية الأحدث مثل إبيكسابان.

• ليفيتم (يُستعمل لعلاج عدة أنواع من الاكتئاب).

• أدوية أخرى لعلاج الاكتئاب، اضطرابات النوم، ضغط الدم المرتفع أو النبض غير المنتظم.

• المستحضرات المضادة للذهان (تُستعمل لعلاج اضطرابات نفسية معينة).

• ميتوكلينيت (يُستعمل لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي، الصدفية والوكيميا).

• كارلامازين (يُستعمل لعلاج الصداع/نوبات وأشكال معينة من الألم أو الاكتئاب).

• باريتوبرات (يُستعمل لعلاج الصداع/نوبات واضطرابات نوم معينة).

• سيكلوسبورين وتراكلوريمون (يُستعملان لتثبيت الجهاز المناعي، مثلا بعد عمليات الزرع).

يمكن تناول سلوكوكس مع حمض الأسيتيل ساليسيليك بجرعة منخفضة (75 ملغ أو أقل في

اليوم). استشر الطبيب قبل تناول الدوائين معا.

### استعمال الدواء والغذاء

بالإمكان تناول سلوكوكس مع أو بدون وجبة.

### استخدام الدواء واستهلاك الكحول

قد يزيد استهلاك الكحول وأدوية مضادات الالتهاب الالتهابي الستيرويدية (NSAIDs) من

مخاطر حصول مشاكل في الجهاز الهضمي.

### الحمل، الإرضاع والخصوبة

إذا كنت حاملا أو مرضعة، تعتقدين بأنك حامل أو تخططين بذلك، فاستشيري الطبيب

أو الصيدلي قبل تناول الدواء.

### الحمل

يُمنَعُ استعمال سلوكوكس لدى النساء الحوامل أو القادرات على الحمل (أي النساء اللاتي لديهن

القدرة على الحمل ولا يستخدمن وسائل منع الحمل) خلال العلاج المتواصل. إذا حملت خلال

العلاج بسلوكوكس، عليك التوقف عن العلاج ومراجعة الطبيب لتلقي علاج بنديل.

### الإرضاع

لا تستعملي سلوكوكس إذا كنت مرضعة.

### الخصوبة

قد تسبب الأدوية مضادات الالتهاب الالتهابي الستيرويدية (NSAIDs)، وبضمنها سلوكوكس، صعوبة

في الحمل. عليك إبلاغ الطبيب إذا كنت تخططين للحمل أو إذا كانت لديك صعوبات في الحمل.

### السياقة واستعمال الماكينات

عليك أن تكون على علم بطريقة تجاوبك مع سلوكوكس قبل أن تقوم بالسياقة أو تشغيل

الماكينات. إذا شعرت بدوار أو بالغثاس بعد تناول سلوكوكس، ممنوع السياقة أو تشغيل

الماكينات الخطيرة إلى حين اختفاء هذه الأعراض.

### معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء

يحتوي الدواء على الكافور (نوع من المنكر).

إذا كان لديك طيب إنك تعاني من حساسية لأنواع معينة من السكر، فيجب استشارة الطبيب

قبل تناول الدواء.

### يحتوي الدواء على الصوديوم

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ميليوم من الصوديوم (23 ملغ) في كل كيسولة. أي أنه

يمكن القول إن سلوكوكس "خالٍ من الصوديوم".

### 3) كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائما حسب تعليمات الطبيب. يجب عليك الفحص مع الطبيب أو

الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وطريقة العلاج بالمستحضر.

### الجرعة وطريقة العلاج سيدهدما الطبيب، فقط.

يجب على الطبيب أن يحدد لك أقل جرعة فعالة لأصغر وقت ممكن.

• يجب المتابعة إذا لم تتوقف تعليمات أخرى من الطبيب.

• التهاب المفاصل التنكسي (فصال عظمي): 200 ملغ مرة في اليوم، أو 100 ملغ مرتين

في اليوم (100 ملغ صباحا و 100 ملغ مساء).

• التهاب المفاصل الروماتويدي: 100 إلى 200 ملغ مرتين في اليوم.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

طريقة تناول

سلوكوكس المتواصل لتناول عن طريق البلع. بالإمكان تناول الكيسولات طوال ساعات اليوم،

مع أو بدون طعام. مع ذلك، يجب محاولة تناول كل جرعة من سلوكوكس في نفس الوقت

من كل يوم.

• يجب ابتلاع الدواء مع كأس ماء. لا تتوقف معلومات فتح ونشر محتوى الكيسولة.

• يجب مراجعة الطبيب بعد بدء العلاج بأسبوعين إذا لم تشعر بتحسن في حالتك الصحية.

### إذا تناولت عن طريق الخطأ، جرعة أعلى

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام طفلك بإتلاخ كمية من الدواء عن طريق الخطأ فتوجه

فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر عليه الدواء معك.

### إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول سلوكوكس في الوقت المحدد، يُمنَعُ تناول جرعة مضاعفة. قم بتناول الجرعة

التالية في وقتها المعتاد، واستشر الطبيب.

• يجب الاستمرار في العلاج حسب توصية الطبيب. حتى إذا طرأ تحسن على حالتك

الصحية، يُمنَعُ التوقف عن العلاج بالذواء بدون استشارة طبيب.

### إذا توقفت عن تناول الدواء

قد يؤدي التوقف المفاجئ عن العلاج لتفاقم الأعراض التي تعاني منها. لا تتوقف عن تناول

سلوكوكس قبل انتهاء العلاج، إلا إذا أوصاك الطبيب بذلك.

قد يأمرك الطبيب بتقليل الجرعة لعدة أيام قبل وقف العلاج بصورة نهائية.

يُمنَعُ تناول الأدوية في الظلام! تحقق من المصلى ومن الجرعة الدوائية في كل مرة

تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشيري الطبيب أو الصيدلي.

### 4) الأعراض الجانبية

جميع الأدوية، قد يسبب استعمال سلوكوكس أعراضًا جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا

تنددش عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل ألا تعاني من أي منها.

تمت ملاحظة أعراض الجانبية المفصلة أدناه لدى مرضى التهاب المفاصل (arthritis)

الذين تناولوا سيليكوكسيب (كيسولات).

الأعراض الجانبية المشار لها بنجمة (\*) مفصلة أدناه بأعلى وتيرة ممكنة، وقد حصلت لدى

المرضى الذين تناولوا سيليكوكسيب (كيسولات) لمنع السلاخ في الأمعاء الغليظة. تناول

متلقو العلاج في هذه الأبحاث سيليكوكسيب (كيسولات) بجرعات عالية ولفترة طويلة.

**يجب وقف العلاج والتوجه للطبيب فوراً في حال:**

- ردة فعل تحسسية مثل الطفح الجلدي، انتفاخ الوجه، صغفر أو صعوبات التنفس.
- مشاكل في القلب مثل إلام الصدر.
- إلام بطن شديدة أو أي علامة للزيف في المعدة أو في الأمعاء مثل البراز الأسود أو الدموي، أو تقيؤ الدم.
- ردة فعل جلدية مثل الطفح، بثرات أو تقشر الجلد.
- قصور الكبد (قد تشمل الأعراض الغثيان، الإسهال، اليرقان (اصفرار الجلد أو العينين)).

**أعراض جانبية إضافية:**

**أعراض جانبية شائعة جدا (أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من عشرة):**

صغف دم مرتفع، يشتمل تقافم مشكلة ارتفاع ضغط الدم الموجودة\*

**أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من عشرة):**

- نوبة قلبية\*
- تراكم سوائل مع انتفاخ الكاحلين، الرجلين و/أو البطن
- التهاب المسالك البولية
- ضيق تنفس\*، التهاب الجيوب (التهاب الجيوب الأنفية، عدوى في الجيوب الأنفية، جيوب أنفية مسدودة أو مؤلمة)، آف مسدود أو سيلان الأنف، ألم في الحلق، شعال، زكام، أعراض مشابهة للإنفلونزا
- دوار، صعوبات في النوم
- تقيؤ\*، إلام بطن، إسهال، مشاكل في الهضم، غازات
- طفح جلدي، حكة
- تصلّب في العضلات
- صعوبات في البلع\*
- ألم في الرأس (صداع)
- ألم في المفاصل
- تقافم حالات الحساسية الموجودة
- إصابات عَرَضِيَّة.

**أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر لدى حتى مستعمل واحد من مئة):**

- سكته دماغية\*
- قصور القلب، خفقان (إدراك ضربات القلب)، وتيرة نبض قلب سريعة
- نتاج استثنائية في فحوص الدم المتعلقة بالكبد
- نتاج استثنائية في فحوص الدم المتعلقة بالكلى
- أنيميا (تغييرات في كريات الدم الحمراء من شأنها أن تسبب التعب وضيق التنفس)
- قلق، اكتئاب، تعب، تعب، شعور بالعمى (نדיابيس وإبر)
- مستويات مرتفعة من البوتاسيوم في نتاج فحوص الدم (قد يسبب الغثيان، التعب، ضعف العضلات أو نبضات القلب خفقان القلب)
- رؤية مضطربة أو مشوشة، ضيق في الأذنين، إلام وجروح في الفم، صعوبات في السمع\*
- إسهال، حازوقة، التهاب في المعدة (مشاكل هضم، إلام بطن أو تقيؤ)، تقافم التهاب المعدة أو الأمعاء
- تشنجات في الرجلين
- طفح مرتفع ومصحوب بالحكة (شرى)
- التهاب في العينين
- صعوبات في التنفس
- تغييرات في لون البشرة (كدمات)
- إلام في الصدر (إلام منتشرة غير مرتبطة بالقلب)
- انتفاخ في الوجه.

**أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر لدى حتى مستعمل واحد من ألف):**

- تقرحات (زيف) في المعدة، في المريء أو في الأمعاء؛ أو تمزق الأمعاء (قد يسبب إلام البطن، الحمى، الغثيان، التقيؤ، انتساد الأمعاء)، براز غامق اللون أو أسود، التهاب في البنكرياس (قد يؤدي لإلام في البطن)، التهاب في المريء
- انخفاض مستويات الصوديوم في الدم (حالة يطلق عليها نقص صوديوم الدم)
- عدد أقل من خلايا الدم البيضاء (التي تساعد في حماية الجسم من التلوث) أو الصفائح الدموية (احتمال زائد للزيف أو الكدمات)
- صعوبات في التناسق الحركي في حركة العضلات
- شعور بالبلهية، تغييرات في مذاق
- فرط الحساسية للضوء
- تساقط الشعر
- هذيان

- حالات زيف في العينين
- ردة فعل حادة قد تؤدي لالتهاب الرتئين
- نبض قلب غير منظم
- احمرار الوجه
- خثرة دموية في الأوعية الدموية في الرتئين. قد تشمل الأعراض صعوبة مفاجئة في التنفس، إلام حادة عند التنفس أو الأيهار
- زيف في المعدة أو في الأمعاء (قد يؤدي لبراز دموي أو تقيؤ)، التهاب في الأمعاء الدقيقة أو الأمعاء الغليظة
- التهاب شديد في الكبد (هيباتيتيس). قد تشمل الأعراض الغثيان، الإسهال، اليرقان (اصفرار الجلد أو العينين)، بول داكن، براز باهت اللون، زيف بسهولة، حكة أو قشعريرة.
- قصور حاد في الكلى
- اضطرابات الدورة الشهرية
- انتفاخ في الوجه، في الشفتين، في الفم، في اللسان أو الحلق، أو صعوبات في البلع.

**أعراض جانبية نادرة جدا (أعراض تظهر لدى حتى مستعمل واحد من 10,000):**

- ردة فعل تحسسية شديدة (تشتمل صدمة حساسية قد تكون قاتلة)
- أعراض جلدية خطيرة مثل متلازمة ستيفنس جونسون، التهاب جلد مع تقشر (exfoliative dermatitis)، تقشر الأنسجة المتوترة البثرية التسممي (قد تسبب الطفح، بثرات أو تقشر الجلد)، البثور الطفحي الحاد المنتشر (قد يسبب احمرار الجلد مع مناطق متفحفة مغلظة بعدد كبير من الخراجات الصغيرة)
- ردة فعل تحسسية متأخرة عن أعراض ممكنة مثل الطفح الجلدي، انتفاخ في الوجه، حمى، عدد متفخم ونتائج غير سليمة في فحوص الدم (مثل، أداء الكبد، تعداد الدم كثره الحمضات، نوع معين من ارتفاع في تعداد خلايا الدم البيضاء))
- زيف في الدماغ يؤدي للوفاة
- التهاب السحايا (التهاب الغشاء المحيط بالدماغ والجبل النخاعي)
- قصور الكبد، تضمر الكبد والتهاب الكبد الشديد (التهاب كبدى خاطف) (أحيانا يكون قاتلا أو يستوجب زرع الكبد). قد تشمل الأعراض حالات غثيان، الإسهال، اليرقان (بول أصفر في الجلد أو العينين، بول داكن، براز باهت اللون، زيف بسهولة، حكة أو قشعريرة)

- مشاكل في الكبد (مثل الركود الصفراوي والتهاب الكبد اليرقاني، وللذين قد يكونان مصحوبين بأعراض مثل البراز الباهت، الغثيان واصفرار الجلد أو العينين)
- التهاب في الكلى ومشاكل كلوية أخرى (مثل المتلازمة الكلوية أو minimal change disease، اللذين من شأنهما أن يكونا مصحوبين بأعراض مثل تراكم المياه و)منمة، بول رغوي، تعب وفقدان الشهية)
- تقافم حالة الصرع (قد تحصل نوبات بوتيرة أعلى و/أو أكثر خطورة)
- انتساد شريان أو وريد في العين يؤدي إلى فقدان البصر الجزئي أو الكامل
- أوعية دموية ملتصقة (قد يسبب الحمى، إلام، بقع بنفسجية على الجلد)
- انخفاض عدد كريات الدم الحمراء، البيضاء والصفائح (الذي قد يؤدي إلى الشعور بالتعب، الميل للإصابة بالكدمات بسهولة، حالات زيف بوتيرة عالية في الأنف وخطورة زائدة لإصابة بالعدوى)
- إلام العضلات والضعف
- تضمر في حاشية الشم
- فقدان حاسة الذوق.

**أعراض جانبية ناسبة شيوعها غير معروفة (أعراض جانبية لم يتم تحديد توأنها بعد):**

انخفاض الخصوية لدى النساء، والذي عادة ما يكون قابلاً للإصلاح عند إيقاف الدواء.

**تم مشاهدة الأعراض الجانبية الإضافية التالية خلال الأبحاث السريرية غير المرتبطة بالتهاب المفاصل والحالات الأخرى التي تتدمج فيها التهاب مفاصل.** في هذه الأبحاث، تناول متلقو العلاج سيليكوكسيب (كيسولات) بجرعات 400 ملغ في اليوم لمدة وصلت إلى 3 سنوات:

**أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من عشرة):**

مشاكل في القلب: دجبة صدرية (الإلام في الصدر)

مشاكل في المعدة: متلازمة القولون المتهيّج (قد تشمل إلام بطن، إسهال، مشاكل في الهضم، غازات)

حصى في الكلى (قد تؤدي لإلام في البطن أو الظهر، دم في البول)، صعوبة في التبول

ازدياد الوزن

**أعراض جانبية غير شائعة (تظهر لدى حتى مستعمل واحد من مئة):**

خثار في الأوردة العميقة (خثرة دم، عادة في الرجل، والتي قد تسبب إلاماً، انتفاخاً أو احمراراً في المساق، أو مشاكل تنفّس)

مشاكل في المعدة: تلوث في البطن (قد يؤدي للتقيح وتقرحات في المعدة والأمعاء) كسر في الأطراف السفلية

- هربس نظائقي، عدوى جلدية، إكزيما (طفح جاف مع حكة)، التهاب في الرتئين [عدوى في الصدر (سعال، حمى، صعوبات ممكنة في التنفس)]
- أجسام طافية في العين تسبب تشوش الرؤية أو خلل في الرؤية، دوار (فريتيجو) في أعقاب مشاكل في الأذن الداخلية، لثة مؤلمة، ملتصقة أو تنزف، جروح في الفم
- تشوش ليلي على الوتيرة، زيف من الوابسر، حركة أمعاء متكررة
- كتل دهنية في الجلد أو في أماكن أخرى، تكثيس عقدي (انتفاخ غير ضار على أو حول المفاصل والأربطة في كفة اليد أو القدم)، صعوبات في الزحف، صغف استثنائي أو شديد جدا من المهبل، إلام في الثديين
- مستويات مرتفعة من الصوديوم في نتاج فحوص الدم.

**إذا ظهر عرض جانبي، إذا تقافم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من عرض جانبي غير متوقع، فالتوجه، عليك استشارة الطبيب.**

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من أعراض جانبية من الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية نتيجة لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يحوّلك إلى استمارة عبر الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il> بالملامح التبليغ عبر البريد الإلكتروني: [safety@trima.co.il](mailto:safety@trima.co.il)

### 5) كيف يخزن الدواء؟

تجنّب التسمّم يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول يدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم. لا تسبّب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة/ الشريط. تاريخ انتهاء الصلاحية ينسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

**شروط التخزين:** يجب التخزين في مكان بارد وجاف، في درجة حرارة تحت الـ 25°C.

يُمنع إلقاء الأدوية في المجلى (حوض الجلي) أو في سلّة المهملات في البيت. قم باستشارة الصيدلي بالنسبة إلى كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد ضمن الاستعمال. إنّ ذلك يساعد على الحفاظ على البيئة.

### 6) معلومات إضافية

بالإضافة إلى المادة الفعّالة، يحتوي الدواء، أيضاً:

lactose monohydrate, povidone, carmellose sodium low substituted, sodium lauryl sulphate, magnesium stearate. Hard gelatin capsule:

في كيسولات سلوكوس 100 ملغ: gelatin, water, titanium dioxide  
في كيسولات سلوكوس 200 ملغ: gelatin, water, titanium dioxide, quinoline yellow, erythrosin  
كيف يتبين الدواء وماذا تحوي العبوة؟  
سلوكوس 100 ملغ: كيسولة جيلاتين صلبة وغير شفافة ذات غطاء أبيض وجسم أبيض. تحتوي كل عبوة على 10 أو 20 كيسولة.  
سلوكوس 200 ملغ: كيسولة جيلاتين صلبة وغير شفافة ذات غطاء برتقالي وجسم أبيض. تحتوي كل عبوة على 10 أو 20 كيسولة.  
قد لا يتم تسويق جميع أحجام العبوات.

اسم المنتج وصاحب التسجيل: تريما، منتجات طبيّة إسرائيلية معيّنة م.ض، معيّنة 4023000، إسرائيل.

تم تحريرها في نيسان 2022 وفق تعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

سلوكوس 100 ملغ: 134.40.30074.00

سلوكوس 200 ملغ: 120.44.30096.00

تسبب قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصّص لكلا الجنسين.