

# إيفيتور 2.5، 5، 10 أقراص

التركيز:  
يحتوي كل قرص على:

إيفيتور 2.5: إيفيروليموس 2.5 ملг

إيفيتور 5: إيفيروليموس 5 ملг

إيفيتور 10: إيفيروليموس 10 ملг

- وُجِدَ لديك نسبة مرتفعة من الكوليستيرون. **إيفيتور قد يسبب إرتفاعاً في نسبة الكوليستيرون و/أو شحوم الدم الأخرى.**
- خضعت مؤخراً لعملية جراحية جدية، أو إذا كنت لا تزال تعاني من جرح لم يُشفَّ بعد العمليات الجراحية. قد يزيد إيفيتور من خطورة حدوث مشاكل في شفاء الجروح.
- وُجِدَ لديك أي تلوث. من الجائز أن تكون هناك حاجة لعلاج التلوث قبل بدء العلاج بـ **إيفيتور**.
- عانيت في الماضي من التهاب الكبد الفيروسي من نوع B (hepatitis B)، وذلك لأنَّه من الممكن أن ينشط مجدداً أثناء العلاج بـ **إيفيتور** (أنظر الفقرة 4: "الأعراض الجانبية").
- كنت تعاني أو عانيت في السابق من مشاكل في الكلى.
- خضعت أو سوف تخضع للعلاج الشعاعي (Radiotherapy).
- بالإضافة إلى ذلك قد يُؤدي **إيفيتور** إلى: إضعاف الجهاز المناعي، لذلك من الجائز أن تكون معرضاً لخطرة حدوث تلوث أثناء العلاج بـ **إيفيتور**. إذا تطورت لديك سخونة أو علامات أخرى للتلوث، استشر الطبيب.
- قسم من التلوثات قد تكون خطيرة وقد تكون لها عواقب مميتة عند البالغين والأطفال.
- التأثير على وظيفة الكلى. لذلك، سيقوم الطبيب بمراقبة وظيفة الكلى أثناء العلاج بـ **إيفيتور**.
- التسبب بضماعفات في التنفس، سعال وسخونة (أنظر الفقرة 4 "الأعراض الجانبية").
- التسبب بتطور جروح في الفم (تر赫ات الفم)، من الجائز أن يقوم الطبيب بتغيير أو بإيقاف العلاج بـ **إيفيتور**. قد تؤدي بعض من مستحضرات غسول الفم والجلب إلى تفاقم التر赫ات، لذلك لا تحاول أي شيء دون استشارة الطبيب أولًا. من الجائز أن يقوم الطبيب بدء العلاج بـ **إيفيتور** من جديد بنفس المقدار الدوائي أو بمقدار دوائي أقل.
- التسبب بضماعفات في العلاج الإشعاعي. مضاعفات خطيرة في العلاج الإشعاعي (مثل ضيق التنفس، غثيان، إسهال، طفح جلدي وألم في الفم، اللثة والحنجرة). بما في ذلك حالات مميتة، تمت مشاهدتها لدى بعض المرضى الذين تناولوا إيفيروليموس بالتزامن مع العلاج الإشعاعي أو تناولوا إيفيروليموس بعد وقت قصير من الخضوع للعلاج الإشعاعي. بالإضافة إلى ذلك، تم التبلغ عن عرض يسمى متلازمة الاستذكار الشائعة (radiation recall syndrome) والتي تشمل تحرماً في العلاج الإشعاعي أو في الرئتين في مكان العلاج الإشعاعي السابق، لدى مرضى يخوضون العلاج الإشعاعي في الوقت القريب، أو إذا خضعت لعلاج إشعاعي في السابق.
- بلغ الطبيب فوراً إذا كنت تشعر بذلك الأعراض.

**(1) لأى غرض مخصوص الدواء؟**

إيفيتور 2.5، 5، 10 مخصوص لـ:

- علاج المرضى الذين يعانون من ورم في الدماغ من نوع الورم النجمي ذو الخلايا المعلقة تحت البطانية العصبية [Subependymal Giant Cell Astrocytoma (SEGA)] أو الصيدلي.

• علاج المرضى الذين لا تناسبهم من درجات المرض المعيارية [Angiomyolipoma (AML)]، والذين لا تناسبهم من درجات المرض المعيارية [Tuberous Sclerosis Complex (TSC)].

• علاج المرضى الجراحيين الذين يعانون من ورم في الكلى المُصنف بالورم الشحمي إلى عملية جراحية عاجلة. هذا النوع من الأورام متعلق بحالة جينية تسمى التصلب الحديدي (Tuberous Sclerosis Complex).

• علاج المرضى الذين يعانون من أورام الغدد الصماء المتقدمة التي مصدرها البكتيريا، ومن غير الممكن إزالتها بواسطة عملية جراحية، حيث تطورت موضعاً أو مرض تقليبي.

• علاج سرطان الكلى المتقدم ذو المستقبلات الهرمونية الإيجابية - HER2، السلبي، بمشاركة إكسيميسستان، عند النساء بين الأشخاص، دون مرحلة نقلية منتشر في أعضاء داخلية متارتفاع مع أعراض، بعد عودة المرض أو تطور المرض بعد العلاج بمتطلبات الآرموماتان غير المستردافية.

• علاج سرطان الكلى المتقدم ذو المستقبلات الهرمونية ضد مسبب الورم في بطاقة الأوعية الدموية - Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) في المساعدة على إيقاف المرض.

• علاج أورام الغدد الصماء، في مرحلة موضعية متقدمة، تقليلاً أو غير قابلة لإجراء عملية جراحية، مصنفة جيداً (أ) أو (B)، غير الوظيفية، والتي مصدرها من الرئة أو من الجهاز الهضمي، لدى البالغين الذي تقدم لديه المرض.

**الفصيلة العلاجية: دواء مضاد للسرطان**

إيفيتور هو دواء مادته الفعالة تسمى إيفيروليموس. دواء مضاد للسرطان يقلل من تزويد الدم إلى الخلايا السرطانية وبالتالي من الممكن أن يقلل من نمو وانتشار الخلايا السرطانية.

إيفيتور من الممكن أن يقلل أيضاً من حجم الخلايا السرطانية في الكلى التي تسمى بالورم الشحمي الخلقي الوعائي وخلايا الورم الدماغي من نوع SEGA.

يحدث الورم الأخير بسبب إضطراب وراثي يسمى التصلب الحديدي (TSC).

**(2) قبل إستعمال الدواء**

يتم وصف إيفيتور من أجلك فقط من قبل طبيب متخصص ذو خبرة في علاج السرطان أو طبيب متخصص في علاج المرضى الذين يعانون من التصلب الحديدي.

احرص على اتباع جميع تعليمات الطبيب. هذه التعليمات قد تختلف عن المعلومات العامة الواردة في هذه النشرة.

إذا توفرت لديك آية أسلطة عن إيفيتور أو عن سبب وصف هذا الدواء من أجلك. راجع الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً ( لديك حساسية مفرطة ) لـ إيفيروليموس (everolimus). لمواد مشابهة مثل sirolimus، temsirolimus أو وكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء المفصحة في الفقرة 6 "معلومات إضافية" في هذه النشرة.
- إذا قاسيت في السابق من رد فعل تحسسي أو إذا كنت تعتقد بأنك حساساً (البريجي)، فاستشر الطبيب.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

قبل العلاج بـ إيفيتور، إحكام الطبيب إذا: • فوجئت لديك آية مشاكل في الكبد أو إذا كانت لديك آية أمراض والتي من الجائز أن يكون لها تأثير على الكبد. في هذه الحالة، من الجائز أن يحتاج الطبيب أن يصف لك مقداراً دوائياً مختلفاً من إيفيتور أو إيقاف العلاج. بشكل مؤقت أو دائم.

• وُجد لديك داء السكري (تسبب مرتفعة من السكر في الدم). قد يؤدي إيفيتور إلى إرتفاع نسب السكر في الدم وتفاقم السكري. هذا الأمر قد يؤدي إلى الحاجة للعلاج دوائياً مثل الإنسولين أو أعلاج فموي بمستحضر مضاد للسكري. أخبر الطبيب إذا كنت تعاني من عطش متزايد أو من إرتفاع في وتيرة التبول.

• يتوجب عليك أخذ لقاح أثناء العلاج بـ إيفيتور، لأنه من الجائز أن يكون اللقاح أقل فاعلية. من المهم التحدث مع الطبيب بالنسبة للأطفال الذين يعانون من ورم دماغي من نوع SEGA. حول إستكمال سلسلة لقاحات الطفولة قبل العلاج بـ إيفيتور.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء إذا:

• فوجئت لديك آية مشاكل في الكبد أو إذا كانت لديك آية أمراض والتي من الجائز أن يكون لها تأثير على الكبد. في هذه الحالة، من الجائز أن يحتاج الطبيب أن يصف لك مقداراً دوائياً مختلفاً من إيفيتور أو إيقاف العلاج. بشكل مؤقت أو دائم.

• وُجد لديك داء السكري (تسبب مرتفعة من السكر في الدم). قد يؤدي إيفيتور إلى إرتفاع نسب السكر في الدم وتفاقم السكري. هذا الأمر قد يؤدي إلى الحاجة للعلاج دوائياً مثل الإنسولين أو أعلاج فموي بمستحضر مضاد للسكري. أخبر الطبيب إذا كنت تعاني من عطش متزايد أو من إرتفاع في وتيرة التبول.

• يتوجب عليك أخذ لقاح أثناء العلاج بـ إيفيتور، لأنه من الجائز أن يكون اللقاح أقل فاعلية. من المهم التحدث مع الطبيب بالنسبة للأطفال الذين يعانون من

• أدوية لعلاج الإلخالات أو نوبات الصرع، أدوية مضادة للصرع مثل: فينيتوين، كاربايمازين، أو فينيباربิตال.

يجب الإيمان عن تناول تلك الأدوية أثناء العلاج بـ **إيفيتور**. إذا كنت تتناول المقدار الدوائي للدواء المضاد للإلخالات (زعف أو خفض) قد يوجب تغيير المقدار الدوائي من **إيفيتور**.

لدى المتعالجين الذين يعانون من TSC ويتناولون أدوية مضادة للإلخالات، فإن تغيير المقدار الدوائي للدواء المضاد للإلخالات (زعف أو خفض) قد يوجب تغيير المقدار الدوائي من **إيفيتور**. سينقر الطبيب ذلك. إذا حصل أي تغيير في المقدار الدوائي لديك المضاد للإلخالات، الرجاء إبلاغ الطبيب.

## استعمال الدواء والمطامع

بالإمكان تناول الدواء مع أو بدون طعام، ولكن يجب تناوله بإنتظام كل يوم بنفس الطريقة.

لا يجوز شرب عصير الچريپ فروت أو تناول الچريپ فروت أثناء العلاج بـ **إيفيتور**. وذلك لأنَّ هذا الأمر قد يسبِّب إرتفاع في كمية الداء في الدم، ربما إلى مستوى ضار.

## الحمل والإرضاع والخصوبة

من الممكن أن يضر **إيفيتور** بجنينك ولا يوصي به أثناء الحمل. أخبر الطبيب إذا كنت حاملة، أو تزنين بذلك حامل. سيقوم الطبيب بمناقشتك فيما إذا كان عليك تناول **إيفيتور** أثناء الحمل.

## الخصوصية

يجب على النساء في جيل الخصوبة إستعمال وسائل منع حمل ناجحة جداً (مثل: الكوندومن أو أقراص منع الحمل) أثناء العلاج بـ **إيفيتور** ولمدة 8 أسابيع بعد إيقاف العلاج. إذا كنت تزنين بذلك حامل، توجه إلى مركز الإرشاد.

قبل تناول **إيفيتور** مرة أخرى، عليك تناوله في حضور حمل - استشارة الطبيب.

لوحظ غياب الدورة الشهرية (amenorrhea) لدى بعض النساء اللواتي تناولن **إيفيتور** ولكن قد تلقين الدورة الشهرية قبل ذلك.

## الارتفاع

من الممكن أن يضر **إيفيتور** بطفلك الرضيع. لا يجوز الإرضاع أثناء العلاج ولمدة أسبوعين بعد تناول المقدار الدوائي الأخير من **إيفيتور**. أخبر الطبيب إذا كنت مرضعة.

## السيادة واستعمال الماكولات

يجب توخيحذر عند القيادة أو إستعمال الماكولات أثناء إستعمال الدواء خاصة إذا كنت تشعر بارهاق غير اعتيادي، نظراً لأن الإرهاق يهدى إلى خفض المقدار الدوائي الذي الشائعة حتى الشائعة جداً - **إيفيتور**. بالنسبة للأطفال، فينبغي تحذيرهم من ركوب الدراجات أو من اللعب بالقرب من الشارع ونحو ذلك.

## معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوى **إيفيتور** على الكوليستور (سكر الدهن)، إذا أحرك الطبيب بأن لديك حساسية تجاه بعض السكريات، فاستشر الطبيب قبل تناول **إيفيتور**.

## 3 كافية إستعمال الدواء؟

يجب إستعمال المستحضر دائماً بحسب تعليمات الطبيب.

على الإستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

إذا كنت تعاني من أعراض جانبية مميتة من **إيفيتور** (أنظر الفقرة 4 "الأعراض الجانبية") أثناء العلاج بـ **إيفيتور**. فمن الجائز أن يحتاج الطبيب إلى خفض المقدار الدوائي الذي يعطي عليك تناوله من **إيفيتور** أو أن يعطي عليك بالتوقف عن العلاج بـ **إيفيتور** لفترة زمنية أو بشكل دائم.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

طريقة تناول

يجب تناول **إيفيتور** عن طريق الفم، مرة في اليوم كل يوم في نفس الوقت تقريباً، بإنتظام مع أو بدون طعام.

يجب بلع القرص/الأقراص بأكمله/ها مع كأس من الماء.

لا تتوفر معلومات عن مضغ، شطْر أو سحق القرص.

إذا كنت تتناول أقراص **إيفيتور** لعلاج التصلب الحديدي (Complex Tuberous Sclerosis) مع SEGA وإن كنت غير قادر على بلع الأقراص، فيمكنك خلطها داخل كأس من الماء.

يجب وضع القرص/الأقراص المطلوب /ة داخل كأس من الماء (ما يقارب 30 مل) [ملقطين].

يجب خلط المحتوى بلطف حتى تفك القرص/الأقراص (أقراص) (ما يقارب 7 دقائق).

يزوري بشكل فوري.

يجب إضافة كمية ماء مماثلة ثانية داخل الكأس (ما يقارب 30 مل)، يجب خلط بلطف بقایا المحتوى وشرب كامل المحتوى للتأكد من حصولك على كامل المقدار الدوائي من **إيفيتور**.

إذا دعت الحاجة، إشرب المزيد من الماء لشطف كافة البقايا في فمك.

تعليمات للمعالجين بخصوص الإستعمال والعلاج بـ **إيفيتور**. يجب غسل اليدين جيداً قبل وبعد تحضير المعلمين.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً مفترضاً أو إذا بلع طفلاً أو شخص آخر بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضار معلق **إيفيتور**. إذا تناولت المقدار الدوائي من **إيفيتور** من أي طلاق.

إذا نسيت تناول الدواء، إذا سبب المعلمين بخصوص الإستعمال والعلاج بـ **إيفيتور**. يجب غسل اليدين جيداً قبل تناول الدواء.

إذا سبب المعلمين بخصوص الإستعمال والعلاج بـ **إيفيتور**. لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب.

