

# دونكور

**أقراص مطلية 400 ملг**

المادة الفعالة

يحتوي كل قرص مطلي على درونيدارون 400 ملг (على شكل هيدروكلوريد)

**Dronedarone 400 mg (as hydrochloride)**  
معلومات إضافية عن المواد غير الفعالة ومولادات الحساسية في المستحضر: انظر الفقرة 6: «معلومات إضافية».

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمال الدواء:  
احفظ هذه النشرة على مدار 24 ساعة.

تحتوى هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء.  
إذا توقف ديلك أى سلطة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلى.

وصحف هذا الدواء من أجلك. لا تطلع الآخرين فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

**(1) لأى غرض مخصوص الدواء؟**  
الدواء يستعمل لعلاج الرجفان الأذيني بعد العودة لنظم القلب السليم (نظم جيبي).

**الفصيلة العلاجية:** مستحضر مضاد الانسجة لتنظيم نظم القلب.

**(2) قبل إستعمال الدواء**

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (الergic) لل المادة الفعالة أو كل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (انظر الفقرة 6).  
- كنت تعانى من اضطرابات في التوصيل العصبي في القلب التي تتطلب في تنظم قلب بطيء أو الشعور بدوار. بإمكانك إستعمال دونكور إذا كان لديك ناظمة للقلب.

- كنت تعانى من نظم قلبي بطيء جداً ( أقل من 50 نبضة في الدقيقة).  
- بشير التخطيط الكهربائي للقلب (ECG) على مشكلة في القلب تسمى «إطالة مقطع QT» (مقطع ذو أكثر من 500 ملي ثانية).

- كنت تعانى من رجفان أذيني مزمن (رجفان يستمر بشكل متواصل 6 أشهر على الأقل) وتم إتخاذ قرار بعد إعادته لنظم جيبي عن طريق تقويم نظم القلب.

- كنت تعانى من عدم استقرار (انخفاضات) في ضغط الدم، الذي قد يؤدي إلى جريان دم شريري غير كافٍ لأنحاء الجسم.  
- كنت تعانى أو ابنت في السابق من قصور قلبي الذي قد يتمثل بوذمة في الرجلين. صعوبات تنفسية عند الاستلقاء أو خلال النوم أو ضيق في التنفس أثناء الحركة.

- حجم الدم الذي يضخ من القلب في كل إنقباض أقل من اللازم (اضطراب في الأداء الوظيفي للبطين الأيسر).  
- تناولت أميدات دارون في السابق وتطورت لديه أعراض جانبية رئوية أو كبدية.

- كنت تتناول أدوية لعلاج التلوثات ( بما في ذلك تلوثات فطرية أو إيدز)، للحساسية، لمشاكل نظم القلب، للإكتتاب، أدوية بعد الزرع (انظر الفقرة «التفاعلات بين الأدوية»).
- كنت تعانى من مشاكل شديدة في وظائف الكبد.
- كنت تعانى من مشاكل شديدة في وظائف الكلى.
- كنت تتناول دابيجاتران (منع تشكيل خثارات دموية) (انظر الفقرة «التفاعلات بين الأدوية»).
- كنت في فترة الحمل.
- إذا إنطقت عليك إحدى تلك الحالات، فلا يجوز إستعمال دونكور.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

- قبل إستعمال دونكور، إحك للطبيب إذا:
  - كنت تعانى من مشكلة تسبب إختفاضاً في نسب البوتاسيوم أو المغنيزيوم في الدم. يجب معالجة هذه المشكلة قبل بدء إستعمال دونكور.
  - كنت فوق عمر 75 سنة.
  - كنت تعانى من حالة فيها أصبح الوعاء الدموي الذي يزور عملة القلب بالدم متصلباً وضيقاً (مرض قلبي تاجي).
- أثناء العلاج بالدواء، إحك للطبيب إذا:
  - أصبح الرجفان الأذيني لديك مزمناً تحت العلاج بـ دونكور - يجب التوقف عن العلاج بـ دونكور.
- كنت تعانى من إنتفاخ في راحتي القدمين أو في التنفس أثناء شفاط تنفسية عند الاستلقاء أو خلال النوم، ضيق في الرجليين، صعوبات أو من زيادة في الوزن (هذه علامات وأعراض لقصور القلب).
  - إحك للطبيب حالاً إذا ظهر لديك واحد من العلامات أو الأعراض التالية لمشاكل الطعام، غثيان، نفقات، اصفرار الجلد أو اصفرار فقدان الشهية للطعام، غثيان، نفقات، اصفرار الجلد أو اصفرار بياض العينين (يرقان)، بول بلون داكن أكثر من المعتاد، إرهاق (خاصصة)، إيقاعات أخرى مع أمراض أخرى مذكورة هنا، حكة.
- كنت تعانى من ضيق في التنفس أو سعال جاف. إحك للطبيب ليفحص رئتين.

إذا إنطقت عليك ما ذكر أعلاه (أو في حالة شك)، يرجى إستشارة الطبيب أو الصيدلى قبل تناول دونكور.

## الفحوص والمتابعة

- خلال إستعمال دونكور من شأن الطبيب أن يجري فحوصات لحالتك الصحية وتاثير الدواء عليك.
  - من شأن الطبيب أن يفحص الشفاط الكهربائي للقلب لديك بواسطة جهاز التخطيط الكهربائي للقلب (electrocardiogram) (ECG).
  - يرسل الطبيب لإجراء فحص الدم لوظائف الكبد قبل بدء العلاج بـ دونكور و خلال العلاج.
  - إذا كنت تتناول أدوية ضد تشكيل خثارات دموية، مثل وارفارين، سيرسلك الطبيب لفحص دم يسمى INR، لتتأكد أن الدواء يعمل جيداً.
  - من شأن الطبيب أن يجري فحوص دم إضافية. نتيجة إحدى الفحوص، هي لفحص نشاط الكلى (نسب الكرياتينين في الدم)، قد تتأثر من دونكور.
  - سيخذ الطبيب ذلك بعين الاعتبار أثناء فحص نتائج فحص الدم ويستعمل قيمة مرجعية أخرى للقيقة «الطبيعية».
  - قد يقوم الطبيب بإجراء فحص رئتين.
- في حالات معينة يجب التوقف عن العلاج بـ دونكور.  
يرجى إبلاغ من يقوم بفحص نتائج فحص دمك أنك تتناول دونكور.



لا يجوز تناول درونوكور إذا كنت في سن الخصوبة ولا تستعملين

وسائل ناجحة لمنع الحمل.

إذا حصل حمل أثناء استعمال درونوكور، توقيفي عن تناول الأقراص

وتحولي للطبيب حالاً

#### الإرضاع

لا يُعرف إذا ما كان درونوكور ينتقل لحليب الأم. عليك إستشارة

الطبيب لتقرير فيما إذا كنت تستعملين درونوكور أو ترضعين.

لا تستطعين فعل كليها.

استشيري الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أي دواء في فترة الحمل

والإرضاع.

#### السيادة وإستعمال الماكولات

لا يؤثر درونوكور عادة على القدرة على السيادة أو إستعمال ماكولات.

مع ذلك، إن القدرة على السيادة أو إستعمال الماكولات قد تتأثر من

الأعراض الجانبية، مثل إرهاق.

#### (3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب إستعمال المستحضر دائماً حسب تعليمات الطبيب.

عليك أستضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكون واثقاً بخصوص

المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

إذا كنت بحاجة للانتقال من العلاج بـ أميدورون (دواء آخر لعلاج

بحدوث اضطرابات نظم القلب) إلى العلاج بـ درونوكور، فيجب إجراء التبديل

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

المقارن الدوائي الإعتمادي عادة هو قرص واحد من درونوكور 400 ملخ

مرتين في اليوم.

قرص واحد في الصباح مع وجبة الفطور.

قرص واحد في المساء مع وجبة العشاء.

إذا كنت تعتقد أن الدواء أقوى أو أضعف مما ينبغي، إحك للطبيب

أو الصيدلي عن ذلك.

#### طريقة التناول:

يجب بلغ القرص بشكله الكامل مع ماء خال وحبة الطعام.

لا يجوز شطر القرص، لا تتوفر معلومات حول سحق أو مضغ القرص.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر:

توجه حالاً إلى طبيبك أو لغرفة الطوارئ القريب. أحضر معد عليه

الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء:

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، يجب تناول جرعة

دوائية في وقت التناول المحدد التالي. لا يجوز بأي حال من الأحوال

تناول جرعة دوائية دون تأخير سوية لكتويون عن الجرعة الدوائية المنسية.

يجب الموا拙بة على العلاج حسب توصية الطبيب.

#### إذا توقفت عن تناول الدواء:

لا يجوز التوقف عن إستعمال الدواء بدون إستشارة الطبيب أو الصيدلي

حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء

والتتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع

النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلطة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، استشر

الطبيب أو الصيدلي.

## 4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن استعمال درونوكور قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين.

لا تتدنىش من قائمة الأعراض الجانبية التالية أثناء إستعمال هذا الدواء:

تم التبليل عن الأعراض الجانبية التالية أثناء إستعمال هذا الدواء:

يجب التوجيه للطبيب حالاً إذا لاحظت إحدى الأعراض الجانبية الخطيرة التالية - من الجائز أن تحتاج لمساعدة طبية طارئة

أعراض جانبية شائعة جداً (قد تظهر لدى أكثر من مستعمل

من بين 10):

قصور القلب. تم ملاحظة هذا العرض في التجارب السريرية بنفس النسبة المئوية لحوادثها لدى المتعالجين الذين تلقوا درونوكور ولدي المتعالجين الذين تلقوا علاجاً وهما (placebo). الalamات لذلك

تشمل انتفاخ في راحتي القدمين أو الرجلين، صعوبات في التنفس عند الاستنشاق أو خلال النوم، ضيق في التنفس أثناء نشاط، زيادة في الوزن.

أعراض جانبية شائعة (قد تظهر لدى 1-10 مستعملين من

بين 100):

- إسهال وقيوات عديدة التي قد تؤدي إلى مشاكل في الكلى.

- بطء نظم القلب.

أعراض جانبية غير شائعة (قد تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000):

- مرض رئوي إلتهابي (يشمل تبب وزيادة سماكة الرئتين). العلامات

لذلك تشمل ضيق في التنفس أو سعال دون بلغم.

أعراض جانبية نادرة (قد تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000):

- مشاكل في الكبد تشمل تضرر كبدية يشكل خطراً على الحياة.

العلامات تشمل: ألم أو إزعاج في منطقة المعدة (بطن)، فقدان الشهية للطعام، غثيان، تققيبات، إصفرار الجلد أو إصفرار بياض العينين (بركان)، بول بلون داكن أكثر من المعتاد، إدراك ( خاصة

باقترانها مع أعراض أخرى مذكورة هنا، حكة،

- ردود فعل تحسسية تشمل انتفاخ في الوجه، في الشفتين، في الفم، في اللسان وفي الحنجرة.

أعراض جانبية إضافية:

أعراض جانبية شائعة جداً:

- تغير في نتيجة واحدة في فحص الدم: نسبة الكرياتينين.

- تغير في نتيجة فحص التخطيط الكهربائي للقلب (ECG) (QTc Bazett prolonged).

أعراض جانبية شائعة:

- مشاكل في الجهاز الهضمي مثل: إسهال، غثيان، تقيؤ وألم بطني.

- الشعور بإرهاق.

- مشاكل في الجلد مثل طفح أو حكة.

- تغيير في نتائج فحوص وظائف الكبد في الدم.

أعراض جانبية غير شائعة:

- مشاكل أخرى في الجلد مثل إحمرار الجلد أو إكريما (احمرار، حكة، شعور بحرق أو حرقة).

- زيادة حساسية الجلد عند التعرض للشمس.

- تغير في حاسة التذوق.

## أعراض جانبية نادرة:

- فقدان حاسة التذوق.

- إلتهاب في جدار الوعاء الدموي (بما في ذلك leukocytoclastic vasculitis).

إذا ظهرت أعراض جانبية، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

بالإمكان تبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة

الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبلغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

بالإضافة لذلك، بالإمكان تبليغ شركة «يونيفارم م.ض.».

## 5) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسخيم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسخيم.

لا تسبب التقني بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد انقضاء تاريخ الصلاحية (exp. Date) الذي يظهر على ظهر العلبة /اللوحة (بليستر).

يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

التخزين: يجب التخزين دون 25 درجة مئوية وفي مكان محظى من الضوء.

## 6) معلومات إضافية

يحتوي درونوكور بالإضافة لل المادة الفعالة أيضاً على: Crospovidone, Maize starch, Mannitol, Poloxamer 407, Microcrystalline cellulose, Povidone, Magnesium stearate, Hydroxypropyl methylcellulose, Colloidal silicon dioxide, Opadry Y-1-700 (White).

كيف بيدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

دونوكور معبأً ضمن عبوات لوحة (بليستر) داخل علبة كرتون.

دونوكور هو عبارة عن أقراص مطلية، بيضاوية، محببة من كلتا الجانبيتين، لونها أبيض.

تتوفر لـ درونوكور أحجام علبة ذات 4.7. 14. 20. 28. 30، أو 60 قرصاً.

من الجائز أن تسوق كافة أحجام العلبة.

لا تحتوي هذه النشرة على كافة المعلومات عن المستحضر.

إذا توفر لديك أي سؤال أو أنت غير واثق بأمر ما، يرجى مراجعة الطبيب.

صاحب الإمكانيات وعنوانه: يونيفارم م.ض.، ص.ب. 2429،

تل أبيب، 6121301.

اسم المنتج وعنوانه: يونيفارم م.ض.، بارك المصنفة «مايكرو كريل».

تم إعدادها في شباط 2022 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: درونوكور: 165-80-35478-00.

من أجل سهولة وتهوير القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.