نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) – (1986)

يُسوَّق الدواء بدون وصفة طبيب

پارامول تارچيت, حبسولات

كل حبسولة تحتوي:

حمض الأسيتيل ساليسيليك 250 ملغ	Acetylsalicylic acid 250 mg
پاراسيتامول 250 ملغ	Paracetamol 250 mg
كافيين (بدون ماء) 65 ملغ	Caffeine (anhydrous) 65 mg

للمواد الغير فعّالة والمستأرَجة (مسببات الحساسية) في المستحضر – أنظر بند 6 **"معلومات إضافية".**

إقرأ النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات مُلخّصة عن الدواء. إذا كان لديك أسئلة إضافية, توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي. عليك تناول المستحضر حسب التعليمات في بند الجرعة في هذه النشرة. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية. عليك التوجه للطبيب في حال تفاقمت علامات المرض (أعراض) أو لم تتحسن بعد 5 أيام لعلاج الألم أو بعد 3 أيام لعلاج الألم المصحوب بالحمى (أنظر بند 3 **"كيفية استعمال الدواء؟").**

1. لأي غرض مُخصّص الدواء؟

پارامول تارچيت مُخصص لتخفيف آلام الرأس, صداع خفيف حتى متوسط المرتبط بالصداع النصفي (الميجرينا), آلام الطمث وألم المصحوب بحمى.

فصيلة علاجية:

حمض الأسيتيل ساليسيليك – مضاد التهاب غير ستيرويدي (NSAID).

پاراسيتامول – مسكّن للآلام وخافض للحرارة.

كافيين – زانثين قلوي, محفّز لجهاز الأعصاب المركزي.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال پارامول تارچيت إذا:

- **كنت حساسا** (أرجي) **للمواد الفعّالة أو لأي واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء** (أنظر بند 6 **"معلومات إضافية").**

أعراض رد الفعل التحسسي قد تشمل: الربو, أزيز أو ضيق تنفس, طفح جلدي أو الشرى, انتفاخ الوجه أو اللسان, سيلان الأنف. إذا لم تكن متأكدا, اسأل الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.

- **كنت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل** (أنظري فيما يلي **"الحمل, الإرضاع والخصوبة").**
- **كان لديك في الماضي رد فعل تحسسي لأدوية أخرى التي تُستَعمل لعلاج الألم, لالتهاب أو الحمى** مثل ديكلوفينياك أو إيبيروبرفين.
- **كنت تعاني من قرحة المعدة** أو قرحة أمعاء, أو إذا كان لديك **ماض من القرحة الهضمية.**
- لاحظت **دم في البراز أو براز أسود** (علامات نزيف أو ثقوب في الجهاز الهضمي).
- كنت تعاني من **فقر الدم أو إضطرابات أخرى في الدم.**
- كنت تعاني من **مشاكل وخيمة في القلب, في الكبد وفي الكلى.**
- كنت تتناول **أكثر من 15 ملغ ميثوتريكسات للأسبوع** (أنظر فيما يلي **"تداخلات/تفاعلات بين الادوية").**

تحذيرات خاصة بخصوص استعمال الدواء

قبل العلاج بپارامول تارچيت, أخبر الطبيب إذا:

- كنت تعاني من **صداع نصفي (ميجرينا) حاد** لدرجة **يتطلب الاستراحة في السرير,** إذا كان لديك صداع مختلف عن الصداعات النصفية المعتادة لديك, أو إذا كنت تعاني من **التقيؤ بالتزامن مع الصداعات النصفية.**
- بدأت تعاني من **الصداع بعد أو عقب إصابة** رأس, **مجهود, سعال أو الإنحناء.**
- لديك آلام رأس مزمنة (خمسة عشر يومًا أو أكثر في الشهر لمدة أكثر من ثلاثة أشهر), أو إذا عانيت من الصداع الأول بعد جيل 50 سنة.
- لم يتم تشخيصك في الماضي كمن يعاني من الصداع النصفي, لأنه قبل العلاج يجب استبعاد حالات قد تكون وخيمة, مرتبطة بالمخ أو جهاز الأعصاب.
- كنت تعاني من حالة وراثية تسمى **نقص في إنزيم G6PD (چلوكوز-6-فوسفات ديهيدروچينازا)** التي تؤثر على كريات الدم الحمراء وقد تسبّب فقر الدم, اليرقان أو تضخم الطحال, عند التعرض لأغذية معينة ولأدوية مثل أدوية معينة مضادة للالتهاب (مثل حمض الاستيتل ساليسيليك (الأسپيرين)), أو تسبّب أمراضًا أخرى.
- عانيت في الماضي من **مشاكل في الجهاز الهضمي** مثل قرحة معدة, نزيف أو براز أسود. إذا كان لديك انزعاج بطني أو حرقة بعد تناول مسكنات الألم أو مضادات الإلتهاب.
- كنت تعانين من **إضطرابات نزفية أو نزيف غير سوي من المهبل** بشكل مختلف عن الطمث (مثل نزف طمثي متواصل وشديد بشكل شاذ).
- خضعت مؤخرًا **لجراحة** (بما في ذلك الجراحات البسيطة مثل جراحة الأسنان) أو كنت ستخضع لجراحة خلال الأيام السبعة القريبة.
- كنت تعاني من **ربو البالغين, حمّى القشّ (التهاب الأنف التحسّسي), سلائل الأنف (البوليپ), مرض تنفسي مزمن أو كنت تطور أعراض حساسية** (مثل ردود فعل جلدية, حكة, شرى).
- كنت تعاني من **نقص (چاوت), السكري, فرط نشاط الغدة الدرقية, اضطرابات نظم القلب, فرط ضغط الدم غير الخاضع للسيطرة, خلل في وظائف الكلى أو الكبد.**
- كنت تعاني من **الإدمان على الكحول** (أنظر فيما يلي **"استعمال الدواء واستهلاك الكحول").**
- كنت **تتناول أدوية أخرى تحتوي على حمض الأستيتل ساليسيليك (الأسپيرين) أو الپاراسيتامول,** أو أدوية أخرى, لأن أدوية معينة قد تعيق پارامول تارچيت وتسبب أعراض جانبية (أنظر فيما يلي **"تداخلات/تفاعلات بين الادوية").**
- كنت معرّضًا **لخطر التجفاف** (مثلا : نتيجة للتقيّؤات, الإسهال, أو قبل جراحة كبيرة أو بعدها).
- كان عمرك **أقل من 18 سنة.** هنالك علاقة محتملة بين حمض الأستيل ساليسيليك (أسپيرين) ومتلازمة ريي عندما يُعطى للأطفال والمراهقين. متلازمة ريي هي متلازمة نادرة, التي تؤثر على المخ والكبد وقد تكون مميتة. لهذا السبب, لا يجوز استعمال پارامول تارچيت لدى المراهقين والأطفال تحت جيل 18 سنة بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

تحذيرات إضافية:

كما هو الحال عند تناول أيّ نوع من مسكّنات الصداع, فإن استعمال پارامول تارچيت في أوقات متقاربة جدًا (أي, لأكثر من عشرة أيام في الشهر بالنسبة لهذا الدواء) عند وجود صداع مزمن (خمسة عشر يومًا في الشهر أو أكثر), لمدة أكثر من ثلاثة أشهر قد يفاقم الصداع أو الصداع النصفي لديك.

إذا كنت تعتقد أن هذه قد تكون حالتك، توجه لطبيبك للاستشارة. قد تضطر إلى التوقف عن تناول پارامول تارچيت لكي تحل المشكلة.

قد يقلّل پارامول تارچيت من أعراض التلوّث (مثل الصداع, حرارة الجسم المرتفعة) ولذلك من الممكن أن يجعل تشخيص التلوّث أكثر صعوبة.

إذا لم تكن تشعر بأنك بحالة جيدة وعليك مراجعة الطبيب, فتذكر أن تقول له أنك تتناول پارامول تارچيت.

الأطفال والمراهقون

پارامول تارچيت غير مُخصّص للأطفال والمراهقين تحت جيل 12 سنة.

الفحوصات والمتابعة

قد يؤثر پارامول تارچيت على نتائج الفحوص المخبريّة. إذا طُلب منك إجراء فحوص للدم, للبول أو فحوص مخبريّة أخرى, فتذكّر أن تحكي أنك تتناول پارامول تارچيت.

تداخلات/تفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تأخذ, أو قد أخذت مؤخرًا, أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية, فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك, خاصّة إذا كنت تأخذ:

- **كل مستحضر آخر يحتوي على پاراسيتامول, حمض الأستيتل ساليسيليك (أسپيرين), أو أي مسكن آخر للآلام/خافض آخر للحرارة.**
- **أدوية لمنع تخثّر الدم** مثل مضادات التخثّر التي تُستعمل عن طريق الفم (مثل وارفارين), هيپارين, أدوية مذيبة للخثرة (مثل ستربيتوكينازا), أو أدوية أخرى مضادّة للصفائح (تيكلوپيدين, كلوپيدوجريل, سيلوستازول).
- **سولفونيل يوريا والإنسولين** (لعلاج السكري).
- **أدوية لعلاج النقرس (چاوت).**
- **وسائل منع الحمل التي تُعطى عن طريق الفم.**
- **أدوية لعلاج الصرع.**
- **الباربيتورات والبينزوديازيپينات** (لعلاج القلق والأرق).
- **ميتوكلوپراميد** (لعلاج الغثيان والتقيّؤات).
- **أدوية معيّنة لعلاج التلوّث** (مثل ريفامپيتسين, إيزونيازيد, كلورامفينيكول, سيپروفلوكساسين أو حمض الپيپيميديك).
- **ليڤوثيروكسين** (لعلاج قصور الغدة الدرقية).
- **كوليستيرامين** (لعلاج مستويات الكولسترول المرتفعة).
- **زيدوفودين** (لعلاج فيروس العوز المناعي البشري).
- **أدوية لعلاج فرط ضغط الدم وقصور القلب.**
- **الليثيوم, مثبّطات إعادة استيعاب السيروتونين الانتقائية (SSRI) أو فلوفوكسامين** (لعلاج الاكتئاب).
- **ثيوفيلين** (لعلاج الربو).
- **أدوية مدرّة لبول** (لزيادة إنتاج البول وتقليل فائض السوائل).
- **ميثوتريكسات** (لعلاج أنواع معيّنة من السرطان, التهاب المفاصل أو الصدفية).
- **الكورتيكوستيروئيدات** (تُستعمل لتخفيف الالتهاب).
- **أدوية لعلاج التفريغ المعدي البطيء** (مثل پروپانثيلين).
- **كلوزاپين** (لعلاج الفصام).
- **أدوية محاكية للودّي** (لرفع ضغط الدم أو لعلاج احتقان الأنف).
- **أدوية مضادة للحساسية** (لعلاج أو تخفيف الأرجيات).
- **تيربينافين** (لعلاج التلوثات الفطريّة).
- **سيميتيدين** (لعلاج حرقة المعدة والقرحة الهضمية).
- **ديسولفيرام** (لعلاج التعلق بالكحول).
- **نيكوتين** (للإقلاع عن التدخين).

استعمال الدواء والغذاء

الجرعة الموصى بها لهذا الدواء تحتوي على كمية من الكافيين مشابهة لتلك الموجودة في كأس قهوة. خلال فترة استعمال الدواء, حدّد استهلاك الأدوية, الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين لأن كمية كافيين أكبر من اللازم قد تسبّب العصبيّة, انعدام الهدوء, الأرق, وفي بعض الأحيان خفقات قلب سريعة.

يجب تناول الدواء بعد الوجبة.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول

يجب الامتناع عن استهلاك الكحول خلال فترة استعمال الدواء. إذا كنت تستهلك ثلاثة مشروبات كحوليّة أو أكثر في كل يوم, إسأل طبيبك

إذا كان عليك استعمال هذا الدواء أو أدوية أخرى لتخفيف الألم/تخفيض الحرارة, قد يسبّب الپاراسيتامول وحمض الأستيتل ساليسيليك (الأسپيرين) ضررًا للكبد ونزيفًا في المعدة.

الحمل, الإرضاع والخصوبة

إذا كنت حاملاً, تظنين أنك قد تكونين حاملاً أو تخطّطين للحمل, **أخبري طبيبك ولا تتناولي پارامول تارچيت.**

من الضروري تحديدًا عدم تناول پارامول تارچيت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل, لأن ذلك قد يضر الجنين أو يسبّب مشاكل عند الولادة.

لهذا المستحضر هناك عرض جانبي محتمل لضرر كلوي في الجنين وقلة السائل السلوي بدءًا من الأسبوع 20 للحمل. يوصى بالامتناع عن استعمال مستحضرات من فصيلة الـ - NSAIDs بدءًا من الأسبوع 20 للحمل واستشارة عضو طاقم طبي عند الحاجة.

لا يوصى باستعمال پارامول تارچيت خلال فترة الإرضاع.

استشيري الطبيب أو الصيدلي الخاص بك قبل استعمال أي دواء.

ينتمي پارامول تارچيت لفصيلة أدوية (NSAIDs) التي قد تضر بالخصوبة لدى النساء.

هذا التأثير قابل للإنعكاس عند التوقف عن تناول الدواء.

السياقة واستعمال الماكينات

لا يوجد تأثير معلوم لاستعمال پارامول تارچيت على قدرتك على السياقة واستعمال الماكينات.

إذا لاحظت أعراض جانبية مثل الدوار أو النعاس, فعليك الامتناع عن السياقة واستعمال الماكينات.

أخبر طبيبك في أقرب وقت ممكن.

3. كيفية استعمال الدواء؟

عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكّدًا من الجرعة وطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة المقبولة عادةً هي:

لعلاج الصداع المرتبط بالصداع النصفي:

البالغون: حبسولتان. إذا تم استعمال المستحضر لعلاج الصداع النصفي (الميجرينا) ولم يطرأ تحسن أو إذا طرأ تفاقم بعد الجرعة الأولى, فيجب استشارة الطبيب.

الأطفال دون جيل 18 سنة: يجب استشارة الطبيب.

لا يجوز تناول الدواء لأكثر من 48 ساعة للصداع النصفي.

للصداع, آلام الطمث والألم المصحوب بالحمى:

البالغون والأطفال فوق جيل 12 سنة: حبسولتان كل 6 ساعات.

قد يتم الشعور بتخفيف الألم خلال 15 دقيقة من لحظة تناول الجرعة.

لا يجوز تناول أكثر من 8 حبسولات خلال 24 ساعة.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

لا يجوز استعمال الدواء لفترة تزيد عن 5 أيام لعلاج الألم أو تزيد عن 3 أيام لعلاج الألم المصحوب بالحمى دون استشارة الطبيب.

المسنّون:

ليست هنالك توصية لجرعة خاصة. إذا كان وزن جسمك منخفضًا, فعليك استشارة الطبيب أو الصيدلي.

يجب بلع الحبسولة كاملة مع كأس مليئة بالماء.

لا يجوز شطر أو سحق الحبسولة. لا توجد معلومات بخصوص الشطر/السحق/المضغ.

لا يجوز الإستلقاء 30-15 دقيقة بعد تناول الدواء.

تحتوي حبسولات پارامول تارچيت على حمض الأستيتل ساليسيليك (الأسپيرين), الپاراسيتامول والكافيين. لا يجوز تناول جرعة أكبر من الجرعة الموصى بها ولا يجوز تناول أدوية أخرى التي قد تحتوي على هذه المركبات أو على مركبات أخرى تُستعمل لعلاج الألم, الإلتهاب أو الحرارة المرتفعة (الأدوية مضادة الالتهاب غير الاستيرويديّة) خلال فترة استعمال پارامول تارچيت.

إذا أفرطت بتناول الجرعة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء, توَجّه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك. إن العلاج الطبي الفوري هو أمر حاسم, **نظرًا للخطر المحتمل لضرر غير قابل للانعكاس على الكبد** بسبب الپاراسيتامول. لا تنتظر حتى ظهور الأعراض, لأن فرط الجرعة قد لا يسبّب في البداية أعراضًا يمكن ملاحظتها.

إذا ظهرت أعراض فرط الجرعة قد تكون:

- بالنسبة لحمض **الأستيتل ساليسيليك (الأسپيرين):** الدوار, الطنين في الأذنين, الصمم, التعرّق, فرط التنفس, الحرارة المرتفعة, الغثيان, التقيّؤات, الصداع, الارتباك أو انعدام الراحة, هبوط الدورة الدموية, أو الفشل التنفسي.
- بالنسبة **لپاراسيتامول:** الأعراض الأولى تكون قد تظهر – الغثيان, التقيّؤات, انعدام الشهية, الشحوب, نعاس, التعرّق وبعد ذلك ألم في البطن.
- بالنسبة **للكافيين:** القلق, العصبيّة, انعدام الراحة, الأرق, الانفعال, تقلّص العضلات, الارتباك, الاختلاجات, فرط السكر في الدم, تسارع القلب (نظم القلب السريع) أو اضطرابات في نظم القلب.

حتّى إذا لم تظهر هذه الأعراض أو إذا اختفت, فمن الضروري التوجّه لتلقي المساعدة الطبية بشكل فوري.

إذا نسيت تناول الدواء

يجب تناول الدواء عند تذكرك لكن لا تتناول جرعة مضاعفة للتعويض عن جرعة منسيّة.

لا يجوز تناول أكثر من 8 حبسولات خلال فترة 24 ساعة.

لا يجوز تناول أدوية في الظلام! يجب التحقق من الملصق والجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بخصوص استعمال الدواء, إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما في أي دواء, قد يسبب استعمال پارامول تارچيت أعراضًا جانبية لدى جزء من المستخدمين. لا تفزع من قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من الممكن أن لا تصاب بأي واحد منها.

يجب إيقاف الاستعمال والتوجه إلى الطبيب فورًا إذا كنت تعاني عرض واحد أو أكثر من الأعراض الجانبية الوخيمة التالية:

- رد فعل تحسسي مع انتفاخ في الوجه, في الشفتين, في الفم, في اللسان أو في الحنجرة.
- قد يسبّب ذلك صعوبة في البلع, أزيزًا عند التنفس, صعوبات في التنفس وشعورًا بالضغط في الصدر (علامات الربو). قد يكون لديك أيضًا طفح جلدي أو حكة, أو قد تصاب بالإغماء.
- طفح جلدي (يشمل الشرى, الحكة), احمرار الجلد, حويصلات في الشفتين, العينين أو الفم, تقشر الجلد, جروح, تقرحات في الفم.
- نزيف في المعدة أو في الأمعاء, قرحة المعدة أو قرحة في المعي, وقد تكون هذه الأعراض مصحوبة بألم بطن حاد, تغيّ دموي, براز دموي أو أسود. كما هو الحال عند العلاج بجميع مسكنات الألم وخافضات الحرارة, قد تحدث هذه الأعراض في أي وقت خلال فترة العلاج, دون سوابق وقد تكون مميتة. هذا العرض الجانبي خطير لدى المسنين بالتحديد.
- اصفرار الجلد أو العينين (علامات على الفشل الكبدي).
- دوار (علامة على ضغط الدم المنخفض).
- نظم قلبي غير منتظم.

أعراض جانبية إضافية

الأعراض الجانبية التالية تم التبليغ عنها بـ 16 بحث سريري التي تم إجراؤها على أكثر من 4,800 متعالج. أخبر طبيبك إذا كنت تلاحظ أي من هذه الأعراض الجانبية:

أعراض جانبية شائعة (common) - تظهر في لغاية 1 من بين 10 مستخدمين:

- عصبية, دوار
- غثيان, انزعاج بطني

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) - تظهر في لغاية 1 من بين 100 مستخدمين:

- أرق, ارتجاف, شعور بالخدر, صداع
- طنين في الأذنين
- جفاف في الفم, اسهال, تغيّ
- تعب, شعور بالعصبية
- ارتفاع في نظم القلب

أعراض جانبية نادرة (rare) - تظهر في لغاية 1 من بين 1,000 مستخدمين:

- ألم حلق, صعوبات بلع, شعور بالخدر أو تنمّل حول الفم, فائض لعاب
- انخفاض في الشهية, تغيرات في حاسة الذوق
- قلق, شمق, توتر
- اضطرابات في التركيز, فقدان الذاكرة, تغير في التنسيق الحركي (تنسيق الحركات)
- شعور بالألم في الوجنتين والجبين
- ألم عينين, اضطرابات رؤية
- وهجات حر, مشاكل في أوعية الدم المحيطية (مثل في الذراعين أو الرجلين)
- نزيف في الأنف, تنفس بطيء وسطحي, سيلان الأنف
- تجشؤات, انتفاخ (غازات)
- فرط التعرق, حكة, طفح جلدي مثير للحكة, ارتفاع في حساسية الجلد
- تصلب العضلات, العظام أو المفاصل; ألم رقبة, ألم ظهر, تشنّج عضلات
- ضعف, انزعاج في الصدر

أعراض جانبية شيوعها غير معروف (أعراض جانبية لم يتم تحديد شيوعها بعد): الأعراض المذكورة فيما يلي قد تم التبليغ عنها منذ بدء تسويق الدواء. بشكل عام لا يمكن تحديد مدى شيوعها بدقة في فترة المتابعة خلال المدة الزمنية التي تلي التسويق, ولذلك تم ذكر شيوعها على أنه "غير معروف".

- عدم راحة, شعور عام غير جيد أو غير سويّ
- نعاس, صداع نصفي
- احمرار الجلد, طفح جلدي. تم التبليغ عن حالات نادرة جدًا من ردود فعل جلدية وخيمة.
- خفقان قلب, ضيق تنفس, صعوبات فجائية في التنفس وشعور بالضغط في الصدر مع أزيز أو سعال (ربو)
- ألم بطن, انزعاج بطني بعد الوجبات
- ارتفاع في انزيمات الكبد

إذا ظهر عرض جانبي, إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في هذه النشرة, عليك استشارة طبيبك.

التبليغ عن أعراض جانبية:

يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض عقب علاج دوائي" الموجود في صفحة البيت لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجه لنموذج الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية, أو عن طريق الدخول للرابط: https://sideeffects.health.gov.il بالإضافة, يمكن التبليغ لشركة پاداچيس بواسطة العنوان التالي: Padagis.co.il

5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! هذا الدواء وكل دواء آخر يجب حفظه في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع ومجال نظرهم وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ دون أمر صريح من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp.date) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- **شروط التخزين:** خزّن في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية.
- بعد الفتح لأول مرة يمكن الاستعمال خلال 9 أشهر, لكن في موعد لا يتجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية.
- لا يجوز التخلص من الأدوية عن طريق المجاري أو سلة المهملات البيتية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد قيد الاستعمال. تساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

- **إضافة إلى المواد الفعّالة يحتوي الدواء أيضًا:**

Microcrystalline cellulose, hypromellose, stearic acid, crospovidone, titanium dioxide, pregelatinized starch, propylene glycol, povidone, carnauba wax, saccharin sodium, blue No. 1 FD&C lake.

- **كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:** الدواء يأتي بقنينات تحتوي 24, 50 أو 100 حبسولة مع الوسم "L374" في جهة واحدة. قد لا تكون جميع أحجام العبوة مُسوّقة. تحتوي العبوة ماص للرطوبة. لا يجوز بلع ماص الرطوبة أو إخراجه من القنينة.
- **صاحب التسجيل وعنوانه:** وكالات پاداچيس إسرائيل م.ض, شارع راكيفيت 1 شوهم.
- **إسم المنتج وعنوانه:** شركة پيرچو, أليجان, ميشيجان, الولايات المتحدة.
- **رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:** 14079.32024
- تم التنقيح في آذار 2022 حسب تعليمات وزارة الصحة.

من أجل التبسيط وتسهيل القراءة, تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. بالرغم من ذلك, الدواء مُخصص لكلا الجنسين.

09.03.22