

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) - 1986

يُسَوَّق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

أوكسار® بِلوس أقراص

كل قرص يحتوي على:

لوسارتان بوتاسيوم 50 ملغ
هيدروكلوروثيازيد 12.5 ملغ
Losartan Potassium 50 mg
Hydrochlorothiazide 12.5 mg

لقائمة المواد غير الفعالة والمثيرة للحساسية أنظر البند "معلومات مهمّة عن قسم من مركّبات أوكسار بِلوس" والفصل 6 "معلومات إضافية".

اقرأ هذه النشرة بامعان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء.

- تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخّصة عن أوكسار بِلوس. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، اسأل طبيبك أو الصيدلي.
- هذا الدواء وصف لك. لا تعطه إلى آخرين. فهو قد يسبب الضرر لهم، حتى إذا بدا لك تشابه بين حالتك وحالتهم الصحيّة.

أوكسار بِلوس غير مخصص للأطفال والمراهقين تحت جيل 18 سنة.

1. لأي غرض مُخصص أوكسار بِلوس؟

أوكسار بِلوس مخصص لعلاج فرط ضغط الدم، وأيضًا لخفض الاختطار (احتمال الخطر) لسكتة لدى مرضى لديهم ضغط دم مرتفع وسماكة البطين الأيسر (البطين الرئيسي) للقلب.

الفصيلة العلاجية: أوكسار بِلوس هو دمج من مُحصّر مستقبل الأنجيوتنسين II (لوسارتان) ومدر للبول من نوع ثيازيد (هيدروكلوروثيازيد). أنجيوتنسين II هي مادة يتم إنتاجها في الجسم، ترتبط للمستقبلات الموجودة في الأوعية الدموية وتؤدي لتضيّقها. نتيجة لذلك يحدث ارتفاع في ضغط الدم. يمنع لوسارتان ارتباط أنجيوتنسين II مع هذه المستقبلات ويؤدي إلى ارتخاء الأوعية الدموية، وبالتالي إلى انخفاض ضغط الدم. يعمل هيدروكلوروثيازيد من خلال جعل الكلى تنقل عن طريقها كمية أكبر من الماء والملح. يساعد هذا الأمر أيضًا في خفض ضغط الدم.

2. قبل تناول أوكسار بِلوس

لا تتناول أوكسار بِلوس إذا:

- كنت حساسًا (لديك فرط حساسية) للوسارتان، هيدروكلوروثيازيد أو لأي واحد من المركبات الأخرى لهذا الدواء (المذكورة في البند 6)،
- كنت أرجي لمواد أخرى التي هي مشتقات السولفوناميدات (على سبيل المثال: ثيازيدات أخرى، جزء من الأدوية المضادة للجراثيم مثل كو-تريموكسازول، اسأل طبيبك إذا لم تكن متأكدًا)،
- لديك خلل وخيم في وظيفة الكبد،
- لديك مستويات منخفضة من البوتاسيوم، مستويات منخفضة من الصوديوم أو مستويات مرتفعة من الكالسيوم، التي لا يمكن تصحيحها عن طريق علاج،
- كنت تعاني من داء النقرس،
- كنت حاملًا أكثر من 3 شهور. (يفضل أيضًا الامتناع عن أوكسار بِلوس في بداية الحمل، أنظري بند "الحمل والإرضاع")،
- لديك إصابة وخيمة بوظيفة الكلى أو أن كليتك لا تنتجان بول أبدًا،
- لديك سكري أو خلل في الوظيفة الكلوية وأنت تتعالج بدواء لخفض ضغط الدم الذي يحتوي على أليسيكربن.

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال أوكسار بِلوس

تحدث مع طبيبك، أو مع الصيدلي، قبل تناول أوكسار بِلوس.

إذا كنت تشعر بانخفاض في الرؤية أو ألم في العين. قد تكون هذه أعراض تراكم سوائل في طبقة الأوعية الدموية في العين (choroidal effusion) أو أعراض ارتفاع الضغط في العين، ومن الممكن أن تظهر هذه الأعراض خلال ساعات حتى أسابيع من تناول أوكسار بِلوس. إذا لم يتم علاج هذه الحالة، فإنها ممكن أن تؤدي إلى فقدان دائم للرؤية. إذا عانيت في الماضي من حساسية للبنسيلين أو للسولفوناميد، قد تكون معرضًا لخطر أعلى لتطور هذه الأعراض لديك.

يجب عليك إخبار طبيبك إذا كنت تعتقد بأنك حامل (أو قد تحمّلين). أوكسار بِلوس غير موصى به في بداية الحمل، ويُمنع تناوله بعد الشهر الثالث من الحمل، لأنه قد يسبب ضررًا وخيمًا لطفلك إذا تم تناوله في هذه المرحلة (أنظري بند "الحمل والإرضاع").

قبل العلاج بـ أوكسار بِلوس، من المهم إخبار طبيبك إذا:

- كانت لديك مشاكل تنفس أو مشاكل صحيّة (وهذا يشمل التهاب أو سائل في الرئتين) بعد تناول هيدروكلوروثيازيد في الماضي. إذا تطوّر لديك ضيق تنفس خطير أو صعوبات تنفس بعد تناول أوكسار بِلوس، توجه فورًا للحصول على علاج طبي؛
- عانيت في الماضي من انتفاخ الوجه، الشفتين، الحلق أو اللسان؛

- كنت تتناول مدرات للبول؛
- كنت بحمية قليلة الملح؛
- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من تقيؤ و/أو إسهال وخيم؛
- يوجد لديك فشل قلب؛
- عمل كبدك مختل (أنظر بند 2 "لا تتناول أوكسار بولوس إذا")؛
- يوجد لديك تضيق في الشرايين المؤدية لكليتيك (تضيق في شرايين الكلية) أو إذا يوجد لديك فقط كلية واحدة تعمل، أو إذا مررت بزرع كلية مؤخرًا؛
- يوجد لديك تضيق في الشرايين (التصلب العصيدي)، ذبحة صدرية (آلام في الصدر نتيجة ضعف أداء القلب)؛
- يوجد لديك "تضيق في الصمام الأبهري أو التاجي" (تضيق صمامات القلب) أو "تضخم إعتلالي بعضلة القلب" (مرض الذي يسبب تضخين عضلة القلب)؛
- كنت مريض سكري؛
- كان لديك داء النقرس؛
- يوجد لديك أو كانت لديك حالة حساسية، ربو أو وضع الذي يُسبب لك آلام مفاصل، طفح في الجلد وسخونة ([lupus] ذئبة احمرارية جهازية)؛
- يوجد لديك مستويات مرتفعة من الكالسيوم أو مستويات منخفضة من البوتاسيوم أو أنك بحمية قليلة البوتاسيوم؛
- كنت بحاجة للمرور بتخدير (حتى عند طبيب أسنان) أو قبل عملية جراحية، أو إذا كنت بصدد إجراء فحوصات لوظيفة الغدة الدرقية (الغدة المُجاوِرة للدرقية)، يجب عليك إخبار طبيبك أو الفريق الطبي بأنك تتناول أقراص أوكسار بولوس؛
- كنت تعاني من فرط الألدوستيرونية الأولى (متلازمة تتعلق بزيادة إفراز هرمون الألدوستيرون من الغدة الكظرية، الناجمة عقب خلل بالغدة الكظرية)؛
- كنت تتناول أحد هذه الأدوية التالية المُستعملة لعلاج ضغط الدم المرتفع:
 - مثبط ACE (على سبيل المثال، إنالابريل، ليزينوبريل، رامبيرييل)، خصوصًا إذا كان لديك مشاكل في الكلى المرتبطة بالسكري؛
 - أليسكرين.
- قد يقوم طبيبك بفحص وظائف الكلى لديك، ضغط الدم، وكمية الكهارل (على سبيل المثال، بوتاسيوم) في دمك بفترات زمنية ثابتة. أنظر أيضًا معلومات تحت العنوان "لا تتناول أوكسار بولوس إذا"؛
- كنت تتناول أدوية أخرى التي يمكن أن ترفع مستويات البوتاسيوم في مصل الدم (أنظر البند 2 "تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية").
- تعرضت في الماضي لمرض سرطان الجلد، أو إذا تطورت لديك إصابة غير متوقعة في الجلد خلال استعمال الدواء. إن استعمال هيدروكلوروثيازيد، بالأخص للمدى الطويل وبمقادير دوائية مرتفعة قد يزيد من خطورة تطوّر أنواع معينة من سرطان الجلد والشفنتين (سرطان جلد من نوع غير الميلانوما). يجب حماية الجلد من التعرض للشمس والأشعة فوق البنفسجية (UV) خلال استعمال أوكسار بولوس.

تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول، تناولت في الآونة الأخيرة، أو قد تتناول أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، عليك إخبار الطبيب المعالج أو الصيدلي بذلك.

أخبر طبيبك إذا كنت تتناول مُكمّلات بوتاسيوم، بدائل الملح التي تحتوي على البوتاسيوم، أدوية خازنة للبوتاسيوم، أو أدوية أخرى التي يمكن أن ترفع مستويات البوتاسيوم في مصل الدم (على سبيل المثال، أدوية التي تحتوي على تريميثوبريم)، التي دمجهما مع أوكسار بولوس غير موصى به.

قد يحدث تفاعل بين مواد مدرّة للبول مثل الهيدروكلوروثيازيد الموجود بأوكسار بولوس وبين أدوية أخرى.

لا يجوز تناول أوكسار بولوس بالدمج مع أدوية التي تحتوي على ليثيوم دون إشراف ملازم من طبيبك.

وسائل حذر خاصة (على سبيل المثال، فحوصات دم) قد تُلائم إذا كنت تتناول مدرات بول أخرى، أنواع معينة من المسهلات، أدوية لعلاج النقرس، أدوية للتحكم بنظم القلب أو للسكري (أدوية للإعطاء عن طريق الفم أو إنسولين).

من المهم أيضًا أن يعلم طبيبك إذا كنت تتناول:

- أدوية أخرى لخفض ضغط الدم لديك
- ستيرويدات
- أدوية لعلاج السرطان
- مسكنات آلام
- أدوية لعلاج تلوّثات فطرية
- أدوية لعلاج التهاب المفاصل (arthritis)
- مستحضرات التي تحتوي على راتينات لعلاج الكولسترول المرتفع، مثل كوليستيرامين
- أدوية لإرخاء العضلات
- حبوب منومة
- أدوية أفيونية مثل مورفين
- "pressor amines" مثل أدريبالين أو أدوية أخرى من نفس المجموعة
- أدوية للسكري للإعطاء عن طريق الفم أو إنسولين

قد يضطر طبيبك لتغيير الجرعة و/أو اتخاذ وسائل حذر أخرى:
إذا كنت تتناول مثبط ACE أو أليسكيرين (أنظر أيضًا معلومات تحت العنوان "لا تتناول أوكسار بولوس إذا" و- "تحذيرات خاصة بخصوص استعمال أوكسار بولوس").

الرجاء أخبر طبيبك بأنك تتناول أوكسار بولوس أيضًا إذا كنت بصدد المرور بتصوير وستعطى لك مادة تباين تحتوي على يود.

تناول أوكسار بولوس مع الطعام

كميات مبالغ بها من الملح في الطعام قد تنقض تأثير أقراص أوكسار بولوس.
يمكن تناول أقراص أوكسار بولوس مع أو بدون طعام.

تناول أوكسار بولوس واستهلاك الكحول

يوصى بعدم شرب الكحول أثناء تناول هذه الأقراص: الكحول وأقراص أوكسار بولوس قد يُعززان تأثير بعضهما البعض.

الحمل والإرضاع

الحمل

يجب عليك إخبار طبيبك إذا كنت تعتقدين بأنك حامل (أو قد تحملين). طبيبك سيوصي لك عادةً بإيقاف تناول أوكسار بولوس قبل دخولك في الحمل أو بلحظة علمك بأنك حامل وسيوصي لك بتناول دواء آخر مكان أوكسار بولوس. أوكسار بولوس غير موصى به أثناء الحمل، ويُمنع تناوله بعد الشهر الثالث من الحمل، لأنه قد يسبب ضررًا وخيمًا لطفلك إذا تم تناوله بعد الشهر الثالث من الحمل.

الإرضاع

أخبري طبيبك إذا كنت مرضعة أو بصدد البدء بالإرضاع. أوكسار بولوس غير موصى به للأمهات مرضعات، وطبيبك قد يختار لأجلك علاجًا آخرًا إذا كنت تريدين الإرضاع.

الأطفال والمراهقون

لا توجد معلومات بخصوص استعمال أوكسار بولوس لدى الأطفال. ولذلك، لا يجوز إعطاء أوكسار بولوس للأطفال.

الاستعمال لدى البالغين

أوكسار بولوس يعمل ويُحتمل جيدًا بشكل متساو من قبل أغلبية المرضى البالغين المسنين والأكثر شبابًا. غالبية المرضى البالغين يحتاجون نفس الجرعة كما للمرضى الأكثر شبابًا.

السياقة واستعمال الآلات

عندما تبدأ العلاج بهذا الدواء، لا يجوز تنفيذ مهام التي تتطلب اهتمامًا خاصًا (على سبيل المثال، سياقة مركبة أو تشغيل آلات خطرة) إلى أن تعرف كيف تستجيب للدواء.

معلومات مهمة بخصوص جزء من مركبات أوكسار بولوس

أقراص أوكسار بولوس تحتوي على بوتاسيوم (لمحتوى البوتاسيوم، انظر بند 6).

أقراص أوكسار بولوس تحتوي على لاكتوز (لمحتوى اللاكتوز، انظر بند 6).

إذا قيل لك من قبل طبيبك بأن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، اتصل بطبيبك قبل تناول هذا الدواء.

3. كيف تستعمل أوكسار بولوس؟

يجب دائمًا تناول أوكسار بولوس وفقًا لتعليمات الطبيب. عليك التأكد من الطبيب أو الصيدلي الخاص بك إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة تناول الدواء.

من المهم الاستمرار بأخذ أوكسار بولوس ما دام طبيبك يصفه لك للحفاظ على السيطرة على ضغط دمك.

يمكن تناول أوكسار بولوس مع أو بدون طعام.

يجب بلع الأقراص مع كأس من الماء.

الجرعة وطريقة العلاج يُحددان من قبل الطبيب فقط.

الجرعة الاعتيادية العادية هي:

فرط ضغط الدم

الجرعة الاعتيادية من أوكسار بولوس لأغلبية المرضى مع ضغط دم مرتفع هي قرص واحد من أوكسار بولوس مرة في اليوم، وذلك للسيطرة على ضغط الدم لمدة 24 ساعة. الجرعة اليومية القصوى هي قرصين في اليوم من أوكسار بولوس، مرة في اليوم.

مرضى مع ضغط دم مرتفع وسماكة البطين الأيسر للقلب

تُحدد الجرعة من قبل الطبيب فقط.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

خط الإشارة ليس مخصصًا لشطر القرص.

لا توجد معلومات بخصوص سحق/مضغ/شطر الأقراص.

إذا تناولت أوكسار بولوس أكثر مما كنت بحاجة إليه
جرعة مفرطة قد تؤدي إلى هبوط في ضغط الدم، خفقان قلب، نبض بطيء، تغييرات في تركيب الدم وجفاف.
إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا بلغ طفل من الدواء عن طريق الخطأ، توجه فوراً إلى غرفة الطوارئ في المستشفى مصطحباً عبوة الدواء معك.

إذا نسيت تناول أوكسار بولوس

احرص على تناول أوكسار بولوس كل يوم كما وُصف لك. لكن، إذا نسيت تناول الجرعة، لا تتناول جرعة إضافية. فقط عد إلى الجدول الزمني الاعتيادي للتناول.
يجب المداومة على العلاج كما أوصى الطبيب.

من المهم الاستمرار بتناول أوكسار بولوس طالما وصفه لك طبيبك للحفاظ على السيطرة على ضغط دمك.

لا يجوز تناول أدوية في الظلام! يجب التحقق من المصق والجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظرات الطبية إذا كنت بحاجة لها.
إذا كانت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، اسأل الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.

4. الأعراض الجانبية

ككل دواء، قد يسبب أوكسار بولوس أعراضاً جانبية لدى جزء من المستخدمين.
لا تفزع من قراءة قائمة الأعراض الجانبية، من الممكن ألا تصاب بأي واحدة منها.

يجب التوقف عن استعمال الدواء والتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ القريبة إذا ظهر:
رد فعل أرجي وخيم (طفح، حكة، تورم الوجه، الشفتين، الفم أو الحلق الذي قد يسبب صعوبة في البلع أو التنفس).
هذا هو عرض جانبي وخيم لكن نادر، الذي يؤثر على أكثر من 1 من بين 10,000 متعالم لكن ليس على أقل من 1 من بين 1,000 متعالم. من الممكن أن تحتاج لعلاج طبي طارئ أو المكوث في المستشفى.

نادرة جداً (ممكن أن تؤثر على حتى 1 من بين 10,000 شخص):
ضائقة تنفسية حادة (علامات التي تشمل ضيق تنفس شديد، سخونة، ضعف وارتباك).

أعراض جانبية أخرى التي ممكن أن تحدث:

شائعة (قد تؤثر على حتى 1 من بين 10 أشخاص):

- سعال، التهاب مجاري التنفس العليا، احتقان في الأنف، التهاب الجيوب الأنفية، مشاكل في الجيوب الأنفية؛
- إسهال، ألم بطن، غثيان، مشاكل في الهضم؛
- آلام عضلات أو تشنجات، ألم في الرجل، آلام الظهر؛
- أرق، صداع، دوام؛
- ضعف، تعب، آلام في الصدر؛
- ارتفاع بمستوى البوتاسيوم في الدم (الذي قد يؤدي إلى نظم قلب غير سليمة)، انخفاض بمستويات الهيموجلوبين؛
- تغييرات بوظيفة الكلى، بما في ذلك فشل الكلى؛
- سكر منخفض أكثر مما ينبغي في الدم (hypoglycemia).

غير شائعة (قد تؤثر على حتى 1 من بين 100 شخص):

- فقر دم، نقاط حمراء أو بنية على الجلد (أحياناً بشكل خاص على القدمين، الرجلين، الذراعين والمؤخرة، مع آلام في المفاصل، انتفاخ اليدين والقدمين وألم في البطن)، كدمات، انخفاض بخلايا الدم البيضاء، مشاكل في تخثر الدم، انخفاض بعدد الصفائح؛
- فقدان الشهية، ارتفاع بمستويات حمض اليوريك أو النقرس (gout)، ارتفاع بمستويات السكر بالدم، مستويات شاذة من الشوارد الكهربائية في الدم؛
- قلق، عصبية، اضطراب دُعر (نوبات دُعر متكررة)، ارتباك، اكتئاب، أحلام شاذة، اضطرابات نوم، نعاس، إصابة بالذاكرة؛
- شعور "دبابيس وإبر" أو أحاسيس مشابهة، آلام في الأطراف، رجفة، شقيقة، إغماء؛
- تشوش الرؤية، شعور بالحرقة أو وخز في العينين، التهاب اللحمية، تدهور الرؤية، رؤية الأشياء بلون أصفر؛
- رنين، طنين، زئير أو نقر في الأذنين، دوام (فيرتجو)؛
- ضغط دم منخفض، الذي قد يكون متعلقاً بتغيرات بالوضعية (شعور بالدوار أو الضعف عند الوقوف)، ذبحة صدرية (ألم في الصدر)، نظم قلب غير سليم، سكتة دماغية (TIA - نوبة دماغية عابرة، "سكتة دماغية مصغرة")، نوبة قلبية، خفقان قلب؛
- التهاب الأوعية الدموية المصحوب بأحيان قريبة بطفح في الجلد أو كدمات؛
- ألم حلق، ضيق تنفس، التهاب القصبات الهوائية، التهاب الرئتين، ماء في الرئتين (الذي يسبب صعوبة بالتنفس)، نزيف من الأنف، رشح، احتقان؛
- إمساك، إمساك صعب، غازات، عدم راحة في البطن، تشنجات في البطن، تقيؤات، جفاف في الفم، التهاب في غدة اللعاب، ألم أسنان؛
- يرقان (اصفرار العينين والجلد)، التهاب البنكرياس؛
- شرى، حكة، التهاب الجلد، طفح، احمرار الجلد، حساسية للضوء، جفاف في الجلد، تورّد (احمرار الوجه)، تعرق، تساقط شعر؛
- ألم في الذراعين، الكتفين، الفخذين، الرُكْب أو مفاصل أخرى، انتفاخ في المفاصل، تيبُّس، ضعف عضلات؛
- كثرة التبول بما في ذلك في الليل، وظيفة كلى غير سليمة بما في ذلك التهاب الكلى، تلوث في المجاري البولية، سكر في البول؛
- انخفاض الرغبة الجنسية، عانة (عجز جنسي)؛

- انتفاخ الوجه، انتفاخ موضعي (وذمة)، سخونة.

نادرة (قد تؤثر على حتى 1 من بين 1,000 شخص):

- التهاب الكبد (Hepatitis)، فحوصات وظائف كبد شاذة.

غير معروفة (لا يمكن تقدير الشيع من المعلومات الموجودة):

- أعراض تشبه الإنفلونزا؛
- آلام عضلات غير مبررة مع بول داكن (بلون الشاي) (إحلال الريدات)؛
- مستويات منخفضة من الصوديوم في الدم (hyponatremia)؛
- شعور عام غير جيد؛
- اضطرابات بحاسة الذوق؛
- سرطان الجلد والثفتين (سرطان جلد من نوع غير الميلانوما)؛
- انخفاض في الرؤية أو آلام في العينين نتيجة ضغط مرتفع (علامات محتملة لتراكم سوائل في طبقة الأوعية الدموية في العين (choroidal effusion) أو زرق حاد ضيق الزاوية).

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أي واحد من الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

يمكن التبليغ عن الأعراض الجانبية لوزارة الصحة عن طريق الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) المُوجه للاستشارة الإلكترونية، أو عن طريق الدخول للرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين أوكسار بلس؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء، ككل دواء آخر، في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وبذلك تمنع التسمم. لا تسبّب التقبيل بدون تعليمات صريحة من الطبيب. لا يجوز استعمال أوكسار بلس بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر المسجل. لا يجوز التخزين بدرجة حرارة تزيد عن 30 درجة مئوية. يجب التخزين في العبوة الأصلية من أجل الحماية من الضوء والرطوبة. لا يجوز التخلص من الأدوية عن طريق مصرف المياه أو النفايات المنزلية. أسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد لها ضرورة. هذه الخطوات تساهم في الحفاظ على جودة البيئة.

6. معلومات إضافية

إضافة إلى المواد الفعالة يحتوي الدواء أيضًا على:

Microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, pregelatinized maize starch, magnesium stearate, hydroxypropyl cellulose, hypromellose, titanium dioxide, quinoline yellow aluminum lake, carnauba wax.

أوكسار بلس يحتوي على بوتاسيوم بالكمية التالية: 4.24 ملغ (0.108 ميلي مكافئ). أوكسار بلس يحتوي على لاكتوز أحادي الإماهة بالكمية التالية: 63.13 ملغ.

كيف يبدو أوكسار بلس ومحتوى العبوة

أوكسار بلس هو قرص مطلي، أصفر، بيضوي، مختوم بـ "717" من جانب واحد ومع خط إشارة من الجانب الثاني.

أحجام العبوات:

أوكسار بلس أقراص: 10 أو 30 قرص في العبوة.

قد لا يتم تسويق جميع أحجام العبوات.

المنتج: أورجنون LLC، نيو جيرسي، الولايات المتحدة

صاحب التسجيل وعنوانه:

أورجنون فارما إسرائيل م.ض.، عتير يداع 1، كفار سابا

تم تحريرها في تموز 2022 وفق تعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 111.23.29411

للتبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة الذكر. بالرغم من ذلك، الدواء مُخصص لكلا الجنسين.