

بإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجه إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

6. الحيوانات المستهدفة الدجاج.

7. طريقة الإعطاء والمقدار الدوائي 30 ملغ مادة فعالة لكل كيلوغرام وزن حي في مياه الشرب (300) غرام محلول لكل طن وزن حي). بإعطاء مرکز في مياه الشرب لمدة 6-8 ساعات لمدة 3-5 أيام أو حسب توصيات الطبيب البيطري المعالج.

فيما يلي قائمة المقادير الدوائية حسب وزن الطيور:

| حجم المحلول للليوم (مل) | وزن المحلول للليوم (غرامات) | Gram المادة الفعالة لليوم | وزن الطيور |
|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 270 | 300 | 30 | 1 طن |
| 535 | 600 | 60 | 2 طن |
| 800 | 900 | 90 | 3 طن |
| 1070 | 1200 | 120 | 4 طن |

8. كيفية إستعمال المستحضر

لإعطاء في مياه الشرب حسب التعليمات في البند 7.
يجب تحضير محلول طازج كل يوم.

9. زمن الانتظار

زمن الانتظار في الدجاج: 7 أيام.

10. تحذيرات

لا توجد

يسوق الدواء بموجب وصفة

طبيب بيطري فقط

للإستعمال لدى الحيوانات فقط

1. إسم الدواء البيطري، شكله وعياره

فيبروكول 10% بيطري

PHIBROCOL 10% Veterinary محلول للإعطاء بمياه الشرب

2. المادة الفعالة وكيفيتها في وحدة مقدار دوائي

فلورفينيكول 11.22% w/v

يحتوي 1 غرام محلول (يساوي بالقيمة لـ 0.89 مل) على 100 ملغ فلورفينيكول

لقائمة المواد غير الفعالة في المستحضر - أنظروا الفقرة 13 «معلومات إضافية».

3. لأي غرض مخصص الدواء؟

هذا الدواء مخصص لعلاج التلوثات الحساسة للفلورفينيكول في الدجاج.

الفصيلة العلاجية: مضاد حيوي من فصيلة الأمفينيكولات (Amphenicols) ذو فعالية واسعة النطاق ضد جراثيم غرام إيجابية وغرام سلبية.

4. موانع الإستعمال

لا يجوز الإستعمال في الدجاجات التي تضع البيض للأكل لدى البشر.

لا يجوز الإعطاء لطيور التكاثر، قد يسبب المستحضر لوفيات الأجيحة وإنخفاضاً حاداً في التفقيس.

لا يجوز الإستعمال في حال وُجدت حساسية مفرطة للمادة الفعالة فلورفينيكول أو لكل واحد من مركبات الدواء.

5. الأعراض الجانبية

شوهد إنخفاض في إستهلاك الطعام والماء بعد الإستعمال وكذلك براز رخو (أسهال) وقد إختفت هذه مع وقف العلاج.

11. تعليمات التخزين

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال روئية الأطفال و/أو الرضع وهكذا تتفادى إصابتهم بالتسمم.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد تاريخ إنتهاء الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ إنتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- الثبات في مياه الشرب: 24 ساعة.
- ثبات المستحضر بعد الفتح لأول مرة: 48 ساعة.
- شروط التخزين: خزن بمكان مظلل، دون 25 درجة مئوية.

12. تعليمات بشأن إبادة المستحضر /بقايا المستحضر بعد انتهاء الاستعمال

- يجب التخلص من أي مستحضر بيطري طبي غير مستعمل أو أي مادة لا لزوم لها ناتجة عن إستعمال منتج بيطري طبي كنفايات سامة، ولا يجوز رميها في المجاري.

13. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المادة/المواد الفعالة يحتوي الدواء على:
Polyethylene glycol, Propylene glycol, Soluphor p (pyrrolidone)

- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة: قنينة تحتوي على سائل مائل للأصفر.
- أحجام العلب: 1 كلغ
- صاحب الإمتياز: أبيك للمنتجات البيطرية، ص.ب. 489، المنطقة الصناعية بيت شيمش

تم إعداد هذه النشرة في كانون الثاني 2022 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 169-01-35774-00