

התרופה משווקת על פי מרשם  
רופא וטרינר בלבד  
לשימוש בבעלי חיים בלבד

## 1. שם התרופה הווטרिनרית, צורתה וחוקה

פירבוקול 10% וטרינרי  
PHIBROCOL 10% Veterinary  
תמיסה למתן במי שתייה

## 2. חומר פעיל וכמותו ביחידת מינון פלורפניקול 11.22% w/v

Florfenicol 11.22% w/v  
1 גרם תמיסה (שווה ערך ל- 0.89 מ"ל) מכיל 100 מ"ג פלורפניקול  
לרשימת החומרים הבלתי פעילים בתכשיר – ראו בסעיף 13 "מידע נוסף".

## 3. למה מיועדת התרופה?

תרופה זו מיועדת לטיפול בזיהומים הרגישים לפלורפניקול בתרנגולות.

**קבוצה תרפויטית:** אנטיביוטיקה ממשפחת האמפניקולים (Amphenicols) בעלת פעילות רחבת טווח כנגד חיידקים גרם חיוביים וגרם שליליים.

## 4. התוויות נגד

אין להשתמש בתרנגולות המטילות ביצים למאכל אדם.

אין לתת לעופות רבייה, התכשיר עלול לגרום לתמותת עוברים וירידה חדה בבקיעה.

אין להשתמש במקרה של רגישות יתר לחומר הפעיל פלורפניקול או לכל אחד ממרכיבי התרופה.

## 5. תופעות לוואי

ירידה בצריכת המזון והמים וכן לשלשת רכה (שלשול) נצפו לאחר שימוש ונעלמו עם הפסקת הטיפול.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

## 6. חיות מטרה

תרנגולות.

## 7. צורת המתן ומינון

30 מ"ג חומר פעיל לקילוגרם משקל חי במי השתייה (300 גרם תמיסה לכל טון משקל חי). בנתינה מרוכזת במי השתייה ל- 6-8 שעות במשך 3-5 ימים או על פי המלצת הווטרנר המטפל.

להלן טבלת מינונים לפי משקל העופות:

משקל העופות	גרם חומר פעיל ליום	משקל תמיסה ליום (גרמים)	נפח תמיסה ליום (מ"ל)
1 טון	30	300	270
2 טון	60	600	535
3 טון	90	900	800
4 טון	120	1200	1070

## 8. אופן השימוש בתכשיר

למתן במי השתייה לפי ההוראות בסעיף 7.

יש להכין תמיסה טרייה מדי יום.

## 9. זמן המתנה

זמן המתנה בתרנגולות: 7 ימים.

## 10. אזהרות

אין

## 11. הוראות אחסון

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור, הרחק מהישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.

- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.

- יציבות במי שתייה: 24 שעות.

- יציבות התכשיר לאחר פתיחה ראשונה: 48 שעות.

- תנאי אחסון: אחסן במקום מוצל, מתחת ל- 25°C.

## 12. הוראות בדבר השמדת התכשיר/ שאריות התכשיר בתום השימוש

- כל תכשיר וטרינרי רפואי שלא השתמשו בו או כל חומר מיותר שהתקבל משימוש במוצר וטרינרי רפואי יש להשמיד כפסולת רעילה, אין להשליך לביוב.

## 13. מידע נוסף

נוסף על החומר(ים) הפעיל(ים) התרופה מכילה גם: Polyethylene glycol, Propylene glycol, Soluphor p (pyrrolidone)

- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה: בקבוק המכיל נוזל צהבהב.

- גודלי האריזות: 1 ק"ג

- בעל הרישום:** אביק תוצרים וטרינריים, ת.ד. 489 אזור תעשייה בית שמש

**עלון זה נערך בינואר 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.**

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 169-01-35774-00