

كساريلتو 10 ملغ

أقراص مطلية

يحتوي كل قرص على:

ريفاروكسابان 10 ملغ (Rivaroxaban 10 mg)

المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر: انظر الفقرة 6 " معلومات إضافية " والفقرة 2 " معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء " .

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء، تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

بالإضافة للنشرة، تتوفر للمستحضر كساريلتو 10 ملغ بطاقة معلومات حول الأمان للمعالج، تحتوي هذه البطاقة على معلومات هامة التي يتوجب عليك معرفتها قبل بدء العلاج وخلال العلاج بـ كساريلتو 10 ملغ والتصرف وفقاً.

يجب قراءة بطاقة المعلومات حول الأمان للمعالج والنشرة للمستهلك بتمعن قبل بدء إستعمال المستحضر.

يجب حفظ البطاقة والنشرة لقراءتها بتمعن ثانية إذا دعت الحاجة.

وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك، لا تعطيه للأخرين، فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

كساريلتو 10 ملغ مخصص لـ:

- منع تكوّن خثرات دموية في الأوردة، لدى كبار بعد عملية جراحية إختيارية لتبديل ورك أو ركة.

- منع عودة الخثرات الدموية في أوردة الرجلين (جلطة الأوردة العميقة) وفي الأوعية الدموية للرتنتين (إنصمام رئوي) بعد إتمام 6 أشهر علاجية لجلطة الأوردة العميقة أو إنصمام رئوي سابق.

الفصيلة العلاجية: ينتمي كساريلتو 10 ملغ إلى فصيلة أدوية تسمى مضادات التخثر ويعمل عن طريق تقليل قابلية تشكل خثرات دموية وذلك بواسطة تثبيط العامل الذي يتدخل في مسيرة التخثر (عامل 10a).

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (اليرجي) لـ ريفاروكسابان أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء، لقائمة المركبات غير الفعالة، انظر الفقرة 6 " معلومات إضافية " .
- كنت تعاني من نزف زائد.
- وُجد لديك مرض أو حالة بعضو في الجسم يزيدان الخطورة لحدوث نزف جدي (مثل: قرحة المعدة، كدمة أو نزف في الدماغ، عملية جراحية حصلت مؤخراً في الدماغ أو في العينين).
- كنت تتناول أدوية لمنع تخثر الدم (مثل: وارفارين، دابيجاتران، أبيكسابان أو هيبارين)، عدا في حالات الإنتقال من علاج بمضاد تخثر واحد إلى آخر أو عندما تتلقى هيبارين عبر قنطر وريدي أو شرياني لإبقائه مفتوحاً.
- كنت تعاني من مرض كبدِي الذي يؤدي إلى زيادة الخطورة لحدوث نزف.
- كنت حاملاً أو مرضعة.

لا تتناول كساريلتو 10 ملغ واركك لطبيبك إذا انطبقت عليك إحدى الحالات المذكورة أعلاه.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

تحدث مع الطبيب أو الصيدلي قبل تناول كساريلتو 10 ملغ.

إستعمال كساريلتو 10 ملغ يتطلب الحذر الخاص، قبل العلاج بـ كساريلتو 10 ملغ، إحك للطبيب:

- إذا كنت معرضاً لخطورة عالية لحصول نزف حيث يمكن أن يحدث في إحدى الحالات التالية:
 - مرض كلوي بدرجة متوسطة أو خطيرة، نظراً لأن الأداء الوظيفي للكلّي قد يؤثر على كمية الدواء التي تعمل في جسمك.
 - كنت تتناول أدوية أخرى لمنع الخثرات الدموية (مثل: وارفارين، دابيجاتران، أبيكسابان أو هيبارين)، عندما تنتقل من مضاد تخثر واحد إلى آخر أو عندما تتلقى هيبارين عن طريق قنطر وريدي أو شرياني لإبقائه مفتوحاً (انظر الفقرة 2 "إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى...").
 - كنت تعاني من أنزفة.
 - ضعف دم مرتفع جداً غير متوازن بواسطة علاج دوائي.
- مرض في المعدة أو في الأمعاء الذي قد يؤدي إلى نزف مثل: التهاب الأمعاء أو المعدة، أو التهاب المريء الناتج، مثلاً، عن مرض الإرتداد المريئي – المُعدي (مرض يرتفع فيه الحمض من المعدة إلى المريء) أو أورام تتوضع في المعدة أو في الأمعاء أو في الأعضاء التناسلية أو في المسالك البولية.
- مشاكل في الأوعية الدموية لشبكية العين (retinopathy).
- مرض رئوي تتوسع فيه القصبات الهوائية وتمتلئ بالفرازات قيحية (bronchiectasis) أو نزف رئوي سابق.

- إذا وُجد لديك صمام إصطناعي في القلب.
- إذا علمت بأنك تعاني من مرض بإسهم المتلازمة المضادة للشموم الفوسفورية (اضطراب في الجهاز المناعي الذي يؤدي إلى زيادة الخطورة لحدوث خثرات دموية)، إحك لطبيبك وهو يقرر فيما إذا كانت هناك حاجة لتغيير العلاج.

- إذا قرر الطبيب بأن ضغط دمك غير مستقر أو لمطعم لك علاج جراحي أو علاج آخر لإزالة خثرة دموية من الرتنتين.

إحك للطبيب قبل تناول الدواء في حال كانت إحدى الحالات المذكورة أعلاه تنطبق عليك، فمن شأن الطبيب أن يقرر فيما إذا كان يتوجب عليك العلاج بـ كساريلتو 10 ملغ وفيما إذا كنت تحتاج لتابعة حثيئة.

إذا كان الطبيب يظن بأنك معرض لخطورة زائدة لتطوير قرحة في المعدة أو في الأمعاء، فمن الجائز أن يعطيك أيضاً علاجاً لمنعها.

إذا توجب عليك إجتياز عملية جراحية

- من المهم جداً تناول كساريلتو 10 ملغ قبل وبعد العملية الجراحية بالضبط في الأوقات التي حددها لك الطبيب.
- إذا كان هناك تدخل لقطر أو حقنة داخل العمود الفقري (مثلاً لتخدير فوق الجافية أو تخدير شوكي أو لتسكين الألم) في عمليتك الجراحية:
 - من المهم جداً تناول كساريلتو 10 ملغ بالضبط في الأوقات التي حددها لك الطبيب.
- راجع الطبيب المعالج فوراً إذا كنت تعاني من خدر أو ضعف في الرجلين أو من مشاكل في الأمعاء أو في المثانة البولية بعد زوال مفعول المخدر، لأن ذلك يحتاج إلى تدخل طبي عاجل.

الأطفال والمراهقون

الدواء غير مخصص للأطفال ولمراهقين دون عمر 18 سنة. لا تتوفر معلومات كافية حول الإستعمال لدى الأطفال والمراهقين.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو للصيدلي عن ذلك، بالأخص إذا كنت تتناول:

- أدوية معينة مضادة للتلوثات الفطرية (مثل: فلوكنازول، إيتراكونازول، فوريكنازول، بوساكونازول) عدا تلك المخصصة فقط للدهن على الجلد.
- أقراص تحتوي على كينيتوكنازول لعلاج متلازمة كوشينج – حالة ينتج فيها الجسم فائض من الكورتيزول.
- أدوية معينة لعلاج التلوثات الجرثومية (مثل: كلاريتروميسين، إيريثروميسين).
- أدوية معينة مضادة للفيروسات لعلاج تلوثات فيروس الأيدز (HIV) (مثل: ريتونافير).
- أدوية أخرى مضادة للتخثر (مثل: إنوكسابارين، كلويدوبجريل أو مضادات فيتامين K مثل وارفارين وأسنيوكومارول).
- أدوية مضادة للإلتهاب ومسكنة للألم (مثل: نابروكسين أو حمض أسيتيل ساليسيليك [أسبيرين]).
- درونيدارون، دواء لعلاج النبض غير المنتظم.
- أدوية معينة لعلاج الإكتئاب (مثبطات إنتقائية لإعادة إمتصاص السيروتونين [SSRIs] أو مثبطات إعادة إمتصاص السيروتونين والنورإيبينفرين [SNRIs]).
- إذا كانت إحدى الحالات المذكورة أعلاه تخصك، فأخبر الطبيب قبل تناول الدواء، لأن هذه الأدوية قد تسبب زيادة تأثير كساريلتو 10 ملغ. يقرر طبيبك فيما إذا سيعالجك بـ كساريلتو 10 ملغ وفيما إذا كانت هناك حاجة لخضوعك لمراقبة طبية حثيئة.
- كذلك، يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول:
 - أدوية معينة لعلاج الصرع (epilepsy) (مثل: فينيبتوين، كاربامازيبين، فينوباربیتال).
 - المستحضر النباتي لعلاج الإكتئاب سانت. جونس وورت (هيبيريكوم).
- ريفاميسين (مضاد حيوي).

إذا كانت إحدى الحالات المذكورة أعلاه تخصك، فأخبر الطبيب قبل تناول الدواء، لأن هذه الأدوية قد تسبب خفض تأثير كساريلتو 10 ملغ. يقرر طبيبك فيما إذا سيعالجك بـ كساريلتو 10 ملغ وفيما إذا كانت هناك حاجة لخضوعك لمراقبة طبية حثيئة.

إستعمال الدواء والطعام

بالإمكان تناول كساريلتو 10 ملغ مع الطعام أو بدونه.

الحمل، الإرضاع والحصولية

لا تتناولي كساريلتو 10 ملغ إذا كنت حاملاً أو مرضعة. إذا كان هناك احتمالاً بأن تصبحي حاملاً، عليك إستعمال وسيلة منع حمل متوقفة أثناء تناول كساريلتو 10 ملغ.

إذا أصبحت حاملاً أثناء فترة تناول الدواء، توجهي فوراً إلى الطبيب، الذي يقرر بخصوص إستمرار العلاج.

السياقة وإستعمال الماكينات

قد يؤدي كساريلتو 10 ملغ إلى دوار (عرض جانبي شائع) أو لإغماء (عرض جانبي غير شائع) (انظر الفقرة 4 "الأعراض الجانبية"). لا يجوز السياقة، ركوب الدراجات، إستعمال الأدوات أو تشغيل ماكنتا أثناء إستعمال كساريلتو 10 ملغ في حال كنت تتأثر من هذه الأعراض.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي الدواء على لكتوز وصوديوم.

إذا قيل لك من قِبل الطبيب بأنك تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة، توجه إلى الطبيب قبل أن تبدأ بتناول كساريلتو 10 ملغ.

يحتوي الدواء على أقل من 1 ميليومل صوديوم (23 ملغ) في كل قرص وبالتالي يعتبر «خالٍ من الصوديوم»، بجوهده.

3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائماً إستعمال المستحضر بحسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن وفقاً بخصوص الجرعة الدوائية وطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قِبل الطبيب فقط.

لمنع تشكل خثرات دموية في الأوردة بعد عملية جراحية لإستبدال ورك أو ركة، الجرعة الدوائية الإعتيادية عادة هي:

قرص واحد (10 ملغ) مرة في اليوم.

يجب تناول القرص الأول 10–6 ساعات بعد إجراء العملية الجراحية. بعد ذلك يجب تناول قرص واحد كل يوم حتى يشير لك الطبيب المعالج بالتوقف.

لمنع عودة الخثرات الدموية في أوردة الرجلين (جلطة الأوردة العميقة) وفي الأوعية الدموية للرتنتين (إنصمام رئوي) بعد إتمام 6 أشهر علاجية لجلطة الأوردة العميقة أو إنصمام رئوي سابق، الجرعة الدوائية الإعتيادية هي عادة: قرص واحد (10 ملغ) في اليوم.

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

- مدة العلاج

- في عملية جراحية لتبديل مفصل الورك، مدة العلاج عادة هي 5 أسابيع.

- في عملية جراحية لتبديل مفصل الركبة، مدة العلاج عادة هي أسبوعين.

- لمنع عودة الخثرات الدموية في أوردة الرجلين (جلطة الأوردة العميقة) وفي الأوعية الدموية للرتنتين (إنصمام رئوي) بعد إتمام 6 أشهر علاجية لجلطة الأوردة العميقة أو إنصمام رئوي سابق، مدة العلاج تُحدد من قِبل الطبيب.

- طريقة تناول

يجب بلع الدواء مع الماء.

إن تناول الدواء في نفس الوقت كل يوم، يساعدك على تذكر تناوله.

في حال كان بلع القرص بشكله الكامل أمراً صعباً عليك، تكلم مع طبيبك عن طرق أخرى لتناول كساريلتو10 ملغ.

بالإمكان سحق القرص وخلطه مع الماء أو مهروس التفاح، مباشرة قبل تناوله.

إذا دعت الحاجة، سيقوم طبيبك بإعطائك كساريلتو 10 ملغ المسحوق عن طريق أنبوب تغذية للمعدة.

لا تتوفر معلومات بخصوص الشطر/ المضع.

إذا تناولت بالخطأ جرعة دوائية أكبر عليك التوجه فوراً إلى الطبيب المعالج. إن تناول كساريلتو 10 ملغ أكثر من اللازم يزيد الخطورة لحدوث نزف.

إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلغ طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى مصطحباً علبة الدواء معك.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب يجب تناول جرعة دوائية حال تذكرك. يجب تناول القرص التالي في اليوم التالي والإستمرار في العلاج كالمعتاد. لا يجوز تناول جرعة دوائية مضاعفة بأي حال من الأحوال!

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية، لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء قبل إتمام العلاج بدون إستشارة الطبيب وذلك لأن كساريلتو 10 ملغ يمنع تطور حالة خطيرة.

لا يجوز تناول أدوية في العنمة؛ يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء، ضع النظرات الطبية إذا لم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال كساريلتو 10 ملغ قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا تتدهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

مثل الأدوية المشابهة الأخرى لتقليل تشكل الخثرات الدموية، فإن كساريلتو 10 ملغ يمكن أن يؤدي إلى نزف الذي قد يشكل خطراً على الحياة. نزف شديد قد يؤدي لإنخفاض مفاجيء في ضغط الدم (صدمة)، في بعض الحالات قد يكون النزف مستتراً.

يجب التوجه إلى الطبيب فوراً إذا كنت تعاني من إحدى الأعراض الجانبية التالية:

علامات لنزف:

- نزف دماغي أو داخل الجمجمة (الأعراض يمكن أن تشمل صداع، ضعف في جانب واحد، تقيؤ، إختلاج، تدني في مستوى الوعي وتصلب في الرقبة. هذه حالة طبية طارئة خطيرة، يجب البحث عن علاج طبي فوري!).

- نزف مطوّل أو زائد.

- ضعف عام غير عادي، إرهاق، شحوب، دوار، صداع، إنتفاخ مجهول السبب، ضيق تنفس، ألم في الصدر أو ذبحة صدرية (angina pectoris).

طبيبك سيقدر فيما إذا كانت هناك حاجة لتابعة حثيئة أو حاجة لإجراء تغيير في العلاج.

علامات لرد فعل جلدي خطير:

- طلع مكثف منتشر على الجلد، حويصلات أو تقرحات في النسيج المخاطي، مثلاً في الفم أو العينين (Toxic Epidermal Necrolysis/ Stevens-Johnson syndrome).

- رد فعل للدواء الذي يؤدي إلى حدوث طفح، سخونة، إلتهاب أعضاء داخلية، شذوذ في الدم وحدوث مرض جهازي (متلازمة DRESS). وتيرة هذه الأعراض الجانبية هي نادرة جداً (حتى مستعمل 1 من بين 10,000 مستعمل).

علامات لرد فعل تحسسي خطير:

- إنتفاخ الوجه، الشفتين، الفم، اللسان أو الحنجرة؛ صعوبات في البلع؛ شرى وصعوبات في التنفس؛ هبوط مفاجئ لضغط الدم. إن تواتر ردود الفعل التحسسية الخطيرة هو نادر جداً (ردود فعل إستهدافية؛ قد تؤثر على حتى مستعمل 1 من بين 10,000) وغير شائعة (وذمة وعائية وذمة تحسسية؛ قد تؤثر على حتى مستعمل 1 من بين 100).

أعراض جانبية إضافية

أعراض جانبية شائعة (common) (أعراض التي قد تؤثر على حتى مستعمل واحد من بين 10):

- إنخفاض في خلايا الدم الحمراء الذي قد يؤدي إلى شحوب، ضعف أو إلى ضيق في التنفس

- نزف في المعدة أو في المعى، نزف في الأعضاء التناسلية والبولية (يشمل دم في البول ونزف دمئي زائد)، رعاف، نزف في اللثة

- نزف لداخل العين (بما في ذلك نزف في بياض العين)

- نزف لداخل نسيج أو جوف في الجسم (نزف دموي داخلي موضعي، كدمة)

- سعال دموي

- نزف من الجلد أو من تحت الجلد

- نزف بعد عملية جراحية

- تسرب دم أو سائل من جرح العملية الجراحية

- إنتفاخ في الأطراف

- ألم في الأطراف

- خلل في وظيفة الكلّي (يمكن الكشف عنه بواسطة الفحوص التي تُجرى من قبل الطبيب)

- سخونة

- ألم في البطن، صعوبات في الهضم، غثيان أو تقيؤ، إمساك، إسهال

- ضغط دم منخفض (أعراض ذلك يمكن أن تكون دوار أو إغماء عندما تنتقل إلى وضعية الوقوف)

- إنخفاض عام في القوة والحيوية (ضعف عام، إرهاق)، صداع، دوار

- طفح، حكة في الجلد

- فحوص الدم قد تشير إلى إرتفاع في إنزيمات معينة في الكبد

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) (أعراض التي قد تؤثر على حتى مستعمل واحد من بين 100):

- نزف داخل الدماغ أو داخل الجمجمة (انظر أعلاه، علامات لنزف)

- نزف إلى داخل مفصل الذي يسبب ألم وإنتفاخ

- قلة الصفائح الدموية (إنخفاض عدد الصفائح الدموية، حيث أنها خلايا التي تساعد على تخثر الدم)

- ردود فعل تحسسية، تشمل ردود فعل تحسسية في الجلد

- خلل في الأداء الوظيفي للكبد (يمكن الكشف عنه بواسطة الفحوص التي تُجرى من قبل الطبيب)

- يمكن أن تشير فحوص الدم إلى حدوث زيادة في البيليروبين، في إنزيمات معينة للبنكرياس أو الكبد أو في عدد الصفائح الدموية

- إغماء

- شعور عام غير جيد

- نبض متسارع

- جفاف في الفم

- شرى (urticaria)

أعراض جانبية نادرة (rare) (أعراض التي قد تؤثر على حتى مستعمل واحد من بين 1,000):

- نزف إلى داخل العضل

- ركود صفراوي (قلة تدفق الصفراء)، التهاب الكبد (hepatitis) بما في ذلك تضرر خلايا الكبد (التهاب الكبد الذي يشمل حصول ضرر في الكبد)

- إصفرار الجلد والعينين (يرقان)

- إنتفاخ موضعي

- نزف دموي داخلي موضعي (ورم دموي) في منفرج الرجلين نتيجة إختلاط لإجراء قلبي يُدخل فيه قنطر إلى شريان في الرجل

أعراض جانبية شيوعها غير معروف (لا يمكن تقييم الشيوع من المعلوما المتوفرة):

- فشل كلوي بعد نزف شديد

- ضغط زائد في عضلات القدمين أو الذراعين بعد نزف، الذي يؤدي لآلم، لإنتفاخ، لتغيرات حسية، لُخدر أو لشلل (متلازمة الحُرع بعد حدوث نزف)

إذا ظهر عرض صرغني، إذا تفاقت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط " تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي " الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

https://sideeffects.health.gov.il

5) كيفية تخزين الدواء؟

• تجنب التسمم؛ يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتقاص تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

• يجب التخزين بدرجة حرارة دون 30 درجة مئوية.

• لا يجوز إسال الأدوية في سلة القمامة. إسأل الصيدلي عن كيفية إتلاف أدوية لم تعد قيد الإستعمال، تساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمُركَّب الفعال أيضاً على:

Cellulose microcrystalline, lactose monohydrate, croscarmellose sodium, hypromellose 5 cP, hypromellose 15 cP, magnesium stearate, sodium laurylsulfate, macrogol 3350, titanium dioxide, ferric oxide red.

يحتوي كل قرص من كساريلتو 10 ملغ على 27.9 ملغ لكتوز مونوهيدرات.

• كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

• أقراص مطلية مستديرة، بلون أحمر فاتح، محدبة من كلا الجانبين ومعلمة *"BAYER"* في جانب واحد و– "10" بمرافقة مثلث في جانبها الثاني.

• الأقراص متوفرة ضمن لوحيات (بليست) داخل عبوات ذات 5، 10، 30 أو 100 قرص.

• من الجائز ألا تسوّق كافة أحجام العبوات.

• صاحب الإمتياز وعنوانه: باير إسرائيل مرض، شارع هاچاراش 36، مود هشارون 4527702

• إسم المنتج وعنوانه: باير آي. جي، ليفركوزن، ألمانيا أو باير Healthcare Manufacturing S.r.l. ميلانو، إيطاليا.

• تم إعدادها في آب 2021، بموجب تعليمات وزارة الصحة.

• رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 142-57-31927-00/01/02/03

- من أجل سهولة وتبوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.