

ميلران أقراص 2 ملغ

المادة الفعالة وكميته:

Busulfan 2 mg يحتوي كل قرص على: بوسولفان 2 ملغ المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر - انظر الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفقرة 6 "معلومات إضافية" في النشرة.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه لآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

ميلران أقراص 2 ملغ مخصص لعلاج داعم في إباضاض المحببات المُزمن (يسمى أيضاً إباضاض الدم النخاعي المُزمن).

الفصيلة العلاجية: ينتمي الدواء إلى مجموعة الأدوية المضادة للأورام والمعدلات المناعية، سلفونات الألكل والأدوية السامة للخلايا (المُسمّة أيضاً بالعلاج الكيميائي).

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (اليرجي) للمادة الفعالة بوسولفان أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (انظر الفقرة 6 "معلومات إضافية").
- عولجت في الماضي بـ ميلران أقراص والعلاج لم ينجح.
- كنت مرضعة.

لا يجوز إستعمال الدواء إذا إنطبق عليك بندأ واحداً أو أكثر من البنود المذكورة أعلاه.
إذا لم تكن واثقاً، توجه للطبيب أو للصيدلي قبل تناول الدواء.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال المستحضر

قبل العلاج بـ ميلران أقراص 2 ملغ، إحكام للطبيب إذا:

- كنت تجتاز أو إجتررت مؤخرأ علاجاً بالأشعة.
- كنت تعاني من مشكلة وراثية في الدم تسمى تلاسيمية.
- عانت ذات مرة من النقرس (gout) - آلام وانتفاخ المفاصل بسبب تراكم بلورات حمض البول). من الجائز أن تحتاج لمعالجة داء النقرس (gout) قبل بدء العلاج بـ ميلران.

إذا كنت تعاني من مشكلة في الكبد، في الكلية أو في الرئتين.
إذا كنت غير واثق فيما إذا كانت إحدى الفقرات السابقة تنطبق عليك، فإاستشر الطبيب أو الصيدلي قبل تناول الدواء.

الفحوص والمتابعة

يجري الطبيب خلال فترة العلاج بـ ميلران فحوص دم روتينية. وذلك من أجل فحص تعداد الخلايا في دمك. نتيجة لذلك من شأن الطبيب أن يغير المقدار الدوائي.

التدخلات / التفاعلات بين الأدوية
إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرأ أو من الجائز أن تتناول أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية، إضافات غذائية ومستحضرات نباتية، إحكام للطبيب أو للصيدلي عن ذلك. بالأخص إذا كنت تتناول:

- أدوية أخرى سامة للخلايا (علاج كيميائي) - عند إستعمال هذه الأدوية سوية مع ميلران فهناك احتمال أكبر لحدوث أعراض جانبية، مثل مشاكل في التنفس.

• فينيتوئين (العلاج ولمنع الإختلالات) - من الجائز أن يحتاج الطبيب إلى تغيير العلاج بـ فينيتوئين إلى دواء آخر.

• لقاحات التي تحتوي على مركبات حية (مثل شلل الأطفال، الحصبة، النكاف والحسبة الألمانية) - ميلران يمكن أن يضعف من قدرة جسمك على محاربة التلوثات.

• إيتراكونازول (للتلويثات الفطرية) أو ميترونيدازول (للتلويثات الجرثومية) - قد يسببان أعراض جانبية خطيرة عند الإستعمال سوية مع ميلران.

• سيكلوفوسفاميد (العلاج بعض المشاكل الدموية) - عند الإستعمال سوية مع ميلران، يفضل إعطاء المقدار الدوائي الأول من سيكلوفوسفاميد بعد 24 ساعة أو أكثر من تلقي المقدار الدوائي الأخير من ميلران. بذلك يمكن تقليل احتمال حدوث آية أعراض جانبية.

• أية مادة للتهدير تعطى بالعمليات الجراحية في المستشفى أو لدى طبيب الأسنان - في هذه الحالة يجب إعلام الطبيب أو طبيب الأسنان بأنك تتناول ميلران.

• باراسيتامول - يجب إستعماله بحذر عند تناول ميلران.

• ديفيراسيروكس (دواء لتقليل فائض الحديد في جسمك).

الحمل، الإرضاع والخصوبة

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تعتدين بأنك قد تكونين حاملاً أو تخططين للحمل، إستشيري الطبيب أو الصيدلي قبل إستعمال الدواء. سوف يدرس الطبيب المخاطر والفوائد لك ولطفلك نتيجة تناول ميلران. ينطبق هذا التوجيه أيضاً على الرجال وكذلك على النساء. قد يلحق ميلران الضرر بالنطاف أو بالبویضات.

إذا كنت أنت أو زوجك / زوجتك تتناولان ميلران فيجب إستعمال وسيلة موثقة لمنع الحمل وذلك لتجنب حدوث الحمل. راجع الطبيب للإستشارة.

إذا كنت حاملاً فمن المهم إستشارة الطبيب قبل بدء العلاج بـ ميلران.

لا يجوز الإرضاع خلال العلاج بـ ميلران. توجهي لإستشارة الطبيب.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي الدواء على لكتوز. إذا قيل لك في الماضي من قبل طبيبك بأن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، يجب إستشارة الطبيب قبل بدء العلاج بـ ميلران أقراص 2 ملغ.

3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب أن يوصف لك ميلران فقط من قبل طبيب مختص بعلاج مشاكل الدم.

يجب دائماً إستعمال الدواء بموجب تعليمات الطبيب.

من المهم الحرص على تناول الدواء في الأوقات المناسبة.

عليك الإستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

يجب بلع القرص بشكله الكامل مع كأس من الماء.

لا يجوز كسر، سحق أو مضغ الأقراص. المستحضر سام للخلايا.

المقدار الدوائي لميلران:

من الجائز أن يقوم الطبيب بتغيير المقدار الدوائي خلال فترة العلاج حسب الحاجة.

يمكن أحياناً أن يتم تغيير المقدار الدوائي إذا كنت تعاني من وزن زائد.

في حال تناولك مقداراً دوائياً مفرطاً من ميلران فمن الجائز أن يصف لك الطبيب وصفة لتلقي دواء آخر من مجموعة البنزوديازيبينات. يساعد هذا الدواء في منع حدوث إختلالات.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر أو إذا بلع طفل بالخطأ (أو شخصاً آخر) من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عليه الدواء معك.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المخصص، راجع الطبيب. لا يجوز تناول مقداراً دوائياً مضاعفاً للتعويض عن المقدار الدوائي المنسي.

إذا توقفت عن تناول الدواء

يجب المواظبة على العلاج كما أوصى به الطبيب.

لا يجوز التوقف عن العلاج بدون إستشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال ميلaran أقراص 2 ملغ قد يسبب أعراضًا جانبية لدى بعض المستعملين. لا تذهب من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز إلا تعاني أيًّا منها.

يجب التوجه فورًا إلى الطبيب المختص أو إلى المستشفى إذا ظهرت بعض الأعراض التالية:

- أية علامة لسخونة مرتفعة أو تلوث (الم في الحنجرة، الم في الفم أو مشاكل في المسالك البولية).
- أية إصابة أو نزف غير متوقعين، لأن تلك قد تدل على نقص في إنتاج خلايا دم معينة.
- إذا كنت تشعر بسوء بشكل مفاجئ (حتى بدون سخونة).

أعراض جانبية إضافية

إسترشر الطبيب إذا ظهرت إحدى الأعراض الجانبية التالية لديك:

أعراض جانبية شائعة جدًا (very common) – أعراض التي تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من بين 10

- تناقص عدد خلايا الدم والصفائح الدموية.
- الشعور بوعدة (غثيان)، حالة من المرض (تقىؤات)، إسهالات، تقرحات في المقدار - في المقادير الدوائية المرتفعة من ميلaran.
- إصفرار بياض العينين والجلد (يرقان) وتضرر الكبد - في المقادير الدوائية المرتفعة من ميلaran.
- لدى النساء: قد يتوقف الطمث، من الجائز حدوث تأثير على الخصوبة ومن الممكن أن يبدأ سن اليأس أبكر من المعتاد - وذلك في المقادير الدوائية المرتفعة من ميلaran.

أعراض جانبية شائعة (common) – أعراض التي تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10

- مشاكل في نظم القلب - بالأخص إذا وُجدت لديك مشكلة وراثية في الدم تسمى تلاسيمية.
- إلتهاب الرئتين بدون علامات تلوث - تسمى متلازمة إلتهاب الرئتين - في المقادير الدوائية المرتفعة من ميلaran.
- تساقط الشعر (في المقادير الدوائية المرتفعة من ميلaran).
- ظهور بقع جلدية داكنة.
- علامات لدم في البول وألم أثناء التبول (إلتهاب المثانة البولية) - في المقادير الدوائية المرتفعة من ميلaran التي تؤخذ سوية مع دواء يسمى سيكلوفوسفاميد.

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) – أعراض التي تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 100

- لدى النساء: قد يتوقف الطمث، من الجائز حدوث تأثير على الخصوبة ومن الممكن أن يبدأ سن اليأس أبكر من المعتاد - في المقادير الدوائية العادية من ميلaran.
- **أعراض جانبية نادرة (rare) – أعراض التي تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 1,000**
- تناقص خطير في تعداد خلايا الدم الحمراء الذي قد يسبب إرهاقًا، ضعفًا وظهور كدمات، ويزيد من الخطورة لديك لتطور تلوثات - حالة تسمى فقر دم لاتنسجي.
- إختلاقات أو نوبات (تشنجات) - في المقادير الدوائية المرتفعة من ميلaran.
- كاتاراتكت أو مشاكل أخرى في العينين - بعد زرع نخاع العظم وفي المقادير الدوائية المرتفعة من ميلaran.

أعراض جانبية شيوها غير معروفة (أعراض شيوها لم يحدد بعد)

- تطور غير كامل للأستان.
- إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبلیغ عن اعراض جانبية:

بالإمكان التبلیغ عن اعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبلیغ عن اعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبلیغ عن اعراض جانبية، أو عن طريق تصفیح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

بالإضافة لذلك، بالإمكان تبلیغ شركة پاداچیس بواسطة العنوان التالي:
Padagis.co.il

5) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي و المجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسنم. لا تسبب التقىؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة والقنية. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب التخزين دون 25 درجة مئوية.
- بعد فتح القنية للمرة الأولى بالإمكان إستعمال الدواء خلال 100 يوم، لكن بما لا يتجاوز تاريخ إنقضاء الصلاحية.

في حال أوصاك الطبيب بالتوقيف عن العلاج، فمن المهم إعادة ما تبقى من الدواء إلى الصيدلي وذلك لكي يتخلص منه حسب إرشادات التخلص من المواد الخطرة. أبقِ لديك ما تبقى من الدواء حسب تعليمات صريحة من الطبيب فقط.

6) معلومات إضافية

• يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضًا على: Lactose anhydrous, pregelatinised starch, Opadry White (hypromellose, titanium dioxide, triacetin), magnesium stearate.

• كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة: ميلaran معبأً ضمن قنية زجاجية قائمة ذات غطاء من البلاستيك التي تحتوي على 25 أو 100 قرص أبيض، مستدير ومدبب. على كل قرص مطبوع «GX EF3» من جانب واحد و«M» من الجانب الثاني. من الجائز ألا تسوق كافة أحجام العلب.

• صاحب الإمتياز وعنوانه: وكالات پاداچیس إسرائيل م.ض. شارع راكيفيت 1، شوهم.

• إسم المنتج وعنوانه: إكسيلا GmbH & Co. KG، فوخت، ألمانيا، من أجل أسپين.

• رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 12938.30943

• تم إعدادها في شباط 2022 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.