

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) - 1986

يُسَوَّق الدواء بدون وصفة طبيب

ليموسين ليمون
ليموسين كرز

أقراص للمصّ

المواد الفعالة وكميتها:

يحتوي كل قرص للمص على:

lidocaine	1 mg	ليدوكائين
tyrothricin	4 mg	تايروثريسين
cetrimonium bromide	2 mg	سيتريمونيوم بروميد

مواد غير فعّالة ومثيرة للحساسية: انظر الفصل 2 البند "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" والفصل 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستخدام الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجّه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي. يجب عليك الاستعمال بحسب تعليمات بند الجرعة في هذه النشرة. قم باستشارة الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية. يجب أن تتوجّه إلى الطبيب إذا تفاقت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 5-7 أيام.

1. لم أعد الدواء؟

ليموسين هو قرص للمصّ للتخفيف من ألم الحلق الشديد والألم المصحوب بتلوثات في تجويف الفم. الدواء مخصص للبالغين والأطفال فوق سن 12 عاماً.

المجموعة العلاجية:

يحتوي ليموسين على ليدوكائين (مخدّر موضعي)، تايروثريسين (مضاد حيوي) وسيتريمونيوم بروميد (مُطهر).

2. قبل استعمال الدواء

يُمنع استعمال المستحضر إذا:

وجدت لديك حساسية للمواد الفعّالة (ليدوكائين، تايروثريسين وسيتريمونيوم بروميد) أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتويها الدواء (انظر الفصل 6).

تحذيرات خاصة تتعلق باستخدام الدواء

قبل استعمال ليموسين أخبر الطبيب/الصيدلي إذا:

- كنت تعاني منذ عدة أيام من ألم في الحلق المصحوب بالحمى،
- كان لديك شقّ أو جرح في مخاطية الفم أو الحلق،
- لم يكن هناك تحسناً في الأعراض أو أنها تستمر لأكثر من 5-7 أيام،
- كان لديك ألم في الحلق مصحوب بحمى مرتفعة، دوار، تقيؤ أو عدم ارتياح شديد لدى البلع.

قبل استعمال الدواء، حدّث الطبيب/الصيدلي إذا كنت تعاني من مرض ما أو إذا كانت لديك في الماضي ردود فعل تحسّسية.

يُمنع تنظيف الأسنان بالفرشاة فوراً قبل أو بعد تناول هذا المستحضر لأن معجون الأسنان سيقلل من نجاعة المستحضر.

الأطفال والمراهقون

الدواء غير مخصص للأطفال دون سن 12 عاماً.

ردود فعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبيّة والمكملات الغذائيّة، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

استعمال الدواء والغذاء

يُمنع استعمال ليموسين فوراً قبل أو أثناء الأكل أو الشرب حيث إن التخدير الموضعي لليدوكائين قد يسبب تخديراً مؤقتاً في اللسان والحنك وبالتالي يمكن أن يضرّ بالبلع. تجنب الأكل طالما هذا الشعور بالخدر موجود.

الحمل والإرضاع

يُمنع استعمال الدواء أثناء الحمل أو فترة الإرضاع. إذا كنت حاملاً، مرضعة أو تخططين لحمل، يجب استشارة الطبيب قبل استعمال الأدوية.

معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء

يحتوي الدواء على السوربيتول. السوربيتول هو مصدر للفركتوز. إذا قال لك الطبيب أن لديك عدم تحمل لسكريات معينة أو إذا تم تشخيصك بعدم تحمل وراثي للفركتوز (اضطراب وراثي نادر لعدم القدرة على تفكيك الفركتوز)، فاستشر الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

قد يسبب السوربيتول عدم ارتياح في الجهاز الهضمي ولديه تأثير مُسهل خفيف.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالدواء.

الجرعة المقبولة عادة هي:

الأطفال فوق سن 12 والبالغون:

لآلام الحلق الخفيفة – المعتدلة: يجب مص قرص واحد كل 2-3 ساعات.

لآلام الحلق الشديدة: يمكن مص قرص واحد كل 1-2 ساعات.

يُمنع تجاوز جرعة دوائية بمقدار 12 قرصاً في 24 ساعة.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

طريقة الاستعمال:

أثناء مصّ ليموسين كرز و/أو ليموسين ليمون قرص لتخفيف ألم الحلق، يجب تحريك القرص ببطء داخل الفم. لا تدعه يذوب في الجزء الداخلي للحنك!

عند علاج البثور/القلاع الفموي، دع القرص يذوب ببطء مباشرة في المكان المصاب.

يُمنع المضغ/كسر أو بلع القرص للمص. يجب مصّ القرص ببطء وكرّر حسب الحاجة.

إذا تناولت عن طريق الخطأ، جرعة أعلى

قد تسبب جرعة مفرطة من الستريمونيوم بروميد حالات غثيان وتقيؤات.

قد تسبب جرعة مفرطة من الليدوكائين تأثيرات ضارة على الجهاز العصبي المركزي وعلى جهاز القلب والأوعية الدموية.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام طفل بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ، توجّه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقّق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظرات الطبيّة إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، قد يسبّب استعمال ليموسين أعراضاً جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تندهش عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية من المحتمل ألا تعاني من أيّ منها.

يجب وقف الاستعمال بالدواء والتوجه فوراً إلى الطبيب إذا كنت تشعر بأحد الأعراض التالية:

• الأعراض التي يمكن أن تشير إلى رد فعل تحسّسي:

- صعوبة في التنفس أو البلع،
- تورم الوجه، الشفتين، اللسان أو الحلق،
- حكة شديدة في الجلد المصحوبة بطفح أحمر أو نتوءات في الجلد.

- إسهال متواصل أو وخيم، إسهال مع نزيف ومخاط، آلام في السُرّة أو تشنجات و/أو حمى،
- عندما يظهر تلوث جديد،
- إذا كانت الأعراض تتفاقم.

أعراض جانبية إضافية

أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر لدى 1-10 من بين 10,000 مستعمل)
تهيج موضعي في الفم أو في الحلق (عدم ارتياح في الفم)، خاصة في الاستعمال بوتيرة عالية لفترة متواصلة.
قد يؤدي استعمال تايروثريسين على جروح جديدة إلى نزيف.

أعراض جانبية نادرة جدًا (أعراض تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10,000)

- حكة، طفح
- حالات غثيان، خاصة لدى المستعملين بجرعات عالية من الدواء أو عندما يتم تناول الأقراص على بطن خاوية (يُعزى إلى الليدوكائين الذي تحتويه الأقراص).

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي غير مذكور في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

يمكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية نتيجة لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحوّلك إلى استمارة عبر الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يخزن الدواء؟

- تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيدًا عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم. لا تسبّب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- شروط التخزين: يجب التخزين بدرجة حرارة دون الـ 25°C والحماية من الضوء والرطوبة.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركبات الفعّالة، يحتوي الدواء أيضًا على:

ليموسين أقراص للمصّ بنكهة الليمون:

sorbitol, citric acid, talc, lemon flavouring powdered, guar, magnesium stearate, silica colloidal anhydrous, saccharine sodium, quinoline yellow lake, peppermint flavour, spectracol green lake.

ليموسين أقراص للمصّ بنكهة الكرز:

sorbitol, guar, citric acid, talc, povidone, saccharine sodium, magnesium stearate, cherry flavouring, iron oxide pigment red.

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

ليموسين ليمون هي أقراص للمصّ مستطيلة، منقطة، ذات حواف مائلة، بلون أصفر داكن إلى أصفر ليموني. تحتوي كل عبوة على 24 أو 50 قرصًا للمصّ. قد لا يتمّ تسويق جميع أحجام العبوات.
ليموسين كرز هي أقراص للمصّ مستطيلة، منقطة، ذات حواف مائلة، بلون وردي-أحمر. تحتوي كل عبوة على 24 قرصًا للمصّ.

صاحب التسجيل وعنوانه:

ديفريس وشركاه م.ض.، شارع هيرزل 32، تل أبيب

اسم المنتج وعنوانه:

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad-Vilbel, Germany

رقم تسجيل الدواء في سجلّ الأدوية الرسميّ في وزارة الصحة:
ليموسين ليمون: 1178029908
ليموسين كرز: 1177929907

حُدثت في أيار 2022 وفق تعليمات وزارة الصحة.

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النصّ بصيغة المذكّر. مع هذا فالدواء معدّ لأبناء كلا الجنسين.