

עלון לצריכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

וי-מנטין 10 מ"ג

וי-מנטין 20 מ"ג

טבליות מס'סות בפה

חומר פעיל

כל טבלייה מס'סה של ווי-מנטין 10 מ"ג מכילה 10 מ"ג ממנטין הידרוchloride (memantine hydrochloride 10 mg)

כל טבלייה מס'סה של ווי-מנטין 20 מ"ג מכילה 20 מ"ג ממנטין הידרוchloride (memantine hydrochloride 20 mg)

חוורמים בלתי פעילים ואלרגניים: ראה פרק 2 סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 "מידע נוספת".

קרא בעיון את העلون עד סוףם בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה.

אם יש לך שאלות נוספות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלקה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראתה לך כי מחלתם דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

וי-מנטין מיועדת לטיפול באלצהיימר בינוני עד חמור.

קבוצה Terapeutic: אנטגוניסט לרצפטור NMDA.

וי-מנטין שייכת לקבוצת תרופות לטיפול בדמנציה. איבוד הזיכרון האופייני למחלת האלצהיימר נגרם עקב הפרעה בהעברת אוטות עצביים במוח. במקרים קיימים קולטנים (רצפטורים) הנקשרים קולטני NMDA. קולטנים אלו מעורבים בהעברת אוטות עצביים החשובים ללמידה וזיכרון. ווי-מנטין פועלת על קולטני NMDA ובכך משפרת את העברת האוטות העצביים ואת הזיכרון.

2. לפני השימוש בתרופה אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה פרק 6).
- אם את מנינקה.

اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בווי-מנטין, ספר לרופא אם:

- יש לך היסטוריה של אפילפסיה (התקפים אפילפטיים).

- סבלת לאחרונה מאוטם שריר הלב (התקף לב) או אם אתה סובל מאי ספיקת לב או מלחץ דם גבוה ככלני נשלט.

במצבי הנזכרים לעיל, הרופא יעקוב בזהירות אחריו הטיפול בתרופה ויבחן את יעילותה באופן קבוע.

- אתה סובל מליקוי בתפקוד הכליה (בעיות בכלה). הרופא יצטרך לעקוב בקפידה אחריו תפקוד הכליאות ולהתאים את המינון אם ידרש.

- אתה סובל ממצבים של חמצת אבובית הכליה (RTA), עדף של חומרים יצרו חומצה בدم בשל תפקוד כליתי ירוד או מזיהומיים חמורים של דרכי השטן, יתכן שהרופא יצטרך להתאים את מינון התרופה למאכבר.

יש להימנע משימוש בו בזמןויידי-מנטיין ובתרופות הבאות:

- אמנטידין (לטיפול במחלת פרקינסון)
- קטמין (חומר המשמש להרדמה כללית)
- דקسطרומטורפן (תרופה לטיפול בשיעול)
- תרופות אחרות מקבוצת נוגדי NMDA

ילדים ומתבגרים

וי-מנטיין לא מומלצת לילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18 שנים.

תגובה בין תרופתיות

אם אתה לוקה או אם לך歟 לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר עליך לרופא או לרוקח. במיוחד אם יידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקה את התרופות הבאות, כיון שי-מנטיין עלולה לשנות את ההשפעות שלהן וייתכן כי יהיה על הרופא להתאים את מינוןך:

- אמנטידין, קטמין, דקسطרומטורפן (ראה סעיף "ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה")
- דנטROLן, בקלופן
- סימטידין, רניתידין, פרוקאנאמיד, קינידין, כינין, ניקוטין
- הידרוכלורוטיאזיד (או כל שילוב עם הידרוכלורוטיאזיד)
- תרופות אנטि-קולינרגיות (משמשות בדרך כלל לטיפול בהפרעות תנועה ובעוויות מעיים)
- תרופות לטיפול באפליפסיה (למניעה ולהקלת התקפים)
- ברביוטרים (משמשים בדרך כלל להשראתamina)
- אגוניסטים לדופאמין כגון DOPA-L, ברומוקרייפטין
- תרופות נירולפטיות (טיפול בהפרעות נפשיות)
- תרופות נוגדות קירישה במתן דרך הפה

אם אתה פונה לטיפול בבית חולים, ידע את הרופא שאתה נוטל וי-מנטיין.

שימוש בתרופה ומזון

ניתן ליטול התרופה עם או בלי מזון.

ידע את הרופא אם עשית לאחרונה או שאתה מתכוון לעשות שינויים מסוימים בתזונה (כגון מעבר מהתזונה רגילה לצמחונות), היית שייתכן שהרופא יצטרך להתאים את מינון התרופה לך.

הירין והנקה

אם אתה בהירין או מיניקה, חשוב שתאת בהירין או מתכנתת הירין, התיעצי עם הרופא או הרוקח לפני השימוש בתרופה זו.

הירין

השימוש בממנטיין בנשים הרות אינם מומלץ.

הנקה

אל תניקי אם אתה לוקחת וי-מנטיין.

נהיגה ושימוש במכוניות

הרופא יסביר לך אם מצב הרופאי מאפשר לך נהוג או להפעיל מכוניות בטחה. כמו כן, וי-מנטיין עלולה לשנות את יכולת התגובה ועל כן נהיגה או הפעלת מכוניות אינה מומלצת.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

תרופה זו מכילה אספרטים ולקטוז.

אספרטים: כל טבלייה של וי-מנטיין 10 מ"ג מכילה 2.5 מ"ג אספרטם. כל טבלייה של וי-מנטיין 20 מ"ג מכילה 5 מ"ג אספרטם.

אספרטיטים הוא מקור של פנילאלין. הוא עלול להזיק אם יש לר' פנילקטונוריה (PKU), הפרעה גנטית נדירה שבה פנילאלין מצטרב בגל חוסר יכולת של הגוף לפונת אותו באופן תקין. לקטוז: אם נאמר לר' על ידי הרופא שיש לר' חוסר סובלות לסוכרים מסוימים, התיעץ עם הרופא לפני נטילת תרופה זו.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמייד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא:

המינון המומלץ למבוגרים וקשישים – 20 מ"ג ליום.
כדי להקטין את הסיכון לתופעות לוואי יש לקחת את המינון בהדרגה לפי התוכנית שלහן:

שבוע 1	5 מ"ג ביום
שבוע 2	10 מ"ג ביום
שבוע 3	15 מ"ג ביום
שבוע 4 והלאה	20 מ"ג ביום

המינה ההתחלית היא טבלייה של ממנטין הידרוכולוריד 5 מ"ג ביום במשך השבוע הראשון.
שבוע השני טבלייה של ממנטין הידרוכולוריד 10 מ"ג ביום.
שבוע השלישי טבלייה של ממנטין הידרוכולוריד 15 מ"ג ביום.
מהשבוע הרביעי ואילך טבלייה של ממנטין הידרוכולוריד ש-20 מ"ג או 2 טבליות של ממנטין הידרוכולוריד 10 מ"ג ביום.

המינון בחולים עם ליקוי בתפקוד הכליליות:

בחולים עם אי תפקוד כליתי קל (פיני קרייאטני 80-50 מ"ל לדקה) אין צורך בהתקנת מינון.
בחולים עם אי תפקוד כליתי בינוני (פיני קרייאטני 49-30 מ"ל לדקה) המינון היומי הוא 10 מ"ג ליום. אם יש סובלות לתרופה אחריו 7 ימי טיפול, ניתן להעלות את המינון ל-20 מ"ג ליום.
בחולים עם אי תפקוד כליתי חמור (פיני קרייאטני 29-5 מ"ל לדקה) המינון היומי הוא 10 מ"ג ליום.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אופן השימוש:

יש לקחת את התרופה פעם אחת ביום. יש לקחת את התרופה באותו זמן בכל יום. ניתן ליטול התרופה עם או בלי מזון.

צורת הנטילה:

ו-מנטין טבליות מסיסות בפה נשברות בקלות, אך יש לנוהג בהן בזיהירות. אל תחזיק את הטבליות בידיהם רטובות כיוון שרן עלולות להתמוסס.
- החזק את המגשית (בליסטר) בקצה והפרד 'bowtie' אחת משאר הטבליות שבמגשית על ידי קריעה עדינה לאורך הסימון.
- קלף בעדינות את הצד האחורי.
- הניח את הטבליה על הלשון. הטבליה תתחמס בקלות וניתן יהיה לבלוע אותה ללא מים.

אם נטלה בטיעות מינון גבוהה יותר עליך לנשום לרופא או לעזרה רפואי. נטילת מינון יתר בדרך כלל לא תגרום לנזק, אולם אתה עלול לחוות תופעות לוואי (ראה פרק 4 "תופעות לוואי").
אם נטלה מנת יתר או אם בטיעות בעליל מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית החולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה בזמן המועד, אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.

יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קצובים כפ"י שנקבע על-ידי הרופא. יש להתמיד בטיפול כפ"י שהומלץ על-ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם רופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעע שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות הקשורות בשימוש בתרופה, הייעוץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בו-מנטן עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואוי. יתכן שלא מסבול מ一封 אחת מהן. כלל, תופעות הלואוי שנצפו הן קלות עד בינוניות.

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שימושicas ב-10-1 משתמשים מתוך 100): כאב ראש, ישננות, עצירות, עלייה בתוצאות בדיקת תפוקדי כבד, סחרחות, הפרעות בשינוי משקל, קוצר נשימה, לחץ דם גבוה, תגובה אלרגית לתרופה (رجשות ותר).

תופעות לוואי שאין שכיחות (תופעות שימושicas ב-1-10 משתמשים מתוך 1000): עיפות, דיזומים פטריטיים, בלבול, היזות, הקאות, הפרעות בהילכה, אי ספיקת לב, פקקת ורידים.

תופעות לוואי נדירות מאד (תופעות שימושicas בפחות מאשר אחד מתוך 10,000): פרכוסים.

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה): דלקת לבלב, דלקת כבד (הפטיטיס) ותגובה פסיקטיבית.

מחלת האלצהיימר נקשרת גם בדיכאון, מחשבות אובדן והتابדות. אירועים כאלה דוחו גם במקרים של מטפלים שנטלו בו-מנטן.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואוי חמירה או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא צינה בעlion, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לוחcieה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי יעקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה

מנ הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקומות סגור מחוץ להישג ידים ותווך ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעליה. אין לגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מרופא. אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (date exp) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון

אין לאחסן מעל ל-30°C. אין להשליך תרופות לאשפפה הביתיית או לשירותים. למען שמירה על הסביבה, התייעץ עם הרוקח כיצד תוכל להיפטר מתרופות שאין בהן צורך יותר או שפג תוקפן.

6. מידע נוסף

נוסך על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

Mannitol, microcrystalline cellulose, polacrilin, lactose monohydrate, croscarmellose sodium, magnesium stearate, aspartame, silica colloidal anhydrous, flavor peppermint, iron oxide red (E172), sodium hydroxide, purified water.

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האזינה:

ו-מנטיין 10 מ"ג: טבלייה עגולה שטוחה עם קצotto משופעים, מנוקדת, בצלע ורוד בהיר, עם חרייטה "10" מצד אחד.

ו-מנטיין 20 מ"ג: טבלייה עגולה שטוחה עם קצotto משופעים, מנוקדת, בצלע ורוד בהיר, עם חרייטה "20" מצד אחד.

הטבליות משוקות באזינה בלייסטר המכילה: 10, 14, 28, 42, 50, 56, 70, 84, 98, 100, 112 טבליות.

"ת-can שלא כל גודלי האזינה משוקים.

בעל הרישום וכותבו: ויטאמיד תעשיות פרמצטטיות בע"מ, רחוב הטחנה 6, ת.ד. 114, בניינה 3055002.

שם היצן וכותבו: ג'נפרם A.S., שדרות מרנתון, ק"מ ה-18, פליני, אטיקיוס, יוון.

נערך בספטמבר 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

ו-מנטיין 10 מ"ג: 34808

ו-מנטיין 20 מ"ג: 34810

לשם הפשטות ולהקלת הקירה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.