

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

رينثوك™ 15 ملغ

رينثوك™ 30 ملغ

أقراص ذات تحرير مطّول

المُركب الفعال وكميته:

يحتوي كل قرص ذو تحرير مطّول من رينثوك 15 ملغ على أوباداسيتينيب (على شكل هيميهيدرات) 15 mg Upadacitinib (as hemihydrate)

يحتوي كل قرص ذو تحرير مطّول من رينثوك 30 ملغ على أوباداسيتينيب (على شكل هيميهيدرات) 30 mg Upadacitinib (as hemihydrate)

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء لعلاج: لا تعطيه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بذلك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

بالإضافة للنشرة، توفر للمستحضر رينثوك 'بطاقة معلومات حول الأمان للمتعالج'. تحتوي هذه البطاقة على معلومات هامة عن الأمان، التي عليك معرفتها، قبل بدء العلاج وخلال العلاج بـ رينثوك والتصرف وفقها. يجب قراءة 'بطاقة المعلومات حول الأمان للمتعالج' بتمعن والنشرة للمستهلك قبل بدء إستعمال المستحضر. يجب حفظ البطاقة لقراءتها بتمعن ثانية عند الحاجة.

1) لأى غرض مخصص الدواء؟

رينثوك مخصص لعلاج:

• إلتهاب المفاصل الروماتيزمي (Rheumatoid Arthritis) المتوسط حتى الشديد لدى الكبار، الذين عايشوا إستجابة غير كافية لعلاج سابق بدواء واحد مضاد للروماتيزم أو أكثر من مجموعة DMARDs أو لم يكن بإمكانهم تحمل العلاج. بالإمكان إستعمال رينثوك كعلاج منفرد أو بمشاركة ميتوتريكسات (methotrexate).

• إلتهاب المفاصل الصدفي (Psoriatic Arthritis) لدى الكبار، الذين عايشوا إستجابة غير كافية لعلاج إعتيادي.

• إلتهاب الجلد التأتبي (Atopic Dermatitis) المتوسط حتى الشديد لدى كبار ومرأهفين بأعمار 12 سنة وما فوق والمُرشحين لعلاج جهازي.

• إلتهاب القولون التقرحي (Ulcerative Colitis) المتوسط حتى شديد لدى الكبار، الذين فاسوا من إستجابة غير كافية، عدم الإستجابة أو عدم تحمل لعلاج تقليدي أو بيولوجي سابق.

الفصيلة العلاجية: من المثبتات الإنقائة لجهاز المناعة، من مثبطة جانوس كيناز.

يعمل رينثوك عن طريق تقليل نشاط الإنزيم في الجسم المُسمى "جانوس كيناز" الذي يقلل الإلتهاب.

إلتهاب المفاصل الروماتيزمي

يستعمل رينثوك لعلاج إلتهاب المفاصل الروماتيزمي لدى الكبار. إن إلتهاب المفاصل الروماتيزمي عبارة عن مرض يؤدي إلى إلتهاب المفاصل. إذا كنت تقاسي من إلتهاب مفاصل روماتيزمي نشط، فمن الجائز أن تلتقي في البداية أدوية أخرى، حيث أن أحدها سيكون على ما يbedo ميتوتريكسات. إذا لم تؤثر هذه الأدوية بشكل كافٍ، ستلتقي رينثوك مع أو بدون ميتوتريكسات لعلاج إلتهاب المفاصل الروماتيزمي لديك.

يمكن أن يساعد رينثوك في تقليل الألم، التصلب وإنفاس في المفاصل لديك وما حولها، الألم والتصلب في العمود الفقري، الآفات الجلدية الصدفية والإرهاق، ويمكن أن يبطئ تضرر العظم والغضروف في المفاصل لديك. هذه التأثيرات يمكن أن تسهل على نشاطك اليومي الإعتيادي وبذلك إلى تحسين جودة حياتك.

إلتهاب الفقار الرئيسي

يستعمل رينثوك لعلاج إلتهاب الفقار الرئيسي لدى الكبار. إلتهاب الفقار الرئيسي عبارة عن مرض يؤدي إلى إلتهاب المفاصل، فمن الجائز أن تلتقي في البداية أدوية أخرى. إذا لم تؤثر هذه الأدوية بشكل كافٍ، سوف تلتقي رينثوك لعلاج إلتهاب الفقار الرئيسي لديك.

يمكن أن يساعد رينثوك في تقليل آلام الظهر، التصلب والإلتهاب في العمود الفقري. هذه التأثيرات يمكن أن تسهل على نشاطك اليومي الإعتيادي وبذلك إلى تحسين جودة حياتك.

إلتهاب الجلد التأتبي

يستعمل رينثوك لعلاج إلتهاب الجلد التأتبي المتوسط حتى الشديد لدى كبار ومرأهفين بأعمار 12 سنة وما فوق. بالإمكان إستعمال رينثوك مع أدوية للدهن على الجلد التي تُعطى لعلاج إلتهاب الجلد التأتبي أو كعلاج منفرد. إن تناول رينثوك يمكن أن يحسن وضع الجلد، يقلل الحكة والإحتمامات. يمكن أن يساعد رينثوك في تحسين أعراض الألم، القلق والإكتئاب التي من شأنها أن تظهر لدى مرضى إلتهاب الجلد التأتبي. يمكن أن يساعد رينثوك أيضاً في تحسين إضطرابات النوم وجودة الحياة بشكل عام.

إلتهاب القولون التقرحي

يستعمل رينثوك لعلاج إلتهاب القولون التقرحي عبارة عن مرض إلتهابي في الأمعاء الغليظة. يستعمل رينثوك لعلاج الكبار الذين يعانون من إلتهاب القولون التقرحي الذين يستجيبوا بشكل غير كاف أو أنهم لم يتمكنوا من تناول علاج سابق.

يمكن أن يساعد رينثوك في تقليل علامات وأعراض المرض التي تشمل نزف في البراز، ألم في البطن، الإلحاد وتكرار الذهاب إلى المرحاض. هذه التأثيرات يمكن أن تؤثر على نشاطك اليومي الإعتيادي وبذلك إلى تحسين جودة حياتك.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

• كنت حساساً (أليرجي) لأوباداسيتينيب أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (مفصولة في الفقرة 6)

• وُجد لديك تلوث حاد (مثل إلتهاب الرئتين أو تلوث جلدي جرثومي)

• وُجد لديك مرض السل النشط (TB)

• وُجدت لديك مشاكل خطيرة في الكبد

• كنت حاملاً (أنظر فقرة "الحمل، الإرضاع والخصوبة")

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء قبل العلاج وخلال العلاج بـ رينثوك إحدى طبب إذا:

• وُجد لديك تلوث (سخونة، تعرق، أو قشعريرة، ضيق في التنفس، جلد دافئ، أحمر أو مؤلم أو تقرحات على جسمك، شعور بالتعب، سعال، شعور بحرقة أثناء التبول أو تبول بوتيرة أكبر من المعتاد، صداع شديد مع رقبة مُ Hustleble)، أو إذا كان لديك ذات مرة تلوث متكرر - يمكن أن يقلل رينثوك من قدرة جسمك على محاربة التلوثات ولذلك قد يؤدي إلى تفاقم التلوث الحالي، أو قد يزيد الإلتهاب لديك لتطویر تلوث جديد.

• عانيت من مرض السل أو كنت على إتصال قريب مع شخص مريض بالسل. سيجري طببك فحص لمرض السل قبل بدء العلاج بـ رينثوك ويمكن أن يكرر الفحص أثناء فترة العلاج

• عانيت من تلوث المريض النطاقي (القوباء المنطقية)، لأن رينثوك يمكن أن يسمح بعودة التلوث. إحدى طببتك إذا كان لديك طفح مؤلم على الجلد مع حويصلات، لأن هذه يمكن أن تكون علامات لجلطات دموية في الأوردة معينة.

• كان لديك ذات مرة إلتهاب الكبد (hepatitis) من نوع B أو C

• تلقيت مؤخراً لقاحاً أو أكملت قرراً على تلقى لقاح - ذلك لأن اللقاحات

• وُجد لديك سرطان - لأن طببك سيحتاج إلى أن يقرر فيما إذا لا يزال بإمكانك تلقى رينثوك

• أنت معرضاً لخطرة كبيرة لتطور سرطان الجلد، قد يوصي طببك على إجراءات وقائية، مثل فحوص الجلد الروتينية أثناء تناول رينثوك.

• تحدث مع طببك إذا تطورت لديك آفة جديدة أو تغير في ظاهر الجلد في منطقة معينة. لقد تطورت سرطانات جلد لدى متعالجين معينين عولجوا بـ رينثوك.

• وُجدت لديك مشاكل في الكلى (Anthrax) (أنظر الفقرة 4)

إذا كنت تقاسي من إحدى الأعراض الجانبية التالية، توجه فوراً إلى طببك:

• آلام شديدة في البطن، خاصة تلك المصحوبة بسخونة، غثيان وقيءات الفحوص والمتتابعة

سوف تحتاج إلى إجراء فحوص دم قبل بدء العلاج بـ رينثوك أو أثناء تناول الدواء. ذلك لكي تتحقق ما إذا كان هناك تعداد منخفض لخلايا الدم الحمراء (فقر الدم)، تعداد منخفض لخلايا الدم البيضاء (قلة العدارات أو قلة المفاويات)، نسب عالية للشحوم في الدم (كولستيرون) أو نسب عالية من إنزيمات الكبد. الفحوص هي للتتأكد من أن العلاج بـ رينثوك لا يسبب أي مشاكل.

المسنون

هناك نسبة أعلى من التلوثات لدى أطفال دون عمر 12 سنة أو لدى مرأهفين يزنون أقل من 30 كلغ الذين يعانون من إلتهاب الجلد التأتبي، وهذا لأنهم لم يتم فحصه لدى هؤلاء المرضى.

رينثوك غير موصى به للإستعمال لدى أطفال ومرأهفين دون عمر 18 سنة الذين يعانون من إلتهاب المفاصل الروماتيزمي، إلتهاب المفاصل الصدفي أو إلتهاب الفقار الرئيسي أو إلتهاب القولون التقرحي، وهذا لأنه لم يتم فحصه في هذه الفئة العمرية.

الإنفلونزا/الإنفلونزا

إذا كنت تناولت مؤخراً لقاحاً أو أكملت قرراً على تلقى لقاح - ذلك لأن اللقاحات

• وُجد لديك مشاكل خطيرة في الكبد

• كانت لديك جلطات دموية في أوردة الرئتين (diverticulitis)

إذا كنت تقاسي من إحدى الأعراض الجانبية التالية، توجه فوراً إلى طببك:

• آلام شديدة في البطن، خاصة تلك المصحوبة بسخونة، غثيان وقيءات الفحوص والمتتابعة

سوف تحتاج إلى إجراء فحوص دم قبل بدء العلاج بـ رينثوك أو أثناء تناول الدواء. ذلك لكي تتحقق ما إذا كان هناك تعداد منخفض لخلايا الدم الحمراء (فقر الدم)، تعداد منخفض لخلايا الدم البيضاء (قلة العدارات أو قلة المفاويات)، نسب عالية للشحوم في الدم (كولستيرون) أو نسب عالية من إنزيمات الكبد. الفحوص هي للتتأكد من أن العلاج بـ رينثوك لا يسبب أي مشاكل.

الأطفال والمراهقون

لا يوصى بإستعمال رينثوك لدى أطفال دون عمر 12 سنة أو لدى مرأهفين يزنون أقل من 30 كلغ الذين يعانون من إلتهاب الجلد التأتبي، وهذا لأنهم لم يتم فحصه لدى هؤلاء المرضى.

رينثوك غير موصى به للإستعمال لدى أطفال ومرأهفين دون عمر 18 سنة الذين يعانون من إلتهاب المفاصل الروماتيزمي، إلتهاب المفاصل الصدفي أو إلتهاب الفقار الرئيسي أو إلتهاب القولون التقرحي، وهذا لأنه لم يتم فحصه في هذه الفئة العمرية.

الإنفلونزا/الإنفلونزا

إذا كنت تناولت مؤخراً لقاحاً أو أكملت قرراً على تلقى لقاح - ذلك لأن اللقاحات

• وُجد لديك مشاكل خطيرة في الكبد

• كانت لديك جلطات دموية في أوردة الرئتين (diverticulitis)

إذا كنت تقاسي من إحدى الأعراض الجانبية التالية، توجه فوراً إلى طببك:

• آلام شديدة في البطن، خاصة تلك المصحوبة بسخونة، غثيان وقيءات الفحوص والمتتابعة

سوف تحتاج إلى إجراء فحوص دم قبل بدء العلاج بـ رينثوك أو أثناء تناول الدواء. ذلك لكي تتحقق ما إذا كان هناك تعداد منخفض لخلايا الدم الحمراء (فقر الدم)، تعداد منخفض لخلايا الدم البيضاء (قلة العدارات أو قلة المفاويات)، نسب عالية للشحوم في الدم (كولستيرون) أو نسب عالية من إنزيمات الكبد. الفحوص هي للتتأكد من أن العلاج بـ رينثوك لا يسبب أي مشاكل.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

لا يجوز إستعمال رينثوك أثناء فترة الحمل.

الإرضاع

إذا كنت مرضعة أو تخططين للإرضاع، تحدثي مع طببك قبل تناول هذا الدواء. لا يجوز إستعمال رينثوك أثناء الإرضاع لأن غير المعروف فيما إذا كان هذا الدواء ينتقل لحليب الأم. أنت وطببك تقرران فيما إذا كنت سترضعين أو تتناولين رينثوك. لا تقومي بعمل الإثنين معًا.

من الحمل

إذا كنت إمرأة في سن الخصوبة، يتوجب عليك إستعمال وسائل ناجعة لمنع الحمل من أجل تجنب حمل أثناء تناول رينثوك ولمدة 4 أسابيع على الأقل بعد جرعتك الدوائية الأخيرة من رينثوك. إذا حملت خلال هذه الفترة، عليك التوجه مباشرة إلى طببك.

إذا تلقت طفلتك الدورة الشهرية الأولى خلال فترة تناول رينثوك، فعليك إطلاع الطبيب.

السيادة وإستعمال الماكنات

لا يوجد لـ رينفوك تأثير أو له تأثير محدود على القدرة على السيادة
وإستعمال الماكنات.

3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائمًا إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقًا بالنسبة للجرعة الدوائية وطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

إلتهاب المفاصل الروماتيزمي، إلتهاب المفاصل الصدفي وإلتهاب الفقار الرئيسي

الجرعة الدوائية الإعتيادية عادة هي 15 ملغ مرة واحدة في اليوم.

إلتهاب الجلد التأتبي

الكبار:
الجرعة الدوائية الإعتيادية هي عادة 15 ملغ أو 30 ملغ مرة واحدة في اليوم، كما وُصف من قبل طبيبك. من شأن الطبيب أن يقرر رفع أو خفض جرعتك الدوائية وفقًا لعمل الدواء في جسمك.

المسنون:
إذا كان عمرك 65 سنة وما فوق، فإن الجرعة الدوائية الإعتيادية هي عادة 15 ملغ مرة واحدة في اليوم.

المرأهقون (بأعمار 12-17 سنة) الذين يزنون 30 كلغ على الأقل:

الجرعة الدوائية الإعتيادية هي عادة 15 ملغ مرة واحدة في اليوم.

إلتهاب القولون التقرحي

المقدار الدوائي الإعتيادي هو عادة 45 ملغ مرة في اليوم لمدة 8 أسابيع. من شأن طبيبك أن يتخذ قرار بإبطاله مدة المقدار الدوائي الإبتدائي ذو 45 ملغ لمدة 8 أسابيع إضافية (بالإجمال 16 أسبوعاً). بعد ذلك فإن المقدار الدوائي الإعتيادي هو عادة 15 ملغ أو 30 ملغ مرة في اليوم كعلاج طويل الأمد. من شأن الطبيب أن يقرر رفع أو خفض المقدار الدوائي وفقاً لكيفية إستجابتك للدواء.

المسنون:

إذا كنت بعمر 65 سنة وما فوق، فإن المقدار الدوائي الإعتيادي هو عادة 15 ملغ مرة في اليوم كعلاج طويل الأمد.

من شأن الطبيب أن يقرر خفض المقدار الدوائي إذا وجدت لديك مشاكل في الكلى، أو إذا وصفت لك أدوية معينة أخرى.

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها

طريقة التناول

• يجب بلع القرص كاملاً مع الماء. لا يجوز شطر، سحق، مضخ أو كسر القرص قبل بلعه لأن هذا قد يغير من كمية الدواء التي تدخل لجسمك

• لمساعدتك على تذكر تناول رينفوك، تناوله كل يوم في نفس الوقت

• بالإمكان تناول الأقراص مع أو بدون طعام

• تجنب الطعام أو الشراب الذي يحتوي على الجريب فروت خلال فترة تناولك (أو تتعالج به) رينفوك لأن ذلك قد يزيد من إحتمال ظهور أعراض جانبية، عن طريق زيادة كمية الدواء في جسمك.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر فعليك التوجه لطبيبك. لربما تقاسي بعضًا من الأعراض الجانبية المُفصلة في الفقرة 4.

إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء

• إذا فوتت جرعة دوائية واحدة، قم بتناولها فور تذكر ذلك

• إذا نسيت جرعتك الدوائية لمدة يوم كامل، قم بتفويت الجرعة الدوائية التي خسرتها وتناول فقط جرعة دوائية واحدة في اليوم التالي كالمعتاد

• لا يجوز تناول جرعة دوائية مضاعفة للتغويض عن القرص المنسني يجب المواطبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء

لا يجوز التوقف عن تناول رينفوك إلا إذا أعطاك الطبيب تعليمات للتوقف عن تناوله.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلحة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال رينفوك قد يسبب أعراضًا جانبية لدى بعض المستعملين. لا تنتهي قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز أن تعاين أي منها.

أعراض جانبية خطيرة

إنك مع طبيبك أو توجه فوراً لتلقي مساعدة طبية إذا كنت تقاسي من أية علامات للتلوث، مثل:

• القوباء المنطقية أو طفح جلدي مؤلم مع حويصلات (الهربس النطاقي) - أعراض جانبية شائعة (common) - أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100

• تلوث في الرئتين (التهاب الرئتين)، الذي بإمكانه أن يسبب ضيق في التنفس، سخونة وسعال مع بلغم - أعراض جانبية غير شائعة (uncommon)

- أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000

أعراض جانبية أخرى

إنك مع طبيبك إذا لاحظت إحدى الأعراض الجانبية التالية:

أعراض جانبية شائعة جداً (very common) - أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من بين عشرة

• تلوثات في الحنجرة والأنف

• حب الشباب

أعراض جانبية شائعة (common) - أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100

• سعال

• سخونة

• جروح البرد (الهربس البسيط)

• غثيان

• إرتفاع في نسبة الإنزيم المُسمى كرياتين كيناز، الذي يظهر في فحوص الدم

• تعداد منخفض لخلايا الدم البيضاء، الذي يظهر في فحوص الدم

• ارتفاع نسب الكوليسترول (نوع من الشحوم في الدم) كما يظهر في الفحوص

• ارتفاع في نسب إنزيمات الكبد، الذي يظهر في فحوص الدم (علامة لمشاكل في الكبد)

• زيادة في الوزن

• إلتهاب (انتفاخ) بصيلات الشعر

• إنفلونزا

• فقر الدم

• آلام في البطن

• إرهاق (شعور بإرهاق غير عادي وضعف)

• صداع

• شرى (urticaria)

• تلوث في المسالك البولية

• طفح

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) - أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000

• طلاء الفيلم:

• فطريات في الفم (بقع بيضاء في الفم)

• إرتفاع نسب الدهون الثلاثية (نوع من الشحوم) في الدم، كما يظهر في الفحوص

• إلتهاب الرّتج (diverticulitis)، تطور إلتهاب مؤلم في جيوب صغيرة تتشكل داخل المعي الخاص بك.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبلیغ عن اعراض جانبية

بالإمكان التبلیغ عن اعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبلیغ عن اعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبلیغ عن اعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5) كيفية تخزين الدواء؟

• تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيديك ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضيع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تنسِ التقيّد بدون تعليمات صريحة من الطبيب

• لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة الخارجية واللوحة (بليستر). يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر

يجب المواطبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء لا يجوز التوقف عن تناول رينفوك إلا إذا أعطاك الطبيب تعليمات للتوقف عن تناوله.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلحة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

6) معلومات إضافية

ماذا يحتوي رينفوك يحتوي الدواء بالإضافة للمركب الفعال أيضًا على: رينفوك 15 ملغ أقراص ذات تحريك مطول لب القرص:

• طلاء الفيلم: microcrystalline cellulose, mannitol, hypromellose, tartaric acid (powdered), magnesium stearate, silica colloidal anhydrous/colloidal silicon dioxide

• polyvinyl alcohol, macrogol/polyethylene glycol, talc, titanium dioxide (E171), black iron oxide (E172)/ferrosoferric oxide, iron oxide red (E172)

• رينفوك 30 ملغ أقراص ذات تحريك مطول لب القرص:

• طلاء الفيلم: microcrystalline cellulose, mannitol, hypromellose, tartaric acid (powdered), magnesium stearate, silica colloidal anhydrous/colloidal silicon dioxide

• طلاء الفيلم: polyvinyl alcohol, macrogol/polyethylene glycol, talc, titanium dioxide (E171), iron oxide red (E172)

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة رينفوك 15 ملغ أقراص ذات تحريك مطول

رينفوك 15 ملغ أقراص ذات تحريك مطول هي بلون بنفسجي، مطاولة، محدبة من كلا الجانبين، مطبوع على جانب واحد 'a15'.

تتوفر الأقراص بلوبيات (بليسترات) ضمن علب تحوي على 28 أو 98 قرصاً ذات تحريك مطول وفي عبة ذات 84 تحوي على 3 علب، كل واحدة تحوي على 28 قرصاً ذو تحريك مطول.

كل لوبيه (بليستر) التي تمثل أيام الأسبوع تحتوي على 7 أقراص.

رينفوك 30 ملغ أقراص ذات تحريك مطول مثبت على 30 درجة مئوية

• طلاء الفيلم: رينفوك 30 ملغ أقراص ذات تحريك مطول لب القرص:

• طلاء الفيلم: رينفوك 30 ملغ أقراص ذات تحريك مطول هي بلون أحمر، مطاولة، محدبة من كلا الجانبين، مطبوع على جانب واحد 'a30'.

تتوفر الأقراص بلوبيات (بليسترات) ضمن علب تحوي على 28 أو 98 قرصاً ذات تحريك مطول وهي متساوية في كلا الجانبين، مطاولة، محدبة، مطبوع على جانب واحد 'a30'.

• صاحب الإمتنان وعنوانه: أبيقي بيوفارما م.ض، شارع هاحاراش 4، هود هشارون، إسرائيل، كنولشتراسا، لوفيفيسهافن، ألمانيا

• تم إعدادها في آب 2022 بموجب سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

• رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: رينفوك 15 ملغ أقراص ذات تحريك مطول 164-36194

• رينفوك 30 ملغ أقراص ذات تحريك مطول 168-69-37036

لمعلومات إضافية ولمركز برنامج الدعم إتصلوا 6718*



من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

RINAPLTIK OCT22_CL_P4