

עלון לצריכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"א- 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

אוקסקטין[®] סירוף

חומרים פעילים:

כל 5 מ"ל מכילים:

אוקסוממאזין 1.65 מ"ג (oxomemazine 1.65 mg)
גיאיכול סולפונאט אשלגן 33.30 מ"ג (potassium guiacol sulphonate 33.30 mg)

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים: ראה פרק 2 סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 "מידע נוספת".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

סירוף נגד שיעול, מכיח.

קבוצה רפואיית:

אוקסוממאזין - אני היסטמין מדכא שייעול מקבוצת הפנווטיאזינים.
גיאיכול סולפונאט אשלגן - מכיח.

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה:

- אם אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים (אוקסוממאזין או גיאיכול סולפונאט אשלגן) או לכל אחד ממרכיבי התרופה האחרים (ראה פרק 6).
- אם אתה אלרגי לתרופה אנטי-היסטמיןית המשמשת לטיפול באלהריגיות.
- ילדים מתחת לגיל שנתיים.
- אם אי פעם סבלת מירידה משמעותית ברמת תא דם לבנים מסוימים (גרנולוציטים) בدم (אגרנולוציטוזיס).
- אם אתה סובל מiosis במתן שתן (בעיה בבלוטת הערמוניית או בעיות אחרות).
- אם אתה מצוי בסיכון לגלואקומה סגורת-זווית (לחץ תוך-עיני גבוה העולף לפגוע בראשיה).
- אם אתה נוטל תרופה המכילה קאברגולין או קוינאנגוליד (משמשות לעיכוב ייצור מופרץ של פרולקטין) (ראה סעיף "תגובהות בין תרופתיות").

ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- אם השיעול נמשך למרות השימוש בסירופ אוקסקטין, אין להגדיל את המינונים. יש להתייעץ עם הרופא.
- למעשה, שייעול הוא תסמיון העשי להיגרם על ידי גורמים שונים: זיהומיים נשימתיים, ברונכיטיס, שפעת, אלרגיה, אסתמה, שעלת, גירוי וכו'.
- אין להיחס לאור שימוש או לקרניים אולטר-סגולות (AVU) במהלך הטיפול.
- יש להשתמש בתרופה זו בזהירות בשל הסיכון לשינויו.
- שילוב עם תכשירים רפואיים אחרים להרגעה אינם מומלץ (ראה סעיף "תגובהות בין תרופתיות").

לפני הטיפול באוקסקטין ספר לרופא אם:

- אתה סובל ממחלה כרונית של הסمفונות או הריאות עם שייעול וליחה.
- אתה סובל ממחלת כבד כרונית (אי ספיקת כבד חמורה) או ממחלת כלות כרונית (אי ספיקת כלות חמורה), הרופא יצטרכר להתאים את המינון למצבך.
- אתה סובל ממחלת לב וכלי דם.
- אתה סובל מאפילפסיה.

- אתה מעל גיל 65 שנים (במיוחד במקרה של עצירות קרונית, קשיי במתן שתן בשל עליה בגין בלוטת הערמונית, תה-לחץ דם, סחרחות או ישנוויות).
- ילדר סובל מאסתמה, מהחזר קיבתי-ושטן.

במהלך הטיפול, התייעץ עם הרופא:
אם אתה סובל מחום עם או ללא סימני זיהום (אנגיינה), חיוורון או חזעה. במקרה של ספק, אל תהסס לפנות לרופא או לרוקח לייעוץ.

שימוש
שימוש בטבק מחייב שיעול או גורם לשיעול ממושך.

ילדים ומתבגרים
און להשתמש בתרופת ילדים מתחת לגיל שנתיים.

תగובות בין תרופתיות
אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

לעתים אין ליתול סירופ אוקסיקטין עם תרופות המכילות קابرוגולין או קוונאגוליד (המשמשות לעיכוב ייצור מופרץ של פרולקטין (ראה סעיף "אין להשתמש בתרופת...").
עליך להימנע מנתילת תרופות המכילות אלכוהול במהלך הטיפול. עליך להמתין לפחות שעתים בין נטילת סירופ אוקסיקטין ובין ניתילת תכשירים המגנים על תאים (cytoprotectants), נוגדי חומצה או פחם (המשמשים להקלת הפרעות עיכול).
טרופות אחרות יכולות להפחית ערנות ולגרום לשינויות. שילובן עם אוקסיקטין עלול להגברת השפעה זו. ספר לרופא או לרוקח אם אתה נוטל:

- נגירות מורפין (המשמשות לשיליטה בכאב, לדיכוי שיעול או לגמilia מההתמכרות לסמים)
- תרופות נוירולפטיות
- בנזודיאזפינים (תרופות לטיפול בחרדה)
- ברביוטרים
- תרופות היפנוטיות (כדור שינה)
- נוגדי דיאקואן
- אנט-היסטמינים סדטיביים (מרגיעים)
- תרופות מסומיות לטיפול בגין לחץ דם
- תרופות המכילות באקלופן ותילידומיד
- מפלוקווין, קלורוקווין, בופרופין, טרמדול.

שימוש בתרופה ומצור
יש ליתול את הטרופה עם הארוחה או עם חלב.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול
עליך להימנע משתיית אלכוהול או מנתילת תרופה המכילה אלכוהול במהלך הטיפול.

הירין והנקה

הירין
בדרכ כל אין להשתמש בתרופה זו במהלך השלישי הריאון לאילם כה הרופא המלאץ אחרה. אם גילית שאת בהירין במהלך הטיפול, התייעצי עם הרופא מייד: רק הרופא יוכל להתאים את הטיפול למצבך.
בסוף ההירין, שימוש לרעה בתרופה זו עלול לגרום להשפעות מזיקות על היילוד. לפיכך, עליך תמיד לפנות לרופא לייעוץ טרם השימוש בה ולוודם אין לעבר על המנה ומשך הטיפול המומלצים.

הנקה
תרופה זו עוברת לחלב אם. לאור התכונות הסדטיביות (מרגיעות) הבולטות של הטרופה, עליך להימנע מנתילתה אם את מניקה.
אם את בהירין או מניקה, אם את חושבת שאת בהירין או מתכנתת הירין, פנו לרופא או לרוקח לייעוץ טרם ניתילת תרופה זו.

נהיגה ושימוש במכונות

תרופה זו עלולה לגרום לשינויות, במיוחד בתחלת הטיפול. הנהיגה או שימוש במכונות אינם מומלצים אם אתה חווית תופעה זו. הסיכון לשינויות מוגבר אם אתה צריך משקאות אלכוהוליים, תרופות המכילות אלכוהול או תרופות סדטיביות (מרגינעות) אחרות (ראה סעיף "תగובות בין תרופתיות").

מידע חשוב על חלק המרכיבים של התרופה

תרופה זו מכילה סוכר. אם נאמר לך על ידי הרופא שיש לך אי-סיבות לסתורם מסוימים, פנה לרופא לפני השימוש בתרופה זו. כמו כן, היא עלולה להזיק לשיניים.

תרופה זו מכילה סorbitol. כל 5 מ"ל מכילים 250 מ"ג סorbitol ששהקלים לריכוז של 5%. Sorbitol הוא מקור לפוקטוז. אם נאמר לך על ידי הרופא שיש לך או לילדך אי-סיבות לסתורם מסוימים או אם אוחנטם באין סיבות תורשתית לפוקטוז, הפרעה גנטית נדירה, פנה לרופא לפני שאתה או יליך גוטלים תרופה זו.

תרופה זו מכילה סודיום בנזואט. כל 5 מ"ל מכילים 33.3 מ"ג סודיום בנזואט ששהקלים לריכוז של 0.7% a/w.

תרופה זו מכילה פחחות מ-1 מילימול (23 מ"ג) נתן למינה של 5 מ"ל, ולפיכך היא למעשה "נטולת נתן".
תרופה זו מכילה פרופילן גליקול. כל 5 מ"ל מכילים 250 מ"ג פרופילן גליקול ששהקלים לריכוז של 5%.
אם יליך קטן מחמש שנים, שוחח עם הרופא/הרופא לפניו שתיתן תרופה זו, במיחוד אם יליך משתמש בתרופות אשר מכילות פרופילן גליקול או אלכוהול. אם את בהריון או מניקה, אם אתה סובל ממחלת כבד או כלויות, אין ליטול תרופה זו אלא אם הרופא המליץ על כך. יתכן שהרופא יבצע בדיקות נוספת בסופות במהלך הטיפול תרופה זו.

3. כיצד השתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

עליך להשתמש בכוסית המדידה המצורפת. אין להשתמש בכפית ביתית לצורכי מדידת כמות התרופה. ה캡יות הביתיות שונות בגודלן ויתכן שלא תקבל את כמות התרופה הנכונה.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

מומלץ ליטול אוקסיקטן סירופ בערב בגלל ההשפעה המרגיעה של התרופה, במיוחד בתחלת הטיפול.

אין לעבר על המינה המומלצת.

אופן המתן

יש ליטול תרופה זו דרך הפה. השתמש בכוס המדידה המצורפת לקופסה.

אין להחזיק את התרופה בפה מעבר לזמן הדורש לבלייתה.

משך הטיפול

הטיפול אמר להיות קצר (מספר ימים) ויש להשתמש בתרופה רק כאשר מופיע שיעול.

אם השיעול מתמשך, פנה לרופא ליעוץ.

אם נטילת בטיעות מינון גבוהה יותר או אם בטיעות בלבד מלבד מינון של בית חולמים והבא את אריזת התרופה איתך.

נטילת מינון יתר של סירופ אוקסיקטן עלולה לגרום לפרכוסים (במיוחד בילדים), ליشنוניות, לביעות ערנות, לתרדמת.

אם שכחת ליטול את התרופה אין ליטול מנה כפולה על מנת לפצות על המינה היחידה שנשכחה.

יש להתמיד טיפול כפי שהוא ממלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך בבדיקה התווית והמנה בכל פעע שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זיקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באוקסיקטין עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבחן למקרא רשיימת תופעות הלוואי. יתכן שלא תסבול מכך אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מיד לרופא אם:

- אתה מפתח סימני אלרגיה לתרופה כגון:
 - אודם בעור, אקזמה, כתמים סגולים על העור (פורפורה)
 - סרפה
 - בזקת, נפיחות פתואומית בפנים / או בצוואר, אשר עלולה לגרום לקשי נשימה ועלולה להיות מסוכנת (בזקת על שם Quincke)
 - קריישה פתואומית עם צניחה חמורה בלחץ דם (הלם אנפילקט')
- אתה סובל מתגובה עורית מופרצת לאחר חשיפה לשמש או לקרינת UV
- אתה סובל מירידה במספר תאי דם מסוימים: תאים לבנים (נויטרופניה, אגרנולוציטוזיס), טסיות (טרומובוציטופניה) או תאים אדומים (אנמיה המוליטית)

תופעות לוואי נוספת

- ישנןויות, ירידה בעורנות במינוח בתחילת הטיפול
 - בעיות בזכרון או בריכוז, סחרחות
 - קושי בתיאום תנועות, רעד
 - בלבול, הדאות
 - יובש בפה, הפרעות ראייה, קושי במתן שタン (אצירת שタン), עצירות, דפוקות לב (פלפיטציות), צניחה חמורה בלחץ דם בעת קימה לעמידה, אשר לעתים גורמת לשחרחות / או לעילפון (תת-לחץ דם אורטוסטטי).
- במקרים נוספים יותר, יכולם להופיע סימני התרגשות (אי שקט, עצבנות, נדודי שינה).

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמורה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צינה בעלון, עלייך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופה". שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקיים לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידים וטווים ראייתם של ילדים / או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרום להקה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחריר תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האזינה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותן חודש.
- יש לאחסן מתחת ל-25°C.
- חי מדף לאחרפתיחה התכשיר: 12 חודשים.
- אין להשאיר תרופות לביב או לאשפה. שאל את הרוקח כיצד להשמיד תרופות שאין בשימוש.
- אמצעים אלו יעזרו לשמר על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסך על המרכיבים הפעילים, התרופה מכילה גם:

Sugar, sorbitol 70% solution, propylene glycol, sodium benzoate, sodium citrate, caramel flavor, acid citric anhydrous, caramel color liquid, purified water.

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האזינה:

תמייה צלולה עם ריח קרמל.

הטיסוף ארוז בבקבוק פלסטיק עם פקק עמיד לפתיחה בפני ילדים. כל אזינה מכילה 30 מ"ל או 120 מ"ל וכוסית מדידה.

יתכן שלא כל גודלי האזיות משווים.

היצן ובעל הרישום: תרו תעשייה רוקחית בע"מ, רח' הקיטור 14, מפרץ חיפה, 2624761

נערך באוגוסט 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
030-54-21959-00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.