

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

זיאגן טבליות, 300 מ"ג

טבליות מצופות

כל טבליה מכילה אבקיור (כסולפאט) (abacavir as sulfate) 300 מ"ג.

רשימת המרכיבים הנוספים מפורטת בסעיף 6. שים לב למידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה בסעיף 2.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

חשוב - תגובות רגישות יתר

זיאגן מכילה אבקיור (שהוא גם חומר פעיל בתרופות כגון קיווקסה, טריומק וטריזיוור). אנשים מסוימים הלוקחים אבקיור עלולים לפתח תגובות רגישות יתר (תגובה אלרגית חמורה), העלולה להיות מסכנת חיים אם הם ימשיכו לקחת תכשירים המכילים אבקיור. עליך לקרוא בעיון את כל המידע תחת 'תגובות רגישות יתר' במסגרת בסעיף 4.

אריזת זיאגן כוללת כרטיס אזהרה, כדי להזכיר לך ולצוות הרפואי על רגישות יתר לאבקיור. הוצא כרטיס זה ושמור אותו איתך כל הזמן. כרטיס זה מכיל מידע בטיחותי חשוב שעליך לדעת לפני התחלת הטיפול ובמהלך הטיפול בזיאגן ולפעול על פיו.

יש לעיין בכרטיס אזהרה ובעלון לצרכן בטרם תחילת השימוש בתכשיר.

1. למה מיועדת התרופה?

זיאגן משמשת לטיפול בזיהום של HIV (תסמונת הכשל החיסוני האנושי).

קבוצה תרפויטית: זיאגן מכילה את המרכיב הפעיל אבקיור. אבקיור שייך לקבוצה של תרופות אנטי רטרו-ויראליות הנקראות אנלוגים נוקלאוזידים מעכבי טרנסקריפטאז הופך (NRTIs).

זיאגן אינה מרפאת לחלוטין זיהום של HIV; היא מפחיתה את רמת הווירוס בגופך, ושומרת אותו ברמה נמוכה. היא גם מעלה את ספירת תאי CD4 שבדמך. תאי CD4 הם סוג של תאי דם לבנים שהינם חשובים בסיוע לגופך להילחם בזיהום.

לא כל אחד מגיב לטיפול בזיאגן באותו אופן. הרופא שלך ינטר את יעילות הטיפול שלך.

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לאבקיור (או לכל תרופה אחרת המכילה אבקיור כגון טריזיור, טריומק או קיווקסה) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורט בסעיף 6).

קרא בעיון את כל המידע על תגובות רגישות יתר בסעיף 4.
בדוק עם הרופא שלך אם אתה חושב שזה חל עליך.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

אנשים מסוימים הלוקחים זיאגן ל-HIV הינם בסיכון מוגבר לתופעות לוואי חמורות. עליך לשים לב במיוחד לסיכונים הנוספים:

- אם יש לך מחלת כבד מתונה או חמורה
 - אם סבלת בעבר ממחלת כבד, כולל דלקת כבד מסוג B או C
 - אם אתה במשקל עודף משמעותי (במיוחד אם את אישה)
 - אם יש לך מחלת כליה חמורה.
- פנה לרופא שלך אם אחד מאלה חל עליך. ייתכן שתזדקק לבדיקות נוספות, כולל בדיקות דם, בזמן שאתה לוקח את התרופה שלך. ראה סעיף 4 למידע נוסף.

תגובות רגישות יתר לאבקיור

גם מטופלים שאין להם את הגן HLA-B*5701 יכולים עדיין לפתח תגובות רגישות יתר (תגובה אלרגית חמורה).

קרא בעיון את כל המידע לגבי תגובות רגישות יתר בסעיף 4 בעלון זה.

סיכון להתקף לב

לא ניתן לשלול כי אבקיור עלול להגביר את הסיכון ללקות בהתקף לב. ספר לרופא שלך אם יש לך בעיות לב, אם אתה מעשן או שיש מחלות אחרות העלולות להגביר את הסיכון שלך למחלת לב, כגון לחץ דם גבוה או סוכרת. אל תפסיק לקחת זיאגן אלא אם הרופא שלך ממליץ לך לעשות כך.

שים לב לתסמינים חשובים

אנשים מסוימים הלוקחים תרופות לזיהום של HIV מפתחים מצבים רפואיים אחרים, שיכולים להיות חמורים. עליך לדעת על סימנים ותסמינים חשובים כדי לשים לב אליהם בזמן שאתה לוקח זיאגן. קרא את המידע 'תופעות לוואי אפשריות אחרות של טיפול משולב ל-HIV' בסעיף 4 של עלון זה.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. זכור לידע את הרופא או הרוקח שלך אם אתה מתחיל לקחת תרופה חדשה בזמן שאתה לוקח זיאגן.

ישנן תרופות המגיבות עם זיאגן

אלה כוללות:

- פניטואין, לטיפול באפילפסיה.
- ספר לרופא שלך אם אתה לוקח פניטואין. ייתכן שהרופא שלך יצטרך לעקוב אחר מצבך בזמן שאתה לוקח זיאגן.
- מתדון, המשמש כתחליף להרואין. אבקוריר מגביר את הקצב שבו מתדון מתפנה מהגוף. אם אתה לוקח מתדון תיבדק לתסמיני גמילה. ייתכן שמנת המתדון שלך תצטרך להשתנות.
- ספר לרופא שלך אם אתה לוקח מתדון.
- ריוסיגואט (riociguat), המשמש לטיפול בלחץ דם גבוה בכלי הדם (עורקי הריאה) המובילים את הדם מהלב לריאות. ייתכן שהרופא שלך יצטרך להפחית את מינון הריוסיגואט שאתה לוקח, מכיוון שאבקוריר עשוי להעלות את רמות הריוסיגואט בדם שלך.

היריון, הנקה

היריון

זיאגן אינה מומלצת לשימוש במהלך ההיריון. זיאגן ותרופות דומות עלולות לגרום לתופעות לוואי בעובריים. אם לקחת זיאגן במהלך ההיריון שלך, הרופא שלך עשוי להורות על בדיקות דם רגילות ועל בדיקות אבחנתיות נוספות כדי לעקוב אחרי ההתפתחות של ילדך. בילדים שאימותיהם לקחו תרופות NRTIs במהלך ההיריון, היתרון של ההגנה מפני HIV עלה על הסיכון של תופעות הלוואי.

הנקה

הנקה אינה מומלצת בנשים החיות עם HIV מכיוון שזיהום של HIV יכול לעבור לתינוק בחלב אם. כמות קטנה של החומר הפעיל בזיאגן יכולה גם היא לעבור לחלב האם שלך. אם הינך מניקה או חושבת להניק, עלייך להתייעץ עם הרופא בהקדם האפשרי. נהיגה ושימוש במכוונות אל תנהג או תפעיל מכוונות אלא אם אתה מרגיש טוב.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

תרופה זו מכילה פחות מ-1mmol נתרן (23 מ"ג) ליחידת מינון, לכן ניתן לומר כי היא למעשה "נטולת נתרן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ולאופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

יש לבלוע את טבליות זיאגן עם מעט מים. ניתן לקחת זיאגן עם או בלי מזון.

אם אינך יכול לבלוע את הטבליה(ות), אתה יכול לרסק ולערבב אותן עם כמות קטנה של מזון או שתייה, ולקחת את כל המנה מיד.

מותר לכתוש/לחצות/ללעוס את הטבליה.

הישאר בקשר קבוע עם הרופא שלך

זיאגן עוזרת לשלוט במצבך. עליך להמשיך לקחת אותה כל יום כדי למנוע ממחלתך להחמיר. ייתכן שעדיין תפתח מחלות וזיהומים אחרים הקשורים לזיהום של HIV. שמור על קשר עם הרופא שלך, ואל תפסיק לקחת זיאגן מבלי להיוועץ ברופא שלך.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:

מבוגרים, מתבגרים וילדים השוקלים לפחות 25 ק"ג

המינון המקובל של זיאגן הוא 600 מ"ג ביום. ניתן לקחת כטבליה אחת של 300 מ"ג פעמיים ביום או שתי טבליות של 300 מ"ג פעם אחת ביום.

ילדים מגיל שנה השוקלים פחות מ-25 ק"ג

המינון הניתן תלוי במשקל הגוף של ילדך. המינון המקובל הוא:

- ילדים השוקלים לפחות 20 ק"ג ופחות מ-25 ק"ג: המינון המקובל של זיאגן הינו 450 מ"ג ליום, הניתן כ-150 מ"ג (חצי טבליה) בבוקר ו-300 מ"ג (טבליה אחת שלמה) בערב או 450 מ"ג (טבליה וחצי) פעם אחת ביום, כפי שהומלץ על ידי הרופא שלך.
- ילדים השוקלים לפחות 14 ק"ג ופחות מ-20 ק"ג: המינון המקובל של זיאגן הינו 300 מ"ג ליום, הניתן כ-150 מ"ג (חצי טבליה) פעמיים ביום או 300 מ"ג (טבליה אחת שלמה) פעם ביום, כפי שהומלץ על ידי הרופא שלך.

ניתן לחצות את הטבליה למנות שוות.

קיימת גם תמיסה לשתייה (20 מ"ג אבקור/מ"ל) הזמינה לטיפול בילדים מעל גיל שלושה חודשים השוקלים פחות מ-14 ק"ג, עבור אנשים שצריכים מינון נמוך יותר מהרגיל או עבור מי שאינו יכול לקחת טבליות.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, קח אותה ברגע שתזכר בכך. אחר כך המשך בטיפול כרגיל. אין לקחת מנה כפולה כדי לפצות על מנה שנשכחה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא או

הרוקח.

חשוב לקחת זיאגן באופן סדיר, כיוון שאם תיקח את התרופה במרווחים לא סדירים, קיים סיכוי גבוה יותר לחוות תגובת רגישות יתר.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

אם הפסקת לקחת זיאגן מסיבה כלשהי - במיוחד בגלל שאתה סבור שיש לך תופעות לוואי, או בגלל שיש לך מחלה אחרת:

פנה לרופא שלך לפני שאתה מתחיל לקחת אותה שוב. הרופא שלך יבדוק אם התסמינים שלך היו קשורים לתגובת רגישות יתר. אם הרופא סבור שייתכן שיש ביניהם קשר, אתה תונחה שלא לקחת זיאגן או כל תרופה אחרת המכילה אבקור (למשל טריזויור, טריומק או קיווקסה) שוב לעולם. חשוב שתפעל לפי הנחיה זו.

אם הרופא שלך הנחה שאתה יכול להתחיל לקחת זיאגן שוב, ייתכן שתבקש לקחת את המנות הראשונות שלך במקום שבו תהיה גישה נוחה לטיפול רפואי, אם תזדקק לו.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

במהלך הטיפול ל-HIV יכולה להיות עלייה במשקל וברמות השומנים והסוכר בדם. זה קשור חלקית לבריאות ולאורח החיים, ובמקרה של שומנים בדם לפעמים לתרופות ה-HIV עצמן. הרופא שלך יבדוק שינויים אלה.

כמו בכל תרופה, השימוש בזיאגן טבליות עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

בזמן שאתה מטופל בזיהום של HIV, ייתכן שיהיה קשה להבחין אם התסמין הוא תופעת לוואי של זיאגן או של תרופות אחרות שאתה לוקח או השפעה של מחלת ה-HIV עצמה. לכן חשוב ביותר לדווח לרופא שלך על כל שינוי בבריאותך.

גם מטופלים שאין להם את הגן HLA-B*5701 יכולים עדיין לפתח תגובת רגישות יתר (תגובה אלרגית חמורה), המתוארת בעלון זה במסגרת תחת הכותרת 'תגובות רגישות יתר'.

חשוב מאוד שתקרא ותבין את המידע על תגובה חמורה זו.

בנוסף לתופעות הלוואי הרשומות בהמשך עבור זיאגן, מצבים רפואיים אחרים יכולים להתפתח במהלך טיפול משולב ל-HIV.

חשוב לקרוא את המידע המופיע בהמשך סעיף זה תחת 'תופעות לוואי אפשריות אחרות של טיפול

תגובות רגישות יתר

זיאגן מכילה אבקויר (שהוא גם חומר פעיל בטריזוויר, טריומק וקיווקסה). אבקויר יכול לגרום לתגובה אלרגית חמורה הידועה כתגובת רגישות יתר.

תגובות רגישות יתר אלה נראו בשכיחות גבוהה יותר באנשים הלוקחים תרופות המכילות אבקויר.

מי יפתח תגובות אלו?

כל אחד הלוקח זיאגן עלול לפתח תגובת רגישות יתר לאבקויר, העלולה להיות מסכנת חיים אם ימשיך לקחת זיאגן.

ישנה סבירות גבוהה יותר שתפתח תגובה כזו אם יש לך את הגן HLA-B*5701 (אולם אתה עלול לפתח תגובה אפילו אם אין לך גן זה). היה עליך להיבדק לגן זה לפני שזיאגן נרשמה לך. אם אתה יודע שיש לך גן זה, ספר על כך לרופא שלך לפני שאתה לוקח זיאגן.

כ-3 עד 4 מכל 100 מטופלים המטופלים באבקויר בניסוי קליני, שלא היה להם את הגן HLA-B*5701, פיתחו תגובת רגישות יתר.

מהם התסמינים?

התסמינים השכיחים ביותר הם:

- חום ופריחה בעור.

תסמינים שכיחים אחרים הם:

- בחילה, הקאות, שלשול, כאב בטן ועייפות קשה.

תסמינים אחרים כוללים:

כאבים במפרקים או בשרירים, נפיחות בצוואר, קוצר נשימה, כאב גרון, שיעול, כאב ראש ארעי, דלקת בעין (דלקת לחמית העין), כיבים בפה, לחץ דם נמוך, עקצוץ או חוסר תחושה בכפות הרגליים או כפות הידיים.

מתי תסמינים אלו מופיעים?

תגובות רגישות יתר עלולות להתחיל בכל זמן במהלך הטיפול בזיאגן, אולם סביר יותר שבמהלך 6 השבועות הראשונים לטיפול.

אם אתה מטפל בילד אשר מטופל בזיאגן, חשוב שתבין את המידע על תגובת רגישות יתר זו. אם הילד שלך מפתח את התסמינים שמתוארים מטה חשוב כי תעקוב אחר ההוראות שניתנו.

פנה לרופא שלך מיד:

1. אם אתה או ילדך מפתח פריחה בעור, או

2. אם אתה או ילדך מפתח תסמינים מ-2 הקבוצות הבאות לפחות:

- חום

- קוצר נשימה, כאב גרון או שיעול

- בחילה או הקאות, שלשול או כאב בטן

- עייפות קשה או כאבים או הרגשת חולי כללית.

ייתכן שהרופא שלך ינחה אותך להפסיק לקחת זיאגן.

אם הפסקת לקחת זיאגן

אם הפסקת לקחת זיאגן בגלל תגובת רגישות יתר, **אסור לך לקחת שוב לעולם זיאגן או כל תרופה אחרת המכילה אבקור (כגון טריזיויר, טריומק או קיווקסה).** אם תיקח, לחץ הדם שלך עלול לצנוח בצורה מסוכנת בתוך שעות, דבר שעלול לגרום למוות.

אם הפסקת לקחת זיאגן מכל סיבה - במיוחד בגלל שאתה סבור שיש לך תופעות לוואי, או בגלל שיש לך מחלה אחרת:

פנה לרופא שלך לפני שאתה מתחיל לקחת אותה שוב. הרופא שלך יבדוק אם התסמינים שלך היו קשורים לתגובת רגישות יתר. אם הרופא סבור שייתכן שיש ביניהם קשר, **אתה תונחה שלא לקחת זיאגן או כל תרופה אחרת המכילה אבקור (למשל טריזיויר, טריומק או קיווקסה) שוב לעולם.** חשוב שתפעל לפי הנחיה זו.

לעיתים, תגובות רגישות יתר התפתחו באנשים שהתחילו לקחת תכשירים המכילים אבקור שוב, אבל שהיה להם רק תסמין אחד בכרטיס האזהרה לפני שהפסיקו לקחת אותם.

לעיתים נדירות מאוד, מטופלים שלקחו תרופות המכילות אבקור בעבר ולא היה להם תסמינים כלשהם של רגישות יתר, פיתחו תגובת רגישות יתר כאשר הם החלו לקחת תרופות אלה שוב.

אם הרופא שלך הנחה שאתה יכול להתחיל לקחת זיאגן שוב, ייתכן שתבקש לקחת את המנות הראשונות שלך במקום שבו תהיה גישה נוחה לטיפול רפואי אם תזדקק לו.

אם יש לך רגישות יתר לזיאגן, החזר את כל טבליות הזיאגן שלך שנותרו בלא שימוש להשמדה בטוחה. התייעץ עם הרופא או הרוקח.

אריזת זיאגן מכילה כרטיס אזהרה, כדי להזכיר לך ולצוות הרפואי על תגובות רגישות יתר. **הוצא כרטיס זה ושמור אותו איתך כל הזמן.**

תופעות לוואי שכיחות

(אלה עשויות להופיע ב- עד 1 מכל 10 אנשים):

- תגובת רגישות יתר
- בחילה
- כאב ראש
- הקאה
- שלשול
- אובדן תיאבון
- עייפות, חוסר אנרגיה
- חום

- פריחה בעור.

תופעות לוואי נדירות

- (אלה עשויות להופיע ב- עד 1 מכל 1,000 אנשים):
- דלקת של הלב (פנקריאטיטיס).

תופעות לוואי נדירות מאד

- (אלה עשויות להופיע ב- עד 1 מכל 10,000 אנשים):

- פריחה בעור, העלולה ליצור שלפוחיות ולהראות כמו מטרות קטנות (כתמים כהים מרכזיים המוקפים באזור חיוור יותר, עם טבעת כהה מסביב לשוליים) (אריתמה מולטיפורמה)
 - פריחה נרחבת עם שלפוחיות וקילוף בעור, במיוחד סביב הפה, האף, העיניים ואיברי המין (תסמונת סטיבנס-ג'ונסון), וצורה חמורה יותר הגורמת לקילוף בעור ביותר מ-30% משטח פני הגוף (טוקסיק אפידרמל נקרוליזיס).
 - חמצת לקטית (עודף חומצה לקטית בדם)
- אם אתה מבחין בכל אחד מתסמינים אלו פנה לרופא בדחיפות.

תופעות לוואי אפשריות אחרות של טיפול משולב ל-HIV

טיפול משולב הכולל זיאגן עלול לגרום להתפתחות מצבים רפואיים אחרים במהלך טיפול ל-HIV.

תסמינים של זיהום ודלקת

זיהומים ישנים עשויים להתפרץ

אנשים עם זיהום מתקדם של HIV (AIDS) הינם בעלי מערכת חיסונית חלשה, והם נוטים יותר לפתח זיהומים חמורים (זיהומים אופורטוניסטיים). כאשר אנשים אלו מתחילים טיפול, הם עשויים לגלות כי זיהומים ישנים, חבויים, מתלקחים וגורמים סימנים ותסמינים של דלקת. תסמינים אלה נגרמים כנראה על ידי התחזקות מערכת החיסון של הגוף, כך שהגוף מתחיל להילחם בזיהומים אלה. התסמינים בדרך כלל כוללים חום, ועוד כמה מהבאים:

- כאב ראש
- כאב בטן
- קושי בנשימה

במקרים נדירים, כאשר מערכת החיסון מתחזקת, היא יכולה גם לתקוף רקמת גוף בריאה (הפרעות אוטואימוניות). התסמינים של הפרעות אוטואימוניות יכולים להתפתח חודשים רבים לאחר שהתחלת לקחת תרופה לטיפול בזיהום ה-HIV שלך. התסמינים יכולים לכלול:

- דפיקות לב (דופק לב מהיר או בלתי סדיר) או רעד
- היפראקטיביות (חוסר מנוחה ותנועה מוגזמים)
- חולשה המתחילה בידיים ובכפות הרגליים ומתקדמת מעלה כלפי מרכז הגוף.

אם אתה סובל מתסמינים כלשהם של זיהום בזמן שאתה לוקח זיאגן, ספר מיד לרופא שלך. אל תיקח תרופות אחרות נגד הזיהום ללא הנחיה מהרופא שלך.

ייתכן שיהיו לך בעיות בעצמות

אנשים מסוימים המקבלים טיפול משולב ל-HIV מפתחים מצב הנקרא *אוסטאונקרוזיס* (נמק העצם). במצב זה, חלקים מרקמת העצם מתים עקב ירידה באספקת דם לעצם. אנשים עשויים להיות בסבירות גבוהה יותר לפתח מצב זה אם:

- הם לוקחים טיפול משולב במשך זמן רב
- הם לוקחים גם תרופות נוגדות דלקת הנקראות קורטיקוסטרואידים
- הם שותים אלכוהול
- מערכת החיסון שלהם חלשה מאוד
- הם בעלי עודף משקל.

סימני האוסטאונקרוזיס כוללים:

- קשיחות במפרקים
 - כאבים (בעיקר בירך, בברך או בכתף)
 - קושי בתנועה.
- אם תבחין באחד מהתסמינים האלו, **ספר לרופא שלך**.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- אין לאחסן מעל 30°C.

6. מידע נוסף

- נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:
microcrystalline cellulose, sodium starch glycollate (Type A), magnesium stearate, colloidal anhydrous silica, methylhydroxypropylcellulose, titanium dioxide (E171), triacetin, iron oxide yellow (E172) and polysorbate 80.
- **כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:**
זיאגן טבליות מצופות מוטבעות ב'GX 623' משני הצדדים. הטבליות כוללות קו חציה, הן צהובות, בצורת קפסולה ומשווקות באריזות בליסטר המכילות 60 טבליות.

- בעל הרישום: גלקסוסמיתקליין (ישראל) בע"מ, רח' בזל 25, פתח תקוה
- היצרן: גלקסוסמיתקליין פארמציוטיקלס S.A., פוזנון, פולין
- נערך באוקטובר 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 112-97-29542
- לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

סימני מסחר הינם בבעלות או בזכיינות של קבוצת החברות של ViiV Healthcare.
©2022 קבוצת החברות של ViiV Healthcare או הזכייין שלה.

Zia Tab PT v7