

يسوق الدواء بدون وصفة طبيب

پارامول، حبوبلات، 500 ملغ

تحتوي كل حبوسلة على اربستامول (Paracetamol) 500 ملغ

المواد غير الفعالة والمسيبة للحساسية في الدواء - أنظر البند 2 - "معلومات إضافية" والبند 2 - "معلومات هامة عن قسم من مركبات الدواء".

أقرأ النشرة بالعلم حتى انتهائها قبل أن تستعمل الدواء، تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه لطبيب أو الصيدلي. يعطى هذا الدواء عن طريق أوصفة

طبيب ومخصص للألمين والأطفال من قبل 6 سنوات فما فوق. عليك تناول الدواء حسب التعليمات في البند 3 "كيفية استعمال الدواء". على هذا النشرة 3 أسئلة إضافية إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية.

يجب مراجعة الطبيب إذا استمرت المسخونة لأكثر من 3 أيام أو إذا تفاقمت الأعراض أو لم تتحسن في غضون 5 أيام على الرغم من استعمال الدواء.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

الدواء مخصص لتسكين الآلام وتخفيف المسخونة الناتجة عن أسباب مختلفة، مثل صداع الرأس والآلام الزكام، انفلونزا الأم، والتهاب المفاصل، التهاب العنق الالتهابي (التهاب).
الفصيلة العلاجية: مسكن للآلام وتخفيف للمسخونة.

2. ليجوز استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا: كنت حساساً (أرجحاً) للمادة الفعالة (أربستامول) أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (انظر البند 6).

تحذيرات خاصة تنطبق على الدواء

- إذا تطورت لديك في الماضي أعراض جانبية جلدية نتيجة تناول مستحضرات تحتوي على پاراستامول، فلا يجوز تناول مستحضرات تحتوي على پاراستامول، كي لا تحدث ثانية أعراض جلدية وخيمة.
- تحتوي المستحضرات على پاراستامول الذي قد يسبب بجرعة عالية عندما يعطى بجرعة أعلى من الموصى بها أو لفترة طويلة.
- شرب المشروبات الكحولية خلال فترة العلاج.
- عند تناول أدوية إضافية التي تؤثر على عمل الكبد.
- لا يجوز استعمال هذا الدواء لفترات متقاربة بدون استشارة الطبيب.
- لا يجوز تناول أدوية إضافية لتخفيف المسخونة وتسكين الآلام، أو أدوية للزكام بدون استشارة طبيب لمنع فرط الجرعة أو تسمم بالپاراستامول.
- لا يجوز تناول أدوية إضافية من عائلة دكسامول أو مستحضرات إضافية تحتوي على پاراستامول.
- يجب تجنب تناول جرعة عالية (بالحد الموصى به) من هذا الدواء أثناء الصوم.
- احذ الطبيب قبل بدء العلاج إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من:
 - حساسية لخداء معين أو لدواء أيًا كان

البالغون والأطفال من قبل 12 سنة فما فوق:

1-2 حبوبلات كل 4-6 ساعات حسب الحاجة. لا يجوز تجاوز جرعة 6 حبوبلات اليوم. **أطفال بعمر 6-9 سنوات:** ½ حبوسلة كل 4-6 ساعات حسب الحاجة. لا يجوز تجاوز جرعة 6 حبوبلات اليوم (1.5 غرام في اليوم).

أطفال في عمر 9-12 سنوات: 1- ½ حبوسلة كل 4-6 ساعات حسب الحاجة. لا يجوز تجاوز جرعة 6 حبوبلات في اليوم (1.5 غرام في اليوم).

لا يجوز تناول جرعة ثانية قبل 4 ساعات من تناول الجرعة الأولى.

تجارتان بين 12-18 سنة: 1- ½ حبوسلة كل 4-6 ساعات حسب الحاجة. لا يجوز تجاوز جرعة 6 حبوبلات في اليوم (1.5 غرام في اليوم).

لا يجوز تناول جرعة ثانية قبل 4 ساعات من تناول الجرعة الأولى.

لا يجوز تناول جرعة ثانية قبل 4 ساعات من تناول الجرعة الأولى.

لا يجوز تناول جرعة ثانية قبل 4 ساعات من تناول الجرعة الأولى.

لا يجوز تناول جرعة ثانية قبل 4 ساعات من تناول الجرعة الأولى.

لا يجوز تناول جرعة ثانية قبل 4 ساعات من تناول الجرعة الأولى.

لا يجوز تناول جرعة ثانية قبل 4 ساعات من تناول الجرعة الأولى.

لا يجوز تناول جرعة ثانية قبل 4 ساعات من تناول الجرعة الأولى.

لا يجوز تناول جرعة ثانية قبل 4 ساعات من تناول الجرعة الأولى.

لا يجوز تناول جرعة ثانية قبل 4 ساعات من تناول الجرعة الأولى.

لا يجوز تناول جرعة ثانية قبل 4 ساعات من تناول الجرعة الأولى.

لا يجوز تناول جرعة ثانية قبل 4 ساعات من تناول الجرعة الأولى.

لا يجوز تناول جرعة ثانية قبل 4 ساعات من تناول الجرعة الأولى.

لا يجوز تناول جرعة ثانية قبل 4 ساعات من تناول الجرعة الأولى.

إيقاف العلاج ومراجعة الطبيب حالاً:

• علامات تحذيرات في جهاز الهضم مثل: آترة فظهور كدمات بسهولة تطور التهابات بسهولة أكثر نتيجة انخفاض شديد بعدد خلايا الدم البيضاء.

• ضيق تنفس (نادر).

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، على استشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

يمكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية يمكن من خلال الضغط على الرابط "دعونا نعمل" وموقعنا أو عن طريق نموذج التماس الموجود على الصفحة الرسمية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il)

الذي يوجه إلى الإستمارة الإلكترونية للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق نموذج الرابط <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين الدواء؟

• تجنب التسمم بحفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان بعيداً عن متناول يدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وهكذا تمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (المؤرخ (توفاه) المطاوع على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى الشهر الأخير من نص النشرة.

• شروط التخزين: لا يجوز التخزين فوق 25°C. في عبوة قتيبة يمكن استعمال الدواء بعد فترة لغاية تاريخ انتهاء الصلاحية المشار إليه على العبوة.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركب يحتوي الدواء أيضاً على:

Povidone, hypromellose, titanium dioxide (E171), croscarmellose sodium, magnesium stearate, macrogol, quinoline yellow aluminum lake (E104), sunset yellow FCF aluminum lake (E110), carnauba wax

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

حبوسلة مطولة باللون الأصفر من خط للشطر من كلا الطرفين.

أحجام العبوات المصاقل عليها:

1000 حبوسلة. عروة القتيبة: 50 حبوسلة. قد لا تكون جميع أحجام العبوات مسوقة. تم التبليغ في حزيران 2022 وفقاً لتعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

127-96-30764-00

التبسيط وتسهيل القراءة. تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المتكبر. بالرغم من ذلك، الدواء مخصص لكلا الجنسين.

المنتج وصاحب التسجيل

دكسل م. ص. شارع دكسل 1، أور عكيفا 3060000، إسرائيل