

התרופה משוקת ללא מרשם רופא

פראמול[®], קפלויות, 500 מ"ג

- מחלת כבד או ליקוי בתפקוד הכבד
- ליקוי בתפקוד הכליה
- אלכוהוליזם
- צבת
- אדם בהריון או מניקה

תגובות בין תרופותיות

- אם אתה לוקה, או אם לוקחת תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח במוחזר. אתה לוקח תרופות נגד קרש יתד כגון וורפין, תכשירים המזרזים ייצור אנזימים כבבד (דוגמה: רפמפיצין, בריטריסול).
- תרופות לאפילפסיה - פניטואין, קרבמזין.
- תכשירים גוגדי דלקת שאינם סטרואידים.
- שטוקופוראמיד או דומפרידון (לטיפול בבילה), הקאה ובעיות עיכול נוספות.
- בלורמפניקול (אנטיביוטיקה), פרופובד (לטיפול בשיגרון).
- גולוסטריאמינ (להפחתת יתר שמני הדם).

שימוש בתרופה וזריכת אלכוהול

אין לצרוך אלכוהול בזמן השימוש בפראמאמול בגלל בעיה בסיסן לנזק לבד.

הריון והנקה

אם את בהריון או מניקה יש להיועץ ברופא לפני התחלת השימוש בתרופה. אין ליטול את המנה המומלצת ביוזמה היעילה עבור ילדים הנאכל ו/או להרדת החום, הועץ הרופא האפשרי. השימוש ברופא אם את הלקה בכבא או בתרופה או תזריכה ליטול את החום לעיתים תכופות יותר.

הקנה

כמויות קטנות של פראמאמול ועוברות חלב אם. יש להיועץ ברופא.

נהיגה ושימוש במכונית
פראמאמול אינו משפיע על היכולת לנהוג או להפעיל מכונית.

שימוש בילדים
תרופה זו מיועדת לילדים וילידים מעל גיל 6 שנים, ראה סעיף 3. על הורפיס לזווח לרופא המטפל על כל השינויים הלואו וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד.

תרופה חשובה על חלק מהמרכיבים של פראמול

תרופה זו מכילה Povidone, hypromellose, croscarmellose sodium, magnesium stearate, macrogol, quinoline yellow aluminum lake (E104), sunset yellow FCF aluminum lake (E110), croscarmellose sodium.

3. כיצד שתמשם בתרופה?

עלך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למהימין ואופן הטיפול בתרופה. הנעדר הרופא אחרת מהרופא המימין המקובל ברמת הנאום:

מבוגרים וילדים מגיל 12 שנים ומעלה:

1-2 קפלויות כל 4-6 שעות לפי הנוסחה. אין לבעור על מנת לשפוך. **ילדים בגיל 9-6 שנים:** ½ קפלייה כל 4-6 שעות לפי הנוסחה. אין לבעור על מנת לשפוך. **ילדים בגיל 3-6 שנים:** ¼ קפלייה כל 4-6 שעות לפי הנוסחה. אין לבעור על מנת לשפוך. **ילדים בגיל 2 שנים:** 2 גרם ג'לי 6 שנים.

אין לבעור על המנה המומלצת.

עלך ללפנות לרופא אם החום נמשך יותר מ-3 ימים או אם התסמינים אינם חולפים תוך 5 ימים למרות השימוש בתרופה.

צורת הטיפול:

יש לבלוע את התרופה עם מעט מים. מותר להצות את הקפלויות. אין מידע לגבי טעימה או תכשיר.

אם נטלת מנת יתר או גבוה יותר
אם נטלת מנת יתר או גבוה יותר ליד נולדו, תרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך. אל תגרמול להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא או מן הרשקן טובה, טיפול מייד הוא חיוני, בגלל סיכונים להתפתחות זקת חמור לבד. תפעות לזמן ארוך בחילה והקאה, שלושל, אובדן תיאבון, כאבי בטן, פנחות, הרעה מחוגרת, כאב ראשי ובטן עליהנו ייתכן שישן לא משקפות את חומרת המק לבד.

אין ליטול תרופות בחושך בקופון הוותיק והמנה בכל פעם בלילה נטול תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם. **יש שך שלחות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.**

4. תופעות לוואי

כמו כל תרופה, השימוש בפראמול עלול לגרום לתופעות לוואי כגון סחרחורת, בחיל מהרהשתמש. אל תבהל למקור רשימת תפעות הלוואי. ייתכן שלא תסבל מאף אחת מהן. תפעות הלוואי עלולות להיות חמורות יותר בקשישים.

תופעות לוואי חמורות:
יש להפסיק את השימוש ולפנות מייד לרופא הנפעות:

• תגובות אלרגיות חרופות כגון פריחה, הרגז, התנפחות של הפנים, השתפיות, הלשון, הרגז או שלפיים לגרמ לקשיי נשימה או אבירה, התנפחות הגפיים. • מוקולו, דינרים, מחלוח עור חרופות שםסימנים שלחן יכילים להיות אודם, פריחה, שלפוחיות, פנעה רשית רחבת, תופעות לוואי עורות חרופות עלולות להופיע גם אם בעבר נטלת תכשירים המכילים את המרכיב הפעיל פראמאמול ללא תמיכה.

אם מופיעות תפעות לוואי ערות, יש להפסיק הטיפול ולפנות לרופא או מיידי.

• סימנים של שינויים במערכת הדם כגון: דימומים, הופעת פבורות בקלות, התפתחות דלקות ביות קלות נמוצה. • מרידה חמורה במספר תאי הדם הלבנים. • קוצר נשימה (נדר).

אם הופיעו תופעות לוואי, אם אתה מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעות לוואי שלא עלו בעלון, עלך להתייעץ עם הרופא.

ידווח על תופעות לוואי

ניתן לזווח על תפעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "ידווח על תפעות לוואי" עקב הטיפול "תרופת" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לידווח על תפעות לוואי, או על ידי כניסה לכתובת: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

• מנע הרחלת תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום גורר מוחזק להשיג ידם וטווח ראייתם של ילדים או יתווק על ידי כך תנעה הרחלה. אל תגורמול להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא. • אל להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפעה המופיע על גבי האריזה. • תאריך התפעה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש. • **חמאי אחסון:** אין לאחסן על 25°C. • באריזת בקבוך, ניתן להשתמש בתרופה לאחר פתיחתה על לתאריך התפעה המופיע על גבי האריזה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מילה גם:
Povidone, hypromellose sodium, croscarmellose sodium, magnesium stearate, macrogol, quinoline yellow aluminum lake (E104), sunset yellow FCF aluminum lake (E110), croscarmellose sodium.

כיצד נראית התרופה ומה חוקן האריזה:
קפלייה מוארכת בעבע צהוב עם קו חציה בשני הצדדים.

גודל אריזה מומלצת:
אריזות מנשת: 10, 16, 20, 50, 100 קפלויות.
אריזת קבוך: 50 קפלויות.
ייתכן שלא כל גודל האריזה משוקים. ערך ביוני 2022 בהתאם להחיות משרד הבריאות.

מספר יושים התרופה בפקט:
המספר המחמיל במשרד הבריאות: 127-96-30764-00
לשם הפטנט ולחוקן הקריאה, על קוזה נוסח בלשון זכר על אף זאת, התרופה מיועדת לכל שני המינים.

יצרן ובעל רישום:

דקסק[®] בע"מ
רח' דקסל 1, אור עקיבא 3060000, ישראל

• אתה גריש (אלרגי) לחומר הפעיל (פראמאמול) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים מילה התרופה (ראה סעיף 6).

- **אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה**
- אם פיתחת בעבר תופעות לוואי ערות כתוצאה מנטלת תכשירים המכילים פראמאמול, אין ליטול תכשירים המכילים פראמאמול, כדאי שלא גירמו שוב תופעות ירושית חמורות.
- התייעץ מילי רופא מומלצת העלול לגרום לנזק לבבד כאשר:
- ניתן מימין גבוה מהמומלץ או בקופון מומלצת.
- בזמן הטיפול שותים משקאות אלכוהוליים.
- נטלים תרופות נוספות המשפיעות על פעילות הרכב.
- אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות בלי להיועץ ברופא.
- אין ליטול תפעות נוספות להרדת חום ושוקר כאבם או תפעות התנגנות על ההתייעת עם רופא או רוקח למעט מווחזר או הרחלה של פראמאמול.
- אין ליטול תכשירים נוספות ממשפחת פראמול ו/או תכשירים נוספים המכילים פראמאמול.
- יש להימנע מליקחת מימין גבוה (בגבול המומלץ) של תרופה זו בזמן צום.

ספר לרופא לפני התרופה הטיפול אם אתה סובל או סבלת בעבר מ:

- אלרגיה למווחזר או לתרופה כלשהי