

Препарат продается без рецепта врача

Парамоль, каплеты, 500 мг

Каждая каплета содержит парацетамол (Paracetamol) 500 мг
Неактивные ингредиенты и аллергены в лекарстве - см. раздел 6 "Дополнительная информация" и раздел 2 "Важная информация о некоторых ингредиентах этого лекарства".

Перед применением этого лекарства внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Эта инструкция содержит краткую информацию о лекарстве. Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту. Это лекарство отпускается без рецепта врача и предназначено для взрослых и детей в возрасте от 6 лет и старше. Принимайте лекарство в соответствии с указаниями в разделе 3 данной Инструкции "Как применять это лекарство". Проконсультируйтесь с фармацевтом, если вам нужна дополнительная информация. Обратитесь к врачу, если высокая температура сохраняется более 3 дней или если симптомы усугубляются или не проходят в течение 5 дней, несмотря на применение лекарства.

1. Для чего предназначено лекарство?

Лекарство предназначено для облегчения боли и снижения повышенной температуры различной этиологии, такой как головная боль, зубная боль, простуды, грипп, ревматические боли и менструальные боли.

Терапевтическая группа:
Аналгетик и жаропонижающее.

2. Перед применением лекарства:

Не применяйте это лекарство, если:

- Вы чувствительны (у вас есть аллергия) к активному ингредиенту (парацетамолу) или к любому из других ингредиентов, содержащихся в этом лекарстве (см. раздел 6).

Особые предостережения относительно применения лекарства

- Если в прошлом у вас развивались побочные эффекты со стороны кожи в результате приема препаратов, содержащих парацетамол, не принимайте препараты, содержащие парацетамол, чтобы не повторились подобные явления.
- Препарат содержит парацетамол, который может вызвать поражение печени, если:

- Дается в дозе выше рекомендуемой или в течение длительного времени.
- Во время курса лечения вы употребляете алкогольные напитки.

- Вы принимаете другие лекарства, влияющие на функцию печени.
- Не используйте это лекарство слишком часто без консультации с врачом.

- Не принимайте другие жаропонижающие и анальгетики или лекарства от простуды без консультации с врачом или фармацевтом, чтобы не допустить передозировки или отравления парацетамолом.
- Не принимайте другие лекарства из группы Парамоль или/и другие препараты, содержащие парацетамол.
- Избегайте приема высоких доз (даже в рекомендованном интервале) этого лекарства натощак.

Сообщите врачу перед началом лечения, если у вас имеется или имелись в прошлом:

- Чувствительность к какой-либо пище или лекарству
- Заболевания печени или нарушение функции печени
- Нарушение функции почек
- Алкоголизм
- Желтуха
- Если вы беременны или кормите грудью

Лекарственные взаимодействия

Если вы принимаете или недавно принимали другие лекарства, в том числе лекарства, отпускаемые без рецепта, и пищевые добавки, сообщите об этом врачу или фармацевту. Особенно, если вы принимаете:

- Антикоагулянты, такие как варфарин.
- Препараты, стимулирующие выработку ферментов печени (например, рифампицин, барбитураты).
- Противоэpileптические средства – фенитоин, карbamазепин.
- Нестероидные противовоспалительные препараты.
- Метоклопрамид или домперидон (для лечения тошноты, рвоты и других проблем с пищеварением).
- Хлорамfenикол (антибиотик).
- Пробенецид (для лечения подагры).
- Холестирамин (для снижения избытка жиров в крови).

Использование этого лекарства и употребление алкоголя

Не употребляйте алкоголь во время лечения парацетамолом ввиду повышенного риска поражения печени.

Беременность и кормление грудью

Беременность:
Если вы беременны или кормите грудью, проконсультируйтесь с врачом перед началом приема этого лекарства. Принимайте наименьшую дозу, которая

эффективна для облегчения боли и/или снижения температуры, в течение как можно более короткого времени. Проконсультируйтесь с врачом, если боль или температура не снижаются, или если возникала необходимость чаще принимать лекарство.

Кормление грудью:
Небольшие количества парацетамола проникают в грудное молоко. Проконсультируйтесь с врачом.

Вождение и использование машин

Парацетамол не влияет на способность управлять автомобилем или работать с механизмами.

Применение у детей
Это лекарство предназначено для взрослых и детей старше 6 лет. см. раздел 3.

Родители должны сообщать лечащему врачу о любых побочных эффектах и любых дополнительных лекарствах, которых получает ребенок.

Важная информация о некоторых ингредиентах этого лекарства
Это лекарство содержит sunset yellow FCF aluminum lake (E110), который может вызывать аллергические реакции.

Это лекарство содержит менее 1 миллимоля (23 мг) натрия на каплю, то есть оно практически не содержит натрия.

3. Как применять лекарство

Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом, если вы уверены в дозировке и способе лечения этим лекарством.

При отсутствии других указаний врача общая рекомендуемая доза составляет:

Взрослые и дети в возрасте 12 лет и старше:

1-2 капletы каждые 4-6 часов, по мере необходимости. Не превышайте дозу 8 каплеи в день.

Дети в возрасте 6-9 лет:

½ капletы каждые 4-6 часов по мере необходимости. Не превышайте дозу 3 каплеи в день (1,5 г в день).

Дети в возрасте 9-12 лет:

½-1 капletа каждые 4-6 часов по мере необходимости. Не превышайте дозу 4 каплеи в день (2 грамма в день).

Не давайте каплету детям младше 6 лет.

Не превышайте рекомендуемую дозу.

Обратитесь к врачу, если высокая температура сохраняется более 3 дней или если симптомы не проходят в течение 5 дней, несмотря на применение лекарства.

Способ применения:

Проглотить каплету и запить небольшим количеством воды. Можно расоловинить таблетку.

Информация о жевании или измельчении отсутствует.

Если вы случайно принял более высокую дозу

Если вы приняли слишком высокую дозу или ребенок случайно проглотил лекарство, немедленно обратитесь к врачу

и, в приемное отделение больницы и возьмите с собой упаковку лекарства. Не вызывайте рвоту без четких указаний врача!

Даже если вы чувствуете себя хорошо, необходимо немедленно начать лечение **ввиду риска развития серьезного повреждения печени**.

Побочными эффектами могут быть тошнота и рвота, диарея, потеря аппетита, боль в животе, меторизм, чрезмерное потоотделение, боль в или

чувствительность в верхней части живота, и они могут не отражать тяжесть поражения печени.

Не принимайте лекарства в этом месте! Проверьте этикетку и дозу каждый раз, когда принимаете лекарство. Наденьте очки, если они вам помогают.

Если у вас есть дополнительные вопросы относительно этого лекарства, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

4. Побочные эффекты

Как и любой лекарство, Парамоль может вызвать побочные эффекты, такие как головокружение, у некоторых людей. Не пугайтесь, читая список побочных эффектов. У вас может не развиться ни один из них.

Побочные эффекты могут быть более серьезными у пожилых людей.

Серьезные побочные эффекты:

Прекратите лечение и немедленно обратитесь к врачу при появлении:

- Острых аллергических реакций, таких как сыпь и зуд, отек конечностей, отек лица, губ, языка и горла, которые могут вызвать затруднение дыхания или глотания.

• В редких случаях – острых кожных проявлений, признаками которых могут быть: покраснение, сыпь, волдыри, распространенное поражение кожи. Острые кожные побочные эффекты могут появиться, даже если в прошлом препараты, содержащие активный ингредиент парацетамол, не вызывали у вас проблем.

При появлении побочных эффектов со стороны кожи прекратите лечение и немедленно обратитесь к врачу.

• Признаков изменений в системе крови, таких как: кровотечение, быстрое образование синяков, более быстрое развитие воспаления в результате резкого снижения количества белых кровянных клеток.

• Одышки (редко).

При появлении побочного эффекта, при ухудшении одного из побочных эффектов или при

появлении побочного эффекта, на упомянутого в данном листке-вкладыше, обратитесь к врачу.

Сообщение о побочных эффектах

Об побочных эффектах можно сообщить в Министерство здравоохранения по ссылке "לעפ"ר יונ"ש עזר'ה יונ"ש עזר'ה", которую можно найти на домашней странице Министерства здравоохранения (www.health.gov.il), ведущей в онлайн-форме для сообщений об побочных эффектах, или по следующей ссылке: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. Как хранить лекарство

Избегайте отравления! Это лекарство и любое другое лекарство необходимо хранить в закрытом месте, недоступном для детей и/или младенцев, во избежание отравления. Не вызывайте рвоту, если не получили прямых указаний врача.

• Не используйте лекарство после истечения срока годности (לאיפה גראף), указанного на упаковке. Срок годности относится к последнему дню указанного месяца.

• Условия хранения: Не хранить при температуре выше 25°C. После вскрытия фланкана-упаковки можно использовать лекарство до истечения срока годности, указанного на упаковке.

6. Дополнительная информация

Помимо действующего вещества, это лекарство также содержит: Povidone, нургомелоз, титан дихлорид (E171), croscarmellose sodium, magnesium stearate, macrogol, quinoline yellow aluminum lake (E104), sunset yellow FCF aluminum lake (E110), carnauba wax

Как выглядят лекарство и что содержится в упаковке:

Продолговая желтая каплета с насечками с обеих сторон.

Утвержденные размеры упаковки: Блистерная (лотковая) упаковка: 8, 10, 15, 20, 50, 100, 1000 каплет.

Упаковка-фланк: 50 каплет.

Не все размеры упаковки могут продаваться.

Пересмотрено в июне 2022 г. в соответствии с рекомендациями Минздрава.

Регистрационный номер лекарственного средства в национальном реестре лекарственных средств Министерства здравоохранения: 127-96-30764-00

Производитель и владелец лицензии:

ДЕЙСЕЛЬ LTD

ул. Декстер 1, Ор Акива
3060000, Израиль