

**نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلانية (مستحضرات) 1986**  
يسوق هذا الدواء بدون وصفة طبيب

## لوسك 20 ملغ كبسولات

التركيبية

تحتوي كل كبسولة على: أوميبرازول 20 ملغ (Omeprazole 20 mg)  
للحصول على معلومات عن المركبات غير الفعالة ومبيدات الأروحية انظر البند 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والبند 6 - "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات مختصة عن الدواء. يجب عليك مراجعة الطبيب إذا تفاقم أعراض المرض أو إذا لم تتحسن.

يجب عليك تناول الدواء بحسب التعليمات الواردة في بند الجرعة الدوائية في هذه النشرة. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية. يجب عليك مراجعة الطبيب إذا تفاقم أعراض المرض أو إذا لم تتحسن.

**هذا الدواء غير مخصص للاستعمال لدى الأولاد والمراهقين الذين عمرهم أقل من 18 عاماً.**

**1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟**  
يُنبت الدواء إفراز الحمض في الجهاز الهضمي.

لوسك مخصص للتخفيف من أعراض الارتجاع المعدي المريئي (مثلاً الحرقة) التي تظهر بوتيرة مرتين في الأسبوع أو أكثر، لدى متلقي العلاج الذين عمرهم فوق 18 عاماً.

**الفصيلة العلاجية:**  
مثبطات مضخة البروتون (Proton Pump Inhibitor (PPI).

**2. قبل استعمال الدواء**  
لا يجوز استعمال المستحضر إذا:

- كانت لديك حساسية (أروحية) للامدأة الفعالة أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6 - "معلومات إضافية").
- كانت لديك حساسية (أروحية) لأدوية تحتوي على مثبطات أخرى لمضخة البروتون (PPI) (مثل: بانتوبازول، لانسوبرازول، رابيبرازول، إيسوميبرازول).
- كنت تستعمل دواء يحتوي على نيفينافير (دواء لعلاج تلوذات HIV).
- كنت تعاني من صعوبة أو ألم عند بلع الطعام، من قيحات دموية أو من براز دموي أو أسود.
- وجدت لديك حرقة مصحوبة بالتشوش، التعرق أو الصدور.
- وجدت لديك ألم في الصدر أو في الكففين، مصحوب بصيق التنفس، بالتعرق، بالألم الأخذ في الانتشار إلى الذراعين، الرقبة أو الكففين، أو بالصدور.
- وجدت لديك ألم في الصدر في أحيان متقاربة.
- كان عمرك أقل من 18 عاماً.

**تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء**  
تتمثل التبعيل عن ردود فعل جلدية خطيرة، مثل: متلازمة ستيفنس-جونسون، تقشر الأنسجة المتوتمة البشورية التسمي، متلازمة رد الفعل الدوائي المصحوب بكتلة اليربنيات والأعراض الجهازية (DRESS) والتهاب الطغبي المعمم الحد (AGEP). يجب إيقاف استعمال لوسك والتوجه لتلقي العلاج الطبي الفوري إذا لاحظت وجود أعراض ترتبط بحدوث الفعل الجلدية الخطيرة هذه، الوارد وصفها في البند 4.

**قد يخفي لوسك أعراض أمراض أخرى. يجب التوجه فوراً إلى الطبيب إذا كنت تعاني من أحد الأعراض التالية قبل البدء بالعلاج بـ لوسك أو أثناء العلاج بـ لوسك:**  
كنت تعاني من انخفاض كبير في وزنك من غير سبب، وكانت لديك مشاكل في البلع.

كنت تعاني من الألم البطن أو من صعوبات في الهضم.

كنت تتقيأ الطعام أو كان لديك تقيؤ دموي. كان لديك براز دموي (براز أسود).

كنت تعاني من إسهال خفيف أو متواصل، لأن استعمال لوسك قد يزيد بعض الشيء من خطر نشوء إسهال نتيجة للتلوذ.

كنت تعاني من مشاكل خطيرة في وظيفة الكبد.

تطور لديك ذات مرة رد فعل جلدي بعد استعمال دواء شبيه بـ لوسك يقلل إفراز الحمض في المعدة.

كنت على وشك الخضوع لفحص دم معين (كروموجرائين A).

كنت تعاني من حرقة لفترة تزيد عن 3 أشهر، فقد يشير هذا الشيء إلى مشكلة أكثر خطورة.

كنت تعاني من آزيز عند التنفس في أحيان متقاربة، خاصة إذا كان مصحوباً بالحرقة.

كنت تعاني من غثيان أو تقيؤات.

كنت تستعمل لوسك لمدة طويلة (طوال أكثر من سنة)، فقد يأمر الطبيب بالخضوع لمتابعة طبية دائمة. يجب إبلاغ الطبيب عن أي عرض جديد وشاذ في كل مرة ترى فيها طبيبك.

استعمال دواء من فصيلة مثبطات مضخة البروتون، مثل لوسك، خاصةً طوال أكثر من سنة، قد يزيد بعض الشيء من خطر حدوث كسر في العظام (المعصم (الرسغ) أو العمود الفقري. يجب عليك إخبار الطبيب إذا كنت تعاني من تآكل العظام أو إذا كنت تستعمل الكورتيكوستيرويدات (التي قد تزيد من خطر نشوء تآكل العظام).

تطور لديك طفح جلدي، خاصةً في المناطق المعرضة للشمس، فيجب إبلاغ الطبيب بأسرع وقت ممكن، لأنك قد تضطر إلى إيقاف استعمال لوسك. يجب إعلام الطبيب أيضاً إذا كنت تعاني من أعراض مرضية أخرى مثل الألم المفصل.

يجب استشارة الطبيب بخصوص فحوصات منتظمة لمستوى المغنيزيوم في الدم خلال فترة العلاج بهذا الدواء.

**التفاعلات بين الأدوية**  
إذا كنت تستعمل البن، أو قد استعملت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، فأخبر طبيبك أو الصيدلي بذلك، خاصةً، يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تستعمل الأدوية التالية:

ليفينافير (دواء لعلاج تلوذات HIV) – لا يجوز استعمال لوسك إذا كنت تستعمل دواء يحتوي على ليفينافير.

كيتوكونازول، إيتراكونازول، بوساكونازول أو فوريكونازول (علاج الفطرية).

ديجوكسين (علاج مشاكل القلب).  
ديازيبام (علاج القلق، لإرخاء العضلات أو للصرع).

فينيتوين (علاج الصرع). إذا كنت تستعمل فينيتوين، فسيقوم الطبيب بمتابعة طبية عندما تبدأ بالعلاج بـ لوسك أو عندما توقفه.

أدوية لتميع الدم مثل وارفارين أو حماضات طرية لثقيامين K. قد يقوم الطبيب بمراقبة طبية عندما تبدأ بالعلاج بـ لوسك أو عندما توقفه.

ريفامبين (علاج السل).  
أتازانفير، ساكونافير (دواء لعلاج تلوذ HIV).

تاكروليموس أو ميكوفينولات (في حالات زراعة الأعضاء).

نبته St. John's Wort (العرن المتقوي) لعلاج الاكتئاب.

سيولستازول (علاج العرج المتقطع).  
كلويدوجري (مضاد للتخثر).  
إرلوتينيب (علاج السرطان).

ميثوتريكسات (دواء العلاج الكيميائي) ويستعمل جرعات دوائية عالية لعلاج السرطان) – إذا كنت تستعمل جرعات دوائية عالية من ميثوتريكسات، فسيدرس الطبيب إيقاف العلاج بـ لوسك بشكل مؤقت.

أموكسيسيلين وكلازيتروميسين (مضادان حيويان) – إذا وصف لك الطبيب هذين المضادين الحيويين سوياً مع لوسك لعلاج القرحة الناجمة عن تلوذ هيليكوباكتر بيلوري، فمن المهم جداً أن تبلغ طبيبك عن أي دواء آخر تستعمله.

**الحمل، الإرضاع والحضوية**  
يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال الدواء إذا كنت حاملاً، تعتقد أنك حامل، تخططين للحمل أو مرضحماً.

يُفَرِّز أوميبرازول (المركب الفعال في الدواء) في حليب الأم، لكن لا يُتَوَقَّع أن يؤثر على الطفل الرضيع عندما يتم استعمال الجرعة الدوائية الموصى بها. سيقرر الطبيب ما إذا كنت تستطيعين استعمال لوسك عند الإرضاع.

**الاستعمال لدى الأولاد**  
هذا الدواء غير مخصص للاستعمال لدى الأولاد والمراهقين الذين عمرهم أقل من 18 عاماً.

**الساقية واستعمال الماكناث**  
لا ينبغي أن يؤثر لوسك على القدرة على تشغيل المعدات، تحدثت أعراض جانبية مثل الصداع، والاضطرابات في الرؤية (انظر البند 4). إذا أحسست بهذه الأعراض فلا يجوز الساقية أو تشغيل الماكناث.

**معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء**  
يحتوي الدواء لوسك على سكر يسمى اللاكتوز. إذا أخبرت طبيبك بأن لديك حساسية لسكريات معينة، فاستشر الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

يحتوي هذا الدواء على أقل من 23 ملغ من الصوديوم في الكبسولة فلذلك يُعتبر خالياً من الصوديوم.

**3. كيف تستعمل الدواء؟**  
هذا الدواء غير مخصص للأولاد والمراهقين الذين عمرهم أقل من 18 عاماً.

يجب الحرص على اتباع تعليمات الاستعمال المفصلة أدناه. يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالدواء.

**الجرعة الدوائية الموصى بها للبالغين من سن 18 عاماً فما فوق عند عدم وجود أمر آخر من الطبيب هي:**

كبسولة واحدة مرة واحدة في اليوم قبل وجبة الطعام لمدة 14 يوماً.

بالإمكان تكرار علاج من 14 يوماً كل 4 أشهر.

لا يجوز استعمال الدواء لأكثر من 14 يوماً، أو لأكثر من علاج واحد (14 يوماً) كل 4 أشهر، إلا بحسب تعليمات الطبيب.

إذا لم يطرأ تحسن على وضعك بعد 14 يوماً و/أو إذا تكررت الأعراض في أحيان متقاربة أو تفاقمت، فيجب مراجعة الطبيب.

**يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.**  
يجب تناول الدواء قبل وجبة الطعام. يوصى بتناول الدواء في الصباح.

يجب بلع الكبسولة بأكملها مع كأس ماء. لا يجوز مضغ أو سحق الكبسولة و/أو محتواها، لأن الكبسولة تحتوي على كريات مطليّة تمنع تفكيك الدواء في المعدة بواسطة الحمض.

**المرضى الذين يعانون من صعوبات في البلع:**  
يمكن فتح الكبسولة وبلع محتواها أو بدلاً من ذلك يمكن خلط محتوى الكبسولة مع مشروب حامضي بعض الشيء (مثل عصير البرتقال) أو مع اليوغورت، وتناوله

خلال 30 دقيقة. بدلاً من ذلك، يمكن مص الكبسولة وبلع محتواها.

من أجل التأكد من أنك تناولت كل الجرعة الدوائية بأكملها، يجب شطف الكأس بنصف الأولاد الذين لا يستطيعون بلع الكبسولة بأكملها، يمكنهم بلع محتوى الكبسولة المفتوحة أو مص الكبسولة وبلع محتواها.

يمكن خلط محتوى الكبسولة مع مشروب حامضي بعض الشيء مثل عصير البرتقال، أو مع اليوغورت، وتناوله خلال 30 دقيقة.

من أجل التأكد من أن الولد قد تناول كل الجرعة الدوائية بأكملها، يجب شطف الكأس بنصف كأس من الماء والشرب مرة أخرى.

كأس من الماء والشرب مرة أخرى. من أجل التأكد من أن الولد قد تناول كل الجرعة الدوائية بأكملها، يجب شطف الكأس بنصف كأس من الماء والشرب مرة أخرى.

كأس من الماء والشرب مرة أخرى. من أجل التأكد من أن الولد قد تناول كل الجرعة الدوائية بأكملها، يجب شطف الكأس بنصف كأس من الماء والشرب مرة أخرى.

كأس من الماء والشرب مرة أخرى. من أجل التأكد من أن الولد قد تناول كل الجرعة الدوائية بأكملها، يجب شطف الكأس بنصف كأس من الماء والشرب مرة أخرى.

كأس من الماء والشرب مرة أخرى. من أجل التأكد من أن الولد قد تناول كل الجرعة الدوائية بأكملها، يجب شطف الكأس بنصف كأس من الماء والشرب مرة أخرى.

كأس من الماء والشرب مرة أخرى. من أجل التأكد من أن الولد قد تناول كل الجرعة الدوائية بأكملها، يجب شطف الكأس بنصف كأس من الماء والشرب مرة أخرى.

كأس من الماء والشرب مرة أخرى. من أجل التأكد من أن الولد قد تناول كل الجرعة الدوائية بأكملها، يجب شطف الكأس بنصف كأس من الماء والشرب مرة أخرى.

كأس من الماء والشرب مرة أخرى. من أجل التأكد من أن الولد قد تناول كل الجرعة الدوائية بأكملها، يجب شطف الكأس بنصف كأس من الماء والشرب مرة أخرى.

كأس من الماء والشرب مرة أخرى. من أجل التأكد من أن الولد قد تناول كل الجرعة الدوائية بأكملها، يجب شطف الكأس بنصف كأس من الماء والشرب مرة أخرى.

كأس من الماء والشرب مرة أخرى. من أجل التأكد من أن الولد قد تناول كل الجرعة الدوائية بأكملها، يجب شطف الكأس بنصف كأس من الماء والشرب مرة أخرى.

كأس من الماء والشرب مرة أخرى. من أجل التأكد من أن الولد قد تناول كل الجرعة الدوائية بأكملها، يجب شطف الكأس بنصف كأس من الماء والشرب مرة أخرى.

كأس من الماء والشرب مرة أخرى. من أجل التأكد من أن الولد قد تناول كل الجرعة الدوائية بأكملها، يجب شطف الكأس بنصف كأس من الماء والشرب مرة أخرى.

كأس من الماء والشرب مرة أخرى. من أجل التأكد من أن الولد قد تناول كل الجرعة الدوائية بأكملها، يجب شطف الكأس بنصف كأس من الماء والشرب مرة أخرى.

كأس من الماء والشرب مرة أخرى. من أجل التأكد من أن الولد قد تناول كل الجرعة الدوائية بأكملها، يجب شطف الكأس بنصف كأس من الماء والشرب مرة أخرى.

كأس من الماء والشرب مرة أخرى. من أجل التأكد من أن الولد قد تناول كل الجرعة الدوائية بأكملها، يجب شطف الكأس بنصف كأس من الماء والشرب مرة أخرى.

كأس من الماء والشرب مرة أخرى. من أجل التأكد من أن الولد قد تناول كل الجرعة الدوائية بأكملها، يجب شطف الكأس بنصف كأس من الماء والشرب مرة أخرى.

كأس من الماء والشرب مرة أخرى. من أجل التأكد من أن الولد قد تناول كل الجرعة الدوائية بأكملها، يجب شطف الكأس بنصف كأس من الماء والشرب مرة أخرى.

كأس من الماء والشرب مرة أخرى. من أجل التأكد من أن الولد قد تناول كل الجرعة الدوائية بأكملها، يجب شطف الكأس بنصف كأس من الماء والشرب مرة أخرى.

كأس من الماء والشرب مرة أخرى. من أجل التأكد من أن الولد قد تناول كل الجرعة الدوائية بأكملها، يجب شطف الكأس بنصف كأس من الماء والشرب مرة أخرى.

كأس من الماء والشرب مرة أخرى. من أجل التأكد من أن الولد قد تناول كل الجرعة الدوائية بأكملها، يجب شطف الكأس بنصف كأس من الماء والشرب مرة أخرى.

كأس من الماء والشرب مرة أخرى. من أجل التأكد من أن الولد قد تناول كل الجرعة الدوائية بأكملها، يجب شطف الكأس بنصف كأس من الماء والشرب مرة أخرى.

كأس من الماء والشرب مرة أخرى. من أجل التأكد من أن الولد قد تناول كل الجرعة الدوائية بأكملها، يجب شطف الكأس بنصف كأس من الماء والشرب مرة أخرى.

كأس من الماء والشرب مرة أخرى. من أجل التأكد من أن الولد قد تناول كل الجرعة الدوائية بأكملها، يجب شطف الكأس بنصف كأس من الماء والشرب مرة أخرى.

كأس من الماء والشرب مرة أخرى. من أجل التأكد من أن الولد قد تناول كل الجرعة الدوائية بأكملها، يجب شطف الكأس بنصف كأس من الماء والشرب مرة أخرى.

كأس من الماء والشرب مرة أخرى. من أجل التأكد من أن الولد قد تناول كل الجرعة الدوائية بأكملها، يجب شطف الكأس بنصف كأس من الماء والشرب مرة أخرى.

كأس من الماء والشرب مرة أخرى. من أجل التأكد من أن الولد قد تناول كل الجرعة الدوائية بأكملها، يجب شطف الكأس بنصف كأس من الماء والشرب مرة أخرى.

كأس من الماء والشرب مرة أخرى. من أجل التأكد من أن الولد قد تناول كل الجرعة الدوائية بأكملها، يجب شطف الكأس بنصف كأس من الماء والشرب مرة أخرى.

كأس من الماء والشرب مرة أخرى. من أجل التأكد من أن الولد قد تناول كل الجرعة الدوائية بأكملها، يجب شطف الكأس بنصف كأس من الماء والشرب مرة أخرى.

كأس من الماء والشرب مرة أخرى. من أجل التأكد من أن الولد قد تناول كل الجرعة الدوائية بأكملها، يجب شطف الكأس بنصف كأس من الماء والشرب مرة أخرى.

كأس من الماء والشرب مرة أخرى. من أجل التأكد من أن الولد قد تناول كل الجرعة الدوائية بأكملها، يجب شطف الكأس بنصف كأس من الماء والشرب مرة أخرى.

كأس من الماء والشرب مرة أخرى. من أجل التأكد من أن الولد قد تناول كل الجرعة الدوائية بأكملها، يجب شطف الكأس بنصف كأس من الماء والشرب مرة أخرى.

كأس من الماء والشرب مرة أخرى. من أجل التأكد من أن الولد قد تناول كل الجرعة الدوائية بأكملها، يجب شطف الكأس بنصف كأس من الماء والشرب مرة أخرى.

كأس من الماء والشرب مرة أخرى. من أجل التأكد من أن الولد قد تناول كل الجرعة الدوائية بأكملها، يجب شطف الكأس بنصف كأس من الماء والشرب مرة أخرى.

كأس من الماء والشرب مرة أخرى. من أجل التأكد من أن الولد قد تناول كل الجرعة الدوائية بأكملها، يجب شطف الكأس بنصف كأس من الماء والشرب مرة أخرى.

كأس من الماء والشرب مرة أخرى. من أجل التأكد من أن الولد قد تناول كل الجرعة الدوائية بأكملها، يجب شطف الكأس بنصف كأس من الماء والشرب مرة أخرى.

كأس من الماء والشرب مرة أخرى. من أجل التأكد من أن الولد قد تناول كل الجرعة الدوائية بأكملها، يجب شطف الكأس بنصف كأس من الماء والشرب مرة أخرى.

**1. متلقي اللعلاج:**  
أعراض جانبية نادرة جداً (تؤثر على متلقي اللعلاج كحد أقصى من بين 10,000 متلقي للعلاج):

تغيرات في العد الدموي بما في ذلك ندرة المحييات (نقص في خلايا الدم البيضاء)، عدوانية.

هلوسات – رؤية، إحساس أو سماع أشياء غير موجودة في الواقع.

مشاكل خطيرة في الكبد تسبب قصور الكبد والتهاب الدماغ.

حساسية متعددة الأشكال.  
ضماع العضلات.

تضخم الثديين لدى الرجال.

أعراض جانبية مدى شويوعا غير معروف (أعراض جانبية لا يمكن تقدير مدى شويوعا من المعلومات المتوفرة):

التهاب في العظام (بسبب الإسهال).

إذا كنت تتلقى العلاج بـ لوسك لفترة تزيد عن 3 أشهر، فقد يطرأ انخفاض على مستوى المغنيزيوم في دمك. تتمثل المستويات المنخفضة للمغنيزيوم بالتعب، التقلصات اللاإرادية في العضلات، الارتباك، التشنجات، الدوار أو الارتفاع في وتيرة القلب. إذا كان لديك أحد هذه الأعراض فغليك إبلاغ الطبيب بأسرع وقت. قد تسبب المستويات المنخفضة للمغنيزيوم أيضاً انخفاضاً في مستويات البوتاسيوم و الكالسيوم في الدم. قد يقرر طبيبك إجراء فحوص دم منتظمة من أجل تتبع مستويات المغنيزيوم في دمك.

تقطع جلدي، مصحوب أحياناً بالألم المفصل.

في حالات نادرة جداً قد يؤثر لوسك على خلايا الدم البيضاء ويسبب نقصاً مناعياً (تضرر الجهاز المناعي). إذا كان لديك تلوذ مصحوب بأعراض مثل الحمى مع التهاب الحظير في وضعك الصحي العام، أو الحمى مع أعراض التلوذ الموضعي مثل الألم في الرقبة، في الحلق أو في الفم والصعوبات في التبول، فغليك استشارة الطبيب بأسرع وقت ممكن من أجل نفي نقص خلايا الدم البيضاء (ندرة المحييات) بواسطة فحص الدم. في حالة كيد من المهم إعلام الطبيب بذلك.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي لم يُذكر في هذه النشرة، فغليك استشارة الطبيب.

**التبليغ عن الأعراض الجانبية**  
بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عنب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.au)، والذي يوجه إلى الاستمارة المتصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، عن طريق الدخول إلى الرابط:

https://sideeffects.health.gov.au

**5. كيف يجب تخزين الدواء؟**  
امنع التسمم! هذا الدواء، وكل دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال الرضع ومجال رؤيتهم، وبذلك ستمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) المدون على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

يجب تخزين هذا الدواء في مكان جاف، فيما بين 25°C. يجب حفظه في العبوة الأصلية للحماية من الضوء.

يجب إغلاق الغطاء جيداً بعد كل استعمال. يمكن استعمال الدواء حتى 3 أشهر بعد فتح الغطاء لأول مرة، لكن ليس بعد تاريخ انتهاء صلاحية الدواء.

**6. معلومات إضافية**  
بالإضافة إلى المركب الفعال، يحتوي الدواء على:

محتوى الكبسولة:  
Mannitol, methacrylic acid copolymer, lactose anhydrous, hypromellose, hydroxypropyl cellulose, microcrystalline cellulose, polyethylene glycol, sodium phosphate dihydrate, sodium lauri sulfate, magnesium stearate.

تركيبية الكبسولة:  
Gelatin, red iron oxide, titanium dioxide, water.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:  
الكبسولة مكونة من جزء وردي معتم مطبوع عليه العدد "20" وجزء بني ضارب إلى الحمرة مطبوع عليه "A LOSE".

تحتوي الكبسولات على داخلها على كريات ذات طلاء معوي لونها أبيض ضارب إلى الصفرة بعض الشيء.

أحجام العبوة: 7، 14، 28 و30-كبسولة. قد لا تسوق جميع أحجام العبوات.

اسم المصنِّع وصاحب الامتياز وعنوانه:  
تيفت إسرانيل م.ض.م، شارع ذفوره هاتيفيه 124، تل أبيب 6944020.

تم تحرير النشرة في تموز/يوليو 2022 وفقاً لرقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

139.78.31879

من أجل التبليغ وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بتسهيل الذكرى على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

Interstital

مشاكل خطيرة في الكلية (Nephritis).

تقرق متزايد.

تقرق متزايد.

تقرق متزايد.

تقرق متزايد.

تقرق متزايد.

تقرق متزايد.

تقرق متزايد.

تقرق متزايد.

تقرق متزايد.