

# ريبلوزيل®

(لوسياتيرسيبيت)

## بطاقة لمتلقيّة العلاج

(للنساء القادرات على الحمل)

### معلومات لمتلقيّة العلاج

يُمنع استعمال ريبيلوزيل (لوسياتيرسيبيت) خلال الحمل ولمدة 3 أشهر على الأقل قبل بدء الحمل. قد يلحق ريبيلوزيل ضرراً بجنينك.

2007-IL-2200005

## تلقيت وصفة طبية لريبيلوزيل

### بيانات اتصال هامة

طبيبي المعالج الذي أعطاني الوصفة لريبيلوزيل:

الاسم:
رقم هاتف العيادة:
عنوان العيادة:

تمت المصادقة على هذه البطاقة ومحتواها من قبل وزارة الصحة في آذار 2022

2007-IL-2200005

- يجب إعادة إجراء فحص الحمل بفوارق زمنية ملائمة.
- أخبري الطبيب فوراً إذا كنت حاملاً أو تعتقدين بأنك قد تكونين حاملاً خلال فترة العلاج بريبيلوزيل أو خلال 3 أشهر بعد توقفك عن تناول ريبيلوزيل.

الرجاء مراجعة ظهر هذه البطاقة للاطلاع على بيانات التواصل مع الطبيب المعالج الذي وصف لك الدواء. لمعلومات إضافية حول تأثيرات ريبيلوزيل وأعراضه الجانبية، يجب الاطلاع على نشرة المستهلك الخاصة بريبيلوزيل.

يمكن أيضاً الإبلاغ عن الأعراض الجانبية عبر الاستمارة الإلكترونية للتبليغ عن الأعراض الجانبية، الموجودة في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة: [www.health.gov.il](http://www.health.gov.il) أو عبر الدخول إلى الرابط <https://sideeffects.health.gov.il>

لمعلومات إضافية أو لتلقي نسخة من بطاقة التذكير لموضوع الحمل، يُرجى التوجه لشركة BMS عبر البريد الإلكتروني: [medinfo.israel@bms.com](mailto:medinfo.israel@bms.com) أو الهاتف رقم 1809-388-054 (مكالمة مجانية)

يُمنع استعمال ريبيلوزيل إذا كنت حاملاً أو مرضعة، أو كنت قادرة على الحمل ولا تستعملين على الأقل وسيلة واحدة عالية النجاعة لمنع الحمل.

### • قبل بدء العلاج بريبيلوزيل:

1. عليك تلقّي نتيجة سلبية في فحص الحمل مؤكّدة من قبل الطبيب الذي وصف لك الدواء.
2. عليك مناقشة الطبيب بشأن وسائل منع الحمل واستعمال وسيلة واحدة على الأقل، عالية النجاعة، لمنع الحمل خلال فترة تناول ريبيلوزيل ولمدة 3 أشهر على الأقل بعد التوقف عن العلاج بريبيلوزيل.