

# רבלוזיל®

(לוספטרספט)

**כרטיס למטופלת**  
(עבור נשים היכולות להרות)

**מידע למטופלת**  
אין להשתמש ברבלוזיל (לוספטרספט) במהלך ההיריון  
ולפחות 3 חודשים לפני תחילת היריון.  
רבלוזיל עלולה לגרום נזק לעוברך.

2007-IL-2200003

## קיבלתי מרשם לרבלוזיל

### פרטי קשר חשובים

הרופא המטפל שלי שרשם את המרשם לרבלוזיל:

שם:	
מספר טלפון של המרפאה:	
כתובת המרפאה:	

2007-IL-2200003

כרטיס זה ותוכנו אושרו על-ידי משרד הבריאות במרץ 2022

- יש לחזור על בדיקת ההיריון במרווחי זמן מתאימים.
- ספרי לרופא מיד אם את בהיריון או סבורה שאת עשויה להיות בהיריון במהלך הטיפול ברבלוזיל או במהלך 3 החודשים לאחר שהפסקת ליטול רבלוזיל.

נא ראי בגב כרטיס זה פרטים ליצירת קשר עם הרופא המטפל שרשם עבורך את התרופה.  
למידע נוסף על ההשפעות ועל תופעות הלוואי של רבלוזיל, יש לעיין בעלון לצרכן עבור רבלוזיל.

ניתן לדווח על תופעות לוואי באמצעות הטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות: [www.health.gov.il](http://www.health.gov.il) או על ידי כניסה לקישור <https://sideeffects.health.gov.il>

למידע נוסף או לקבלת עותק של כרטיס התזכורת בנושא היריון אנא פנו לחברת BMS במייל: [medinfo.israel@bms.com](mailto:medinfo.israel@bms.com) או בטלפון 1809-388-054 (שיחת חינם)

אין להשתמש ברבלוזיל אם את בהיריון או מניקה, או שאת יכולה להרות ואינך משתמשת לפחות באמצעי אחד בעל יעילות גבוהה למניעת היריון.

### • לפני תחילת הטיפול ברבלוזיל:

- עלייך לקבל תשובה שלילית בבדיקת היריון המאומתת על ידי הרופא שרשם עבורך את התרופה.
- עלייך לדון עם הרופא על אמצעים יעילים למניעת היריון ולהשתמש לפחות באמצעי אחד בעל יעילות גבוהה למניעת היריון בזמן נטילת רבלוזיל ולמשך 3 חודשים לפחות לאחר הפסקת הטיפול ברבלוזיל.