

קנסטן קרם

חומר פעיל:

קלוטרימזול 1% Clotrimazole

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים: – ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
עליך להשתמש בתכשיר על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה. היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף. עליך לפנות אל הרופא במידה ותסימני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים אחרי 4 שבועות.

1) למה מיועדת התרופה?

קנסטן קרם מיועד לטיפול בזיהומי עור ורקמות ריריות הנגרמים על ידי סוגים שונים של פטריות. מיועד גם לטיפול בקנדידה של הנרתיק וקנדידה של הפין.

קבוצה תרפויטית: חומרים אנטי-פטרייתיים לשימוש מקומי מקבוצת האימידאזולים.

2) לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה:

- אם הנך רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה, כולל צטוסטאריל אלכוהול (ראה סעיף 6 "מידע נוסף").
- לטיפול בפטרת ציפורניים או על הקרקפת.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

אין לעשן או להתקרב למקור אש גלוי בשל הסיכון לכוויות חמורות. בד (בגדים, מצעים, תחבושות, וכד') שהיה במגע עם תכשיר זה יכול להתלקח ביתר קלות ומהווה סכנת אש רצינית. כביסת בגדים ומצעים עשויה להוריד את כמות התכשיר שהצטבר אך לא תסיר אותו לגמרי. כמו עם קרמים אחרים, קנסטן קרם עלול להפחית את יעילותם של אמצעי מניעה העשויים מגומי כמו קונדום או דיאפרגמה. במידה והנך משתמש בתכשיר זה בנרתיק או על הפין, יש להשתמש באמצעי מניעה חלופיים למשך לפחות חמישה ימים לאחר השימוש בתכשיר זה. אם לא חל שיפור במצבך תוך 4 שבועות, יש לפנות לרופא.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות:

אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

היריון, הנקה ופוריות

היריון והנקה:

אם את בהיריון, אם את מניקה או מנסה להרות, יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתכשיר ולפעול בהתאם להוראותיו. ניתן להשתמש בתכשיר זה בתקופת ההיריון אך רק תחת השגחת רופא. ניתן להשתמש בתכשיר זה בתקופת ההנקה אך יש לשטוף את אזור הפטמות לפני ההנקה אם נעשה שימוש בתכשיר זה באזור הפטמות.

פוריות:

אין נתונים המצביעים על בעיות פוריות בעקבות השימוש בתכשיר.

נהיגה ושימוש במכונות

לקנסטן קרם אין השפעה על היכולת לנהוג או להשתמש במכונות או שהשפעתו זניחה בלבד.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

תכשיר זה מכיל צטוסטאריל אלכוהול אשר יכול לגרום לתגובה מקומית בעור כגון דלקת עור ממגע (contact dermatitis). כל גרם של תכשיר זה מכיל 20 מ"ג בנזיל אלכוהול אשר יכול לגרום לתגובות אלרגיות וגירוי מקומי מתון.

3) כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. במידה והתכשיר נרשם לך על-ידי רופא, עליך להישמע להוראותיו. במידה ורכשת תכשיר זה ללא מרשם רופא, עליך להשתמש בתכשיר בהתאם להוראות בסעיף זה.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:

טיפול פעמיים עד 3 פעמים ביום.

אופן השימוש:

- הוראות פתיחה - על מנת לפתוח את השפופרת יש להפוך את הפקק ולדקור את החלק האוטם את השפופרת באמצעות לחיצה של הפקק.
- לטיפול בפטרת כף הרגל: יש לשטוף את כפות הרגליים ולייבשן היטב, במיוחד בין הבהונות לפני מריחת הקרם.
- יש למרוח שכבה דקה ואחידה על האזורים הנגועים פעמיים עד 3 פעמים ביום ולהחדיר את הקרם לתוך העור על-ידי עיסוי.
- בדרך-כלל תספיק כמות קטנה של $\frac{1}{2}$ ס"מ קרם לטיפול באזור בגודל כף היד.
- אם אתה סובל מפטרת כף הרגל, מומלץ להשתמש גם באבקה אנטי פטרייתית. היועץ ברופא או ברוקח.
- תסמיני הזיהום בעור כגון גרד וכאב צפויים להשתפר תוך מספר ימים מהתחלת הטיפול, אבל ייתכן שתסמינים כגון אדמומיות וקילוף העור עשויים להיעלם לאחר זמן רב יותר.

משך הטיפול:

- **משך הטיפול** בזיהומי העור הפטרייתיים תלוי בסוג הזיהום. לרוב, משך הטיפול הינו לפחות שבועיים, למרות שיתכן שיידרשו עד 4 שבועות של טיפול.
- אם לא חל שיפור במצבך תוך 4 שבועות, יש לפנות לרופא.

אין לעבור על המנה המומלצת.

לשימוש חיצוני בלבד. אין להכניס את התרופה לפה או לבלוע אותה. אם בלעת בטעות את התכשיר, עליך לפנות מיד לרופא או לפנות לחדר מיון בבית החולים הקרוב ביותר. יש להימנע ממגע התכשיר עם העיניים או הפה. במקרה של מגע בעיניים או בפה, יש לשטוף היטב עם מים ולפנות לרופא.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר, אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אם שכחת למרוח את התכשיר בזמן הדרוש, מרח את הקרם מייד כשנזכרת והמשך את יתר הטיפול כרגיל.

• **כיצד תוכל לסייע להצלחת הטיפול?**

- למרות שהאזור הנגוע מגרד, יש להימנע מגירוד האזור. הגירוד עלול לגרום לנזק לפני שטח העור וכך להתפשטות הזיהום.
- שמור על האזורים הנגועים נקיים.
- יש לייבש היטב את האזור אך להימנע משפשוף יתר.
- אל תחלוק עם אנשים אחרים מגבות, שטיח אמבטיה וכדומה, מכיוון שהזיהום עלול לעבור אליהם.
- הקפד לרחוץ את ידיך לאחר כל טיפול בזיהום על-מנת למנוע את התפשטותו.

• אם אתה סובל מפטרת כף הרגל:

- הקפד לייבש את העור בין הבהונות ביסודיות.
- יש לכבס גרביים וגרביונים ביסודיות במים חמים כדי להסיר העור המקולף או נבגי פטריות.
- החלף נעליים כל יום במידת האפשר.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4) תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בקנסטן קרם עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

כמו בכל תרופה, ייתכן שיהיו מטופלים בעלי רגישות יתר (אלרגיים) לקרם זה. במידה ואתה אלרגי, תגובה תתפתח בסמוך לאחר השימוש בתכשיר. יש להפסיק טיפול ולפנות מיד לרופא או לפנות לחדר מיון בבית חולים הקרוב אליך ביותר אם מתפתחת תגובה אלרגית. סימני תגובה אלרגית עשויים לכלול:

- פריחה
- בעיות בליעה או נשימה
- התנפחות השפתיים, הפנים, הגרון או הלשון
- חולשה, סחרחורת או עילפון
- בחילה

לאחר השימוש בתרופה ייתכן שתחוש: גרד, פריחה, שלפוחיות, בעירה, אי נוחות, התנפחות, גירוי, נימול, אודם או קילוף של העור.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או אם אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5) איך לאחסן את התרופה ?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp.date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **תנאי אחסון:**
 - יש לאחסן מתחת ל-30°C.
 - אין להשתמש מעבר ל-3 חודשים לאחר הפתיחה.

6) מידע נוסף

- **נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם מרכיבים בלתי פעילים:**

Purified water, octyldodecanol, cetostearyl alcohol, cetyl palmitate, benzyl alcohol, sorbitan stearate, polysorbate 60.

ראה פרק "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה" בנוגע לחומרים צטוסטאריל אלכוהול ובנזיל אלכוהול.
 - **כיצד נראה קנסטן קרם ומה תוכן האריזה?**

קנסטן קרם הינו קרם בצבע לבן, ארוז בשפופרת המכילה 20 או 30 גרם. ייתכן שלא כל גדלי האריזה משווקים.
 - **בעל הרישום והיבואן וכתובתו:** באייר ישראל בע"מ, רח' החרש 36, הוד השרון 45240.
 - נערך באוקטובר 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
 - מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 149-44-33680-01.
- לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה מנוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.